

Comment reconnaître une surdose d'opioïdes

Quiconque utilise des opioïdes, même en petite quantité, risque une surdose.

Le fentanyl et d'autres substances dangereuses sont mélangés à d'autres drogues ou vendus en tant que drogues comme l'héroïne, l'oxycodone, la cocaïne et l'ecstasy/MDMA.

SIGNES D'UNE SURDOSE D'OPIOÏDES



Lèvres ou ongles bleus ou gris



Étourdissements et confusion



Incapacité à se réveiller



Bruits de suffocation, gargouillements ou ronflements



Respiration lente, faible ou inexistante



Somnolence ou difficulté à rester éveillé

VOUS SOUPÇONNEZ UNE SURDOSE?

Appelez le **911** ou votre numéro d'urgence local

Administrez de la **NALOXONE** si vous en avez

DEMEUREZ avec la personne jusqu'à l'arrivée des secours

Même si vous avez pris de la drogue ou en avez sur vous, la *Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose* vous offre une certaine protection juridique.

Ensemble, nous pouvons mettre
#FinAuxSurdoses

**SOYEZ
AU FAIT**

DROGUES : OBTENEZ LES FAITS.
CONNAISSEZ LES RISQUES.

Renseignez-vous sur Canada.ca/Opioides



Santé
Canada

Health
Canada