

Tableau : Données sur la qualité du canola de grade Canada no 1 récolté en 2025, selon la province et le district agricole

District agricole	Nombre d'échantillons	Teneur en huile			Teneur en protéines			Teneur en protéines du tourteau déshuilé	Teneur en chlorophylle			Teneur en glucosinolates totaux des graines			Teneur en glucosinolates totaux du tourteau déshuilé	Graines nettement vertes (DGR)	Teneur en acides gras libres (AGL)	Échantillons classés Canola, Canada no 1
		% 8,5 % d'humidité			% 12 % d'humidité			mg/kg, tel quel			µmol/g, 8,5 % d'humidité							
		Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	%	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	µmol/g	%	% sous forme d'acide oléique	%
Manitoba																		
1	20	42.4	40.1	44.8	21.3	20.1	23.7	38.2	5	3	20	11	8	14	20	0.5	0.3	87.0
2	25	43.1	39.3	48.4	21.6	18.0	24.1	39.2	6	3	33	12	5	15	21	0.6	0.4	92.6
3	47	42.6	39.3	48.4	22.0	17.6	24.2	39.5	7	3	17	11	3	14	19	0.5	0.3	92.2
4	20	43.0	41.2	46.7	21.3	18.6	22.7	38.7	5	3	20	11	7	14	19	0.4	0.4	100.0
5	14	42.1	39.4	46.2	22.5	19.0	24.8	40.1	7	4	14	14	8	16	23	0.7	0.7	100.0
6	15	42.1	40.3	45.6	21.9	20.2	23.2	39.0	3	3	12	12	8	14	20	0.4	0.4	100.0
7	47	42.5	39.0	46.7	22.4	20.1	25.0	40.3	6	3	14	12	7	19	21	0.6	1.0	92.3
8	92	43.1	39.6	49.1	21.6	16.9	24.3	39.2	5	3	22	12	6	16	21	0.6	0.5	94.8
9 et 10	22	43.1	41.8	45.3	21.4	19.9	23.3	38.9	5	3	13	12	8	16	21	0.8	0.5	100.0
11	NS*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	66.7
12	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	50.0
Manitoba	302	42.7	39.0	49.1	21.8	16.9	25.0	39.3	5	3	33	12	3	19	21	0.5	0.5	94.3
Saskatchewan																		
1	17	43.5	40.9	47.2	20.4	17.3	24.0	37.4	4	3	12	11	7	13	19	0.2	0.2	65.4
2	18	42.9	39.8	47.2	21.7	18.9	23.9	39.2	6	3	17	12	5	15	21	0.3	0.1	100.0
3 + 4	21	40.8	38.0	47.2	23.2	19.4	25.9	40.2	6	3	16	14	9	17	21	0.5	0.1	95.5
5	44	43.1	39.8	47.0	21.4	18.3	24.3	38.9	6	3	25	11	7	13	20	0.4	0.2	95.7
6	43	42.5	38.4	47.8	22.0	17.4	24.1	39.4	8	3	17	11	8	13	19	0.3	0.1	97.7
7	22	42.0	37.8	47.3	22.6	18.1	25.9	40.2	8	3	25	13	9	19	21	0.4	0.1	100.0
8	15	42.1	39.0	45.0	22.6	17.9	26.2	40.2	6	3	32	15	7	28	25	0.3	0.1	93.8
9	24	43.4	41.0	47.7	21.2	18.8	24.9	38.8	6	3	15	13	8	16	23	0.3	0.2	92.6
10	23	44.1	40.7	46.8	20.9	16.6	23.3	38.8	10	4	20	12	6	19	21	0.4	0.1	96.0
11	72	43.0	40.0	47.7	21.9	18.6	25.0	39.7	9	3	30	11	7	19	20	0.5	0.1	93.6
12	23	43.6	40.3	46.2	21.0	18.8	23.7	38.5	6	4	17	10	6	15	18	0.3	0.1	100.0
13	58	44.1	39.7	49.0	20.5	15.2	24.1	38.0	5	3	20	12	6	21	21	0.2	0.1	98.4
14	63	43.5	39.1	46.1	21.7	18.8	25.8	39.8	10	3	26	11	5	22	18	0.7	0.3	94.0
15	48	44.0	40.3	48.4	21.3	18.5	24.2	39.4	12	4	27	12	5	21	21	0.7	0.2	92.0
16	45	44.1	40.8	47.8	21.4	17.6	24.3	39.8	9	3	28	11	6	17	20	0.6	0.1	91.8
17	33	43.9	39.8	48.4	21.5	17.3	25.2	39.7	7	3	18	12	7	25	20	0.5	0.1	94.3
Saskatchewan	569	43.3	37.8	49.0	21.5	15.2	26.2	39.2	8	3	32	12	5	28	20	0.4	0.2	86.4
a et Colombie-Britannique																		
1	7	44.6	39.9	48.5	21.0	17.2	23.9	38.8	4	3	9	13	10	18	24	0.1	0.1	100.0
2	52	43.2	39.1	48.5	21.9	17.5	26.5	39.7	7	3	26	11	5	16	20	0.4	0.1	94.8
3	47	45.3	39.9	50.8	20.4	15.6	23.5	39.0	11	3	36	11	5	17	19	0.5	0.1	98.0
4	212	44.3	38.5	50.0	21.6	16.3	26.5	40.2	10	3	32	11	5	19	20	0.5	0.2	96.4
5	65	45.2	41.7	48.5	20.6	17.5	23.1	39.1	9	2	37	10	6	16	18	0.5	0.1	94.2
6	42	45.8	42.0	50.2	20.3	16.9	24.8	39.0	6	4	21	10	5	15	18	0.3	0.2	97.7
7	98	44.5	41.1	50.5	22.0	16.0	24.9	41.1	8	3	28	12	7	22	22	0.6	0.2	98.0
C.-B. 7	13	44.7	39.5	48.1	21.2	18.1	23.9	39.9	5	3	30	10	6	14	19	0.4	0.1	100.0
Alberta et Colombie-Britannique	536	44.5	38.5	50.8	21.3	15.6	26.5	39.9	8	3	37	11	5	22	20	0.5	0.2	96.6
Ouest canadien	1,407	43.6	37.8	50.8	21.5	15.2	26.5	39.4	8	3	37	12	3	28	20	0.5	0.2	94.5

* NS = non suffisant. Nombre insuffisant d'échantillons pour générer une valeur représentative.

Tableau : Composition en acides gras des échantillons de canola de grade Canada no 1 récolté en 2025, selon la province et le district agricole

District agricole	Acide palmitique (C16:0)	Acide stéarique (C18:0)	Acide oléique (C18:1)			Acide linoléique (C18:2)			Acide alpha-linolénique (C18:3)			Acide érucique (C22:1)	Teneur totale en acides gras saturés			Indice d'iode		
	Moy.	Moy.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	% dans l'huile				Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.
									Moy.	Min.	Max.							
Manitoba																		
1	3.9	1.8	64.4	60.2	66.5	17.7	16.7	20.5	8.8	7.7	10.0	0.00	6.9	6.3	7.1	110.3	108.4	114.7
2	3.9	1.7	63.5	60.9	65.6	18.4	17.1	20.5	8.9	8.2	10.3	0.00	6.7	6.2	7.0	111.4	109.7	116.4
3	3.9	1.6	63.3	60.2	65.8	18.0	17.3	20.8	9.6	8.2	10.8	0.02	6.7	5.9	7.0	112.1	109.5	117.3
4	3.9	1.7	64.1	61.8	66.3	17.5	16.9	20.1	9.2	7.9	9.8	0.00	6.8	6.2	7.0	110.9	108.6	114.5
5	3.8	1.7	64.0	62.7	65.4	17.5	17.1	19.4	9.4	8.2	10.4	0.01	6.6	6.3	6.8	111.4	109.2	114.1
6	3.8	1.8	64.4	60.5	66.3	17.7	16.9	20.5	8.8	7.6	10.5	0.00	6.7	6.1	6.9	110.4	108.8	116.6
7	3.9	1.6	63.5	60.5	66.4	18.5	16.9	20.5	9.0	7.6	10.6	0.00	6.6	5.9	7.0	111.6	108.8	116.1
8	3.9	1.7	63.7	58.2	66.1	18.6	17.1	21.7	8.6	7.4	12.8	0.00	6.8	6.2	7.3	110.9	108.5	119.6
9 et 10	3.9	1.7	64.2	61.6	66.8	18.3	16.8	20.3	8.5	7.7	10.5	0.00	6.7	6.3	7.0	110.5	108.7	114.4
11	NS*	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
12	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
Manitoba	3.9	1.7	63.9	58.2	66.8	18.1	16.7	21.7	9.0	7.4	12.8	0.00	6.7	5.9	7.3	111.1	108.4	119.6
Saskatchewan																		
1	3.9	1.8	64.3	61.2	66.1	17.9	16.8	20.6	8.9	8.1	10.2	0.00	6.8	6.2	7.1	110.8	109.1	115.6
2	3.9	1.8	64.9	61.2	66.7	17.7	16.6	21.0	8.3	7.3	9.1	0.00	6.8	6.1	7.1	109.6	108.1	115.1
3 et 4	3.7	2.0	65.3	62.4	66.8	17.2	16.3	19.9	8.3	6.9	8.9	0.00	6.9	6.2	7.2	109.1	108.0	113.5
5	3.9	1.7	64.2	60.0	67.3	17.8	16.9	20.6	9.0	7.0	10.5	0.00	6.8	6.1	7.0	110.8	107.2	116.0
6	3.9	1.8	64.9	60.7	67.7	17.4	16.4	20.4	8.5	6.4	10.1	0.00	6.9	6.3	7.3	109.5	107.0	116.6
7	3.8	1.9	64.9	59.8	67.0	17.6	16.8	20.5	8.4	7.1	10.3	0.00	6.9	6.4	7.1	109.7	106.9	115.3
8	3.7	1.9	65.6	61.9	67.0	16.8	16.4	18.9	8.6	7.5	10.3	0.00	6.8	6.1	7.0	109.3	107.4	114.1
9	3.9	1.7	63.7	60.0	66.6	17.7	16.3	20.5	9.4	8.0	10.7	0.01	6.8	6.3	7.0	111.5	107.9	116.7
10	3.9	1.7	64.1	60.8	67.0	17.4	16.3	20.2	9.4	7.9	10.7	0.00	6.7	6.3	7.0	111.3	108.6	114.4
11	3.8	1.7	64.7	58.8	68.2	17.3	16.4	21.0	8.9	6.9	11.7	0.01	6.7	6.2	7.0	110.5	106.5	118.2
12	3.7	1.9	65.6	62.1	67.1	17.0	16.3	19.5	8.4	7.6	10.1	0.00	6.8	6.2	7.2	109.1	107.1	114.1
13	3.8	1.8	65.3	59.1	67.8	17.3	16.2	20.5	8.3	6.7	11.6	0.00	6.8	6.0	7.1	109.1	106.2	117.6
14	4.0	1.5	63.1	58.3	67.1	18.4	16.5	21.0	9.4	7.3	12.3	0.02	6.6	6.0	7.0	112.2	108.0	119.6
15	3.9	1.6	63.3	57.9	66.8	18.3	16.9	21.8	9.6	6.5	12.3	0.00	6.5	6.3	7.2	112.5	107.2	119.6
16	3.8	1.6	63.5	59.3	66.1	18.1	16.6	21.0	9.5	8.2	11.6	0.00	6.5	6.1	7.1	112.3	108.9	117.8
17	3.7	1.7	65.4	61.5	67.1	16.7	16.6	20.0	8.9	7.5	9.9	0.00	6.6	6.1	7.1	109.9	107.3	114.9
Saskatchewan	3.9	1.7	64.3	57.9	68.2	17.6	16.2	21.8	9.0	6.4	12.3	0.00	6.7	6.0	7.3	110.7	106.2	119.6
lberta et Colombie-Britannique																		
1	3.8	1.7	65.3	64.2	66.7	17.1	16.4	18.8	8.6	8.2	9.1	0.00	6.7	6.1	6.8	109.6	108.7	111.8
2	3.9	1.8	64.3	60.4	66.8	17.9	16.2	20.3	8.7	7.2	11.2	0.00	6.8	6.2	7.2	110.4	107.4	116.4
3	4.0	1.7	63.9	58.5	66.4	17.9	16.6	20.7	9.2	7.5	12.0	0.00	6.7	6.0	7.2	111.3	107.0	118.8
4	3.8	1.7	64.3	59.8	68.3	17.7	16.5	20.5	9.2	6.8	11.4	0.00	6.5	5.9	7.2	111.3	106.8	116.8
5	3.9	1.6	63.6	56.9	66.7	18.0	16.9	22.0	9.6	7.6	12.3	0.00	6.6	6.1	7.1	112.3	108.8	119.7
6	3.8	1.6	64.5	60.0	67.2	17.3	16.6	20.4	9.5	7.5	10.9	0.00	6.5	6.2	6.8	111.7	108.2	117.2
7	3.9	1.7	64.1	57.8	67.3	17.7	16.5	21.2	9.4	7.1	12.0	0.01	6.5	6.0	6.9	111.6	107.9	118.8
C.-B. 7	3.8	1.7	64.3	62.5	65.0	17.9	18.0	19.1	8.9	8.0	9.8	0.00	6.6	6.0	6.9	111.0	109.5	112.5
Alberta et C.-B.	3.9	1.7	64.2	56.9	68.3	17.7	16.2	22.0	9.2	6.8	12.3	0.00	6.6	5.9	7.2	111.3	106.8	119.7
Ouest canadien	3.9	1.7	64.2	56.9	68.3	17.7	16.2	22.0	9.0	6.4	12.8	0.00	6.7	5.9	7.3	111.0	106.2	119.7

* NS = non suffisant. Nombre insuffisant d'échantillons pour générer une valeur représentative.