

**Fonds autochtone des espèces en péril (FAEP)
Priorités régionales du volet espèces en péril¹ pour 2017-2018**

Il s'agit d'une liste simplifiée des priorités régionales du volet Espèces en péril de 2017-2018 du Fonds autochtones pour les espèces en péril (FAEP). Pour obtenir une liste plus détaillée, ainsi que les cartes et d'autres précisions telles que des renseignements sur les mesures de rétablissement propres aux espèces, veuillez communiquer avec votre coordonnateur régional du [FAEP](#).

Les priorités régionales ainsi que les priorités nationales contribuent à orienter les décisions relatives au financement. Les projets abordant des priorités régionales et/ou nationales seront classés prioritaires pour recevoir du financement. Le financement n'est toutefois pas assuré. Les priorités régionales sont indépendantes les unes des autres, autrement dit, les espèces prioritaires n'ont pas à se trouver dans un secteur prioritaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les priorités nationales de ces programmes et pour mieux comprendre comment les projets sont analysés, veuillez consulter les appels de propositions du [FAEP](#).

FAEP	Priorités pour l'habitat terrestre			Priorités pour l'habitat aquatique		
Région	Espèces	Secteurs	Menaces	Espèces	Secteurs	Menaces
Atlantique	<ul style="list-style-type: none"> • Espèces de chauves-souris inscrites à la LEP • Couleuvre mince • Tortue des bois • Pluvier siffleur (sous-espèce melodus) • Caribou des bois (pop. boréale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Plages et dunes côtières • Sud-ouest de la Nouvelle-Écosse • Riverain et fluvien – rivière St. John • Forêt boréale (Labrador) • Landes côtières et toundra arctique (Labrador) 		<ul style="list-style-type: none"> • Moules (alasmidonte renflée et lampsile jaune) • Esturgeon à museau court • Saumon atlantique (intérieur de la baie de Fundy) • Éperlan arc-en-ciel du lac Utopia • Fondule barré 		<ul style="list-style-type: none"> • Obstacles à la migration • Interactions avec les pêches : prises accessoires • Interactions avec les pêches : empêtrement • Altération de l'habitat • Espèces envahissantes ou introduites
Québec	<ul style="list-style-type: none"> • Espèces de chauves-souris en voie de disparition au Québec • Diverses espèces de tortues au Québec • Monarques • Caribou des bois (population) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zone côtière de la Basse-Côte-Nord • Érablière et sapinières à bouleau jaune de la Vallée de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue • Pessière à mousse de la forêt boréale 	<ul style="list-style-type: none"> • Perte de l'habitat • prélèvement et la cueillette 	<ul style="list-style-type: none"> • Fougère-roche gris • Béluga (estuaire du Saint-Laurent) • Méné d'herbe • Bar rayé (Saint-Laurent) • Dard de sable (Québec) 	<ul style="list-style-type: none"> • Estuaire et golfe du Saint-Laurent (incluant les tributaires utilisés par les espèces anadromes, catadromes) • Bassin hydrographique du fleuve Saint- 	<ul style="list-style-type: none"> • Prises accessoires sportives et commerciales, pêche fantôme et empêtrements • Perte et dégradation de l'habitat • Perturbations

¹ Pour obtenir la liste des priorités régionales du volet Prévention, veuillez communiquer avec votre coordonnateur régional du [FAEP](#).

	boréale)	du Nord-du-Québec <ul style="list-style-type: none"> Vallée du fleuve Saint-Laurent 			Laurent (portion fluviale) et de l'Outaouais	associées au transport et aux petites embarcations
Ontario	<ul style="list-style-type: none"> Moucherolle vert Massasauga Caribou des bois, population boréale Monarque Bruant de Henslow 	<ul style="list-style-type: none"> Péninsule Bruce Bordure du lac Huron Plaines de St-Clair Plaine du lac Iroquois Plaine sablonneuse de Norfolk 		<ul style="list-style-type: none"> Fouille-roche gris Méné camus Dard de sable Méné d'herbe Brochet vermiculé 	<ul style="list-style-type: none"> Bassin de drainage du lac Sainte-Claire Bassin hydrographique de la rivière Grand 	<ul style="list-style-type: none"> Barrages Charge en éléments nutritifs, en sédiments et en contaminants
Prairies	<ul style="list-style-type: none"> Caribou des bois (pop. boréale) Bison des bois Monarque Chauve-souris nordique et petite chauve-souris brune 	<ul style="list-style-type: none"> Prairies à herbes hautes (Man.) Bassin hydrographique de la rivière Milk (Alb.) Bassin hydrographique de la rivière Milk (Sask.) Sous-bassins hydrographiques de la rivière Saskatchewan Sud (Alb.) Fétuque de piémont (Alb.) 	<ul style="list-style-type: none"> Destruction et dégradation de vastes superficies de prairies indigènes restantes 	<ul style="list-style-type: none"> Buffalo à grande bouche Truite fardée versant de l'ouest Mulette feuille d'érable Méné d'argent de l'ouest 	<ul style="list-style-type: none"> Bassin hydrographique de la rivière Milk /rivière St. Mary Bassin hydrographique de la rivière Saskatchewan nord et sud Sud-ouest de l'Alberta (versant est) 	<ul style="list-style-type: none"> Surexploitation ou hybridation de la truite fardée versant de l'ouest Perte ou dégradation de l'habitat Perte des connaissances autochtones particulièrement celles liées à l'utilisation des habitats importants par les espèces aquatiques (c.-à-d. habitats utilisés pour l'échouerie, l'alimentation, le fraie, l'alevinage, la survie hivernale, le corridor migratoire)
Pacifique	<ul style="list-style-type: none"> Caribou des bois (population boréale et des montagnes du Sud) Chauve-souris nordique et petite chauve-souris brune Marmotte de l'île de Vancouver 	<ul style="list-style-type: none"> Zone biogéoclimatique côtière à douglas Vallée du bas Fraser de Chilliwack au delta du fleuve Fraser Zone biogéoclimatique à pin Ponderosa Zone biogéoclimatique à graminées cespiteuses Vallée de Creston 	<ul style="list-style-type: none"> Introduction et propagation des espèces envahissantes Dégradation de l'habitat essentiel et important causée par les activités récréatives 	<ul style="list-style-type: none"> Ormeau nordique Épaulards Esturgeon blanc Grandes baleines (rorqual bleu, rorqual commun et rorqual boréal) 	<ul style="list-style-type: none"> Bassin hydrographique du fleuve Fraser Bassin hydrographique du fleuve Columbia 	<ul style="list-style-type: none"> Récolte illégale (directe/indirecte) Espèces envahissantes Trafic maritime dans les secteurs de la côte nord et du centre

<p>Nord</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caribou des bois (pop. boréale) • Caribou de Peary • Chauve-souris nordique et petite chauve-souris brune 			<ul style="list-style-type: none"> • Baleine boréale (Béring-Tchouktches-Beaufort) 	<ul style="list-style-type: none"> • Secteurs d'importance pour les mammifères marins (c.-à-d. secteurs utilisés pour l'échouerie, l'alimentation, le fraie, l'alevinage, la survie hivernale, le corridor migratoire) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perte ou dégradation de l'habitat • Blessure et perte des mammifères marins • Perte des connaissances autochtones particulièrement celles lié à l'utilisation des habitats importants par les espèces aquatiques (c.-à-d. habitats utilisés pour l'échouerie, l'alimentation, le fraie, l'alevinage, la survie hivernale, le corridor migratoire)
-------------	---	--	--	---	---	---