






EleCare® (400 g)

This unilingual English-labeled product is being temporarily imported from the United States to help address the ongoing shortage of amino acid-based products in Canada. / Ce produit ayant une étiquette unilingue anglaise est importé des États-Unis de façon temporaire, afin d'aider à remédier à la pénurie actuelle de produits à base d'acides aminés au Canada.

CANADA:

1-800-670-7878 | canada.nutrition@abbott.com | <https://elecare.com/product-information/elecare>
(U.S. product website. English only./ Site Web du produit américain. En anglais seulement.)

| | ENGLISH | FRANÇAIS |
|--|--|---|
| | EleCare® | EleCare® |
| | Hypoallergenic | Hypoallergène |
| | 0-12 MONTHS | 0–12 MOIS |
| | DHA ARA | ADH ARA |
| | Amino Acid-Based Powder Infant Formula with Iron | Préparation pour nourrissons enrichie de fer, en poudre, à base d'acides aminés |
| | For Severe Food Allergies and GI Disorders | Pour les allergies alimentaires graves et les troubles gastro-intestinaux |
| | NET WT. 14.1 OZ (400 g) | POIDS NET : 14,1 OZ (400 g) |
| | Nutritionally Complete | Complet sur le plan nutritionnel |
| | For Oral and Tube Feeding | Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde |
| | Not for IV Use | Ne pas administrer par voie IV |

| <p>USE ONLY AS DIRECTED BY A PHYSICIAN Directions for Preparation and Use</p> | <p>USE ONLY AS DIRECTED BY A PHYSICIAN</p> | <p>UTILISER UNIQUEMENT SELON LES DIRECTIVES D'UN MÉDECIN</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|--|--|---------|--|-----------------|--|---------|--|---------|--|-------------------|--|---------|--|---------|--|-------------------|--|---------|--|--|--|
| <p>Your baby's health depends on carefully following these directions. Proper hygiene, handling and storage are important when preparing infant formula. Failure to follow these directions could result in severe harm. Ask your baby's doctor if you need to use cooled, boiled water for mixing and if you need to boil (sterilize) bottles, nipples and rings before use.</p>  <p>Wash your hands, surfaces and utensils Pour desired amount of water into clean bottle (see mixing guide)</p> <p>Add 1 unpacked level scoop (9.4 g) to each 2 fl oz of water Return dry scoop to can</p> <p>Cap bottle; shake well; attach nipple Once feeding begins, use within 1 hour or discard</p> <p>Storage Once mixed, store bottles in refrigerator and feed to baby within 24 hours. Store unopened or opened container at room temperature; avoid extreme temperatures. Use opened can contents within 1 month.</p> <p>Warning Powdered infant formulas are not sterile and should not be fed to premature infants or infants who might have immune problems unless directed and supervised by your baby's doctor. Never use a microwave to warm formula. Serious burns can result.</p> <p>USE BY DATE ON BOTTOM OF CAN</p> <p>MIXING GUIDE: DILUTION OF 20 CAL/FL OZ (SCOOP YIELDS 9.4 GRAMS POWDER)</p> <table border="1" data-bbox="220 446 735 535"> <tr> <td>Measure water</td> <td>+</td> <td>Add scoop(s) of UNPACKED LEVEL POWDER using enclosed scoop</td> <td>=</td> <td>Finished bottle (approx.)</td> <td>FOR MOST ACCURATE RESULTS EleCare® SHOULD BE WEIGHED ON A SCALE THAT READS IN GRAMS.</td> </tr> <tr> <td>2 fl oz</td> <td></td> <td>1 scoop (9.4 g)</td> <td></td> <td>2 fl oz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 fl oz</td> <td></td> <td>2 scoops (18.8 g)</td> <td></td> <td>4 fl oz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 fl oz</td> <td></td> <td>3 scoops (28.2 g)</td> <td></td> <td>6 fl oz</td> <td></td> </tr> </table> <p>When mixed as directed, makes approximately 95 fl oz of formula at 20 Cal/fl oz. Osmolality, prepared at 20 Cal/fl oz = 350 mOsm/kg water</p> <p>From the makers of Similac®</p>  <p>Antiox added based for those who cannot tolerate milk, soy or protein hydrolyzate formulas.</p> <p>Questions or comments? 1-800-445-5400, Eastern time, weekdays.</p> <p>For more information visit www.EleCare.com</p>  <p>© 2017 Abbott Laboratories #55251 C3499-01</p> | Measure water | + | Add scoop(s) of UNPACKED LEVEL POWDER using enclosed scoop | = | Finished bottle (approx.) | FOR MOST ACCURATE RESULTS EleCare® SHOULD BE WEIGHED ON A SCALE THAT READS IN GRAMS. | 2 fl oz | | 1 scoop (9.4 g) | | 2 fl oz | | 4 fl oz | | 2 scoops (18.8 g) | | 4 fl oz | | 6 fl oz | | 3 scoops (28.2 g) | | 6 fl oz | | <p>Directions for Preparation and Use</p> <p>Your baby's health depends on carefully following these directions. Proper hygiene, handling and storage are important when preparing infant formula. Failure to follow these directions could result in severe harm. Ask your baby's doctor if you need to use cooled, boiled water for mixing and if you need to boil (sterilize) bottles, nipples and rings before use.</p> <p><i>Note for Canadians</i> Please refer to Preparing and handling powdered infant formula - Canada.ca for more information.</p> | <p>Mode d'emploi</p> <p>Vous devez suivre les directives suivantes pour assurer la bonne santé de votre bébé. Une hygiène, une manipulation et un entreposage adéquats sont importants lors de la préparation des biberons. Ne pas respecter ces directives pourrait entraîner des complications graves. Demandez au médecin de votre bébé si vous devez utiliser de l'eau bouillie refroidie dans le mélange et faire bouillir (stériliser) les biberons, les tétines et les bagues avant leur utilisation.</p> <p><i>Note pour les Canadiens</i> Veuillez consulter la page Reconstitution et manipulation d'une préparation en poudre pour nourrissons - Canada.ca pour en savoir plus.</p> |
| Measure water | + | Add scoop(s) of UNPACKED LEVEL POWDER using enclosed scoop | = | Finished bottle (approx.) | FOR MOST ACCURATE RESULTS EleCare® SHOULD BE WEIGHED ON A SCALE THAT READS IN GRAMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 fl oz | | 1 scoop (9.4 g) | | 2 fl oz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 fl oz | | 2 scoops (18.8 g) | | 4 fl oz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 fl oz | | 3 scoops (28.2 g) | | 6 fl oz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>1. Wash your hands, surfaces and utensils. Pour desired amount of water into clean bottle (see mixing guide)</p> | <p>1. Se laver les mains, et laver les surfaces et les ustensiles qui serviront. Verser la quantité désirée d'eau dans un biberon propre (voir le guide de reconstitution).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>2. Add 1 unpacked level scoop (9.4 g) to each 2 fl oz of water. Return dry scoop to can.</p> | <p>2. Ajouter une mesurette rase et non tassée de poudre (9,4 g) par 2 oz liq. d'eau. Replacer la mesurette sèche dans la boîte.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>3. Cap bottle; shake well; attach nipple. Once feeding begins, use within 1 hour or discard.</p> | <p>3. Mettre le bouchon sur le biberon; agiter vigoureusement; fixer la tétine. Jeter toute quantité de préparation laissée dans le biberon plus d'une heure après le début de la tétée.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>STORAGE Once mixed, store bottles in refrigerator and feed to baby within 24 hours. Store unopened or opened container at room temperature; avoid extreme temperatures. Use opened can contents within 1 month.</p> | <p>CONSERVATION Réfrigérer la préparation reconstituée et donner au bébé dans les 24 heures. Conserver le contenant ouvert ou non à la température ambiante; éviter les températures extrêmes. Utiliser le produit dans le mois qui suit l'ouverture de la boîte.</p> |
| | <p>WARNING Powdered infant formulas are not sterile and should not be fed to premature infants or infants who might have immune problems unless directed and supervised by your baby's doctor. Never use a microwave to warm formula. Serious burns can result.</p> | <p>MISE EN GARDE Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne doivent être données aux nourrissons prématurés ou pouvant présenter des troubles immunitaires que selon les indications et sous la supervision du médecin de votre bébé. Ne jamais chauffer la préparation au four à micro-ondes, car il y a risque de brûlures graves.</p> |
| | <p>USE BY DATE ON BOTTOM OF CAN</p> | <p>UTILISER AVANT LA DATE INDIQUÉE SOUS LA BOÎTE</p> |

MIXING GUIDE:
DILUTION OF 20 CAL/FL OZ (SCOOP YIELDS 9.4 GRAMS POWDER)

| Measure water | + | Add scoop(s) of UNPACKED LEVEL POWDER using enclosed scoop | = | Finished bottle (approx.) |
|------------------|---|--|---|---------------------------|
| 2 fl oz (60 mL) | | 1 scoop (9.4 g) | | 2 fl oz (67 mL) |
| 4 fl oz (120 mL) | | 2 scoops (18.8 g) | | 4 fl oz (134 mL) |
| 6 fl oz (180 mL) | | 3 scoops (28.2 g) | | 6 fl oz (201 mL) |

FOR MOST ACCURATE RESULTS EleCare® SHOULD BE WEIGHED ON A SCALE THAT READS IN GRAMS.

GUIDE DE RECONSTITUTION :
DILUTION DE 20 CAL/OZ LIQ. (UNE MESURETTE DONNE 9,4 GRAMMES DE POUDRE)

| Mesurer l'eau | + | Ajouter une ou plusieurs mesurettes RASES ET NON TASSÉES DE POUDRE à l'aide de la mesurette fournie | = | Quantité approx. de préparation |
|-------------------|---|---|---|---------------------------------|
| 2 oz liq (60 mL) | | 1 mesurette (9,4 g) | | 2 oz liq (67 mL) |
| 4 oz liq (120 mL) | | 2 mesurettes (18,8 g) | | 4 oz liq (134 mL) |
| 6 oz liq (180 mL) | | 3 mesurettes (28,2 g) | | 6 oz liq (201 mL) |

POUR DES MESURES PLUS PRÉCISES, LA POUDRE EleCare® DOIT ÊTRE PESÉE SUR UNE BALANCE DONNANT LE POIDS EN GRAMMES.

When mixed as directed, makes approximately 95 fl oz of formula at 20 Cal/fl oz.

Une fois reconstitué selon les directives, ce produit donne environ 95 oz liq. de préparation à 20 Cal/oz liq.

Osmolality, prepared at 20 Cal/fl oz = 350 mOsm/kg water

Osmolalité, à 20 Cal/oz liq. = 350 mOsm/kg d'eau

From the makers of Similac®

Par les fabricants de Similac®

EleCare® **EleCare® Jr**
Amino acid-based for those who cannot tolerate milk, soy or protein hydrolysate formulas
0-12 Months **Ages 1 and up**

EleCare® **EleCare® Jr**
À base d'acides aminés, pour les enfants qui ne tolèrent pas les préparations à base de lait, de soya ou d'hydrolysate de protéines
0-12 mois **1 an et plus**

| NUTRIENTS | PER 100 Calories PER 100 g (5 fl oz Prepared as Directed) | | PER 100 Calories PER 100 g (5 fl oz Prepared as Directed) | |
|-----------------------|--|-----|--|------|
| | POWDER | | POWDER | |
| CALORIES | 475 | 100 | CARBOHYDRATE, g | 51 |
| PROTEIN EQUIVALENT, g | 14.5 | 3.1 | WATER, g | 132 |
| FAT, g | 23 | 4.8 | LINOLEIC ACID, mg | 4000 |

VITAMINS

| | | | | | |
|--|------------|----------|----------------------------------|------|------|
| VITAMIN A, IU (mcg RE) | 1300 (390) | 273 (82) | NIACIN, mcg | 8000 | 1680 |
| VITAMIN D, IU (mcg) | 285 (7.1) | 60 (1.5) | FOLIC ACID (FOLACIN), mcg | 140 | 29.5 |
| VITAMIN E, IU | 10 | 2.1 | PANTOTHENIC ACID, mcg | 2000 | 421 |
| VITAMIN K, mcg | 60 | 13 | BIOTIN, mcg | 20 | 4.2 |
| THIAMIN (VIT. B ₁), mcg | 1000 | 210 | VITAMIN C (ASCORBIC ACID), mg | 43 | 9 |
| RIBOFLAVIN (VIT. B ₂), mcg | 500 | 105 | CHOLINE, mg | 71 | 15 |
| VITAMIN B ₆ , mcg | 400 | 84.2 | INOSITOL, mg | 24 | 5.1 |
| VITAMIN B ₁₂ , mcg | 2.0 | 0.4 | | | |

MINERALS

| | | | | | |
|----------------|-----|------|---------------------|------------|-----------|
| CALCIUM, mg | 550 | 116 | IODINE, mcg | 42 | 8.9 |
| PHOSPHORUS, mg | 400 | 84.2 | SELENIUM, mcg | 12.6 | 2.6 |
| MAGNESIUM, mg | 40 | 8.4 | CHROMIUM, mcg | 11 | 2.3 |
| IRON, mg | 8.4 | 1.8 | MOLYBDENUM, mcg | 12 | 2.5 |
| ZINC, mg | 5.5 | 1.15 | SODIUM, mg (mEq) | 215 (9.4) | 45 (2.0) |
| MANGANESE, mcg | 400 | 84 | POTASSIUM, mg (mEq) | 715 (18.3) | 150 (3.9) |
| COPPER, mcg | 595 | 126 | CHLORIDE, mg (mEq) | 285 (8.0) | 60 (1.7) |

INGREDIENTS: CORN SYRUP SOLIDS (55%), HIGH OLEIC SAFFLOWER OIL (9%), MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES (8%), SOY OIL (7%), L-GLUTAMINE (2%); **LESS THAN 2% OF:** C. COHNII OIL, M. ALPINA OIL, L-ASPARAGINE, L-LEUCINE, L-LYSINE ACETATE, DATEM, CALCIUM PHOSPHATE, L-VALINE, POTASSIUM PHOSPHATE, L-ISOLEUCINE, L-ARGININE, L-PHENYLALANINE, L-TYROSINE, L-THREONINE, POTASSIUM CITRATE, SODIUM CITRATE, L-PROLINE, L-SERINE, L-ALANINE, GLYCINE, L-HISTIDINE, L-METHIONINE, ASCORBIC ACID, MAGNESIUM CHLORIDE, CALCIUM CARBONATE, L-CYSTEINE DIHYDROCHLORIDE, L-TRYPTOPHAN, SALT, CHOLINE CHLORIDE, INOSITOL, FERROUS SULFATE, TAURINE, ASCORBYL PALMITATE, ZINC SULFATE, dl-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE, L-CARNITINE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, COPPER SULFATE, MANGANESE SULFATE, VITAMIN A PALMITATE, RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, FOLIC ACID, BETA-CAROTENE, BIOTIN, PHYLLIOQUINONE, CHROMIUM CHLORIDE, POTASSIUM IODIDE, SODIUM SELENATE, SODIUM MOLYBDATE, VITAMIN D₃ AND VITAMIN B₁₂.

Abbott Nutrition
Abbott Laboratories
Columbus, Ohio 43219-3034 USA

C. COHNII OIL IS A SOURCE OF DHA. M. ALPINA OIL IS A SOURCE OF ARA.

| NUTRIENTS | PER 100 g POWDER | PER 100 Calories (5 fl oz Prepared as Directed) |
|---|---------------------|--|
| CALORIES | 475 | 100 |
| PROTEIN EQUIVALENT, g | 14.5 | 3.1 |
| FAT, g | 23 | 4.8 |
| CARBOHYDRATE, g | 51 | 10.7 |
| WATER, g | - | 132 |
| LINOLEIC ACID, mg | 4000 | 840 |
| VITAMINS | | |
| VITAMIN A, IU (mcg RE) | 1300 (390) | 273 (82) |
| VITAMIN D, IU (mcg) | 285 (7.1) | 60 (1.5) |
| VITAMIN E, IU | 10 | 2.1 |
| VITAMIN K, mcg | 60 | 13 |
| THIAMIN (VIT. B ₁), mcg | 1000 | 210 |
| RIBOFLAVIN (VIT. B ₂), mcg | 500 | 105 |
| VITAMIN B ₆ , mcg | 400 | 84.2 |
| VITAMIN B ₁₂ , mcg | 2.0 | 0.4 |
| NIACIN, mcg | 8000 | 1680 |
| FOLIC ACID (FOLACIN), mcg | 140 | 29.5 |
| PANTOTHENIC ACID, mcg | 2000 | 421 |
| BIOTIN, mcg | 20 | 4.2 |
| VITAMIN C (ASCORBIC ACID), mg | 43 | 9 |
| CHOLINE, mg | 71 | 15 |
| INOSITOL, mg | 24 | 5.1 |
| MINERALS | | |
| CALCIUM, mg | 550 | 116 |
| PHOSPHORUS, mg | 400 | 84.2 |
| MAGNESIUM, mg | 40 | 8.4 |
| IRON, mg | 8.4 | 1.8 |
| ZINC, mg | 5.5 | 1.15 |

| NUTRIMENTS | PAR 100 g DE POUDRE | PAR 100 Calories (5 oz liq. préparées selon les directives) |
|--|---------------------------|--|
| CALORIES | 475 | 100 |
| ÉQUIVALENT DE PROTÉINES, g | 14,5 | 3,1 |
| LIPIDES, g | 23 | 4,8 |
| GLUCIDES, g | 51 | 10,7 |
| EAU, g | - | 132 |
| ACIDE LINOLÉIQUE, mg | 4000 | 840 |
| VITAMINES | | |
| VITAMINE A, IU (mcg RE) | 1300 (390) | 273 (82) |
| VITAMINE D, IU (mcg) | 285 (7,1) | 60 (1,5) |
| VITAMINE E, IU | 10 | 2,1 |
| VITAMINE K, mcg | 60 | 13 |
| THIAMINE (VIT. B ₁), mcg | 1000 | 210 |
| RIBOFLAVINE (VIT. B ₂), mcg | 500 | 105 |
| VITAMINE B ₆ , mcg | 400 | 84,2 |
| VITAMINE B ₁₂ , mcg | 2,0 | 0,4 |
| NIACINE, mcg | 8000 | 1680 |
| ACIDE FOLIQUE (FOLACINE), mcg | 140 | 29,5 |
| ACIDE PANTOTHÉNIQUE, mcg | 2000 | 421 |
| BIOTINE, mcg | 20 | 4,2 |
| VITAMINE C (ACIDE ASCORBIQUE), mg | 43 | 9 |
| CHOLINE, mg | 71 | 15 |
| INOSITOL, mg | 24 | 5,1 |
| MINÉRAUX | | |
| CALCIUM, mg | 550 | 116 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|------------|-----------|
| MANGANESE, mcg | 400 | 84 | PHOSPHORE, mg | 400 | 84,2 |
| COPPER, mcg | 599 | 126 | MAGNÉSIUM, mg | 40 | 8,4 |
| IODINE, mcg | 42 | 8.9 | FER, mg | 8,4 | 1,8 |
| SELENIUM, mcg | 12.6 | 2.6 | ZINC, mg | 5,5 | 1,15 |
| CHROMIUM, mcg | 11 | 2.3 | MANGANÈSE, mcg | 400 | 84 |
| MOLYBDENUM, mcg | 12 | 2.5 | CUIVRE, mcg | 599 | 126 |
| SODIUM, mg (mEq) | 215 (9.4) | 45 (2.0) | IODE, mcg | 42 | 8,9 |
| POTASSIUM, mg (mEq) | 715 (18.3) | 150 (3.9) | SÉLÉNIUM, mcg | 12,6 | 2,6 |
| CHLORIDE, mg (mEq) | 285 (8.0) | 60 (1.7) | CHROME, mcg | 11 | 2,3 |
| Additional information for Canada: | | | MOLYBDÈNE, mcg | 12 | 2,5 |
| LINOLENIC ACID, mg | 400 | 84 | SODIUM, mg (mEq) | 215 (9,4) | 45 (2,0) |
| ARACHIDONIC ACID (ARA), mg | 102 | 21.5 | POTASSIUM, mg (mEq) | 715 (18,3) | 150 (3,9) |
| DOCOSAHEXAENOIC ACID (DHA), mg | 38 | 8 | CHLORURE, mg (mEq) | 285 (8,0) | 60 (1,7) |
| CARNITINE, mg | 11 | 2.32 | Information supplémentaire pour le Canada: | | |
| TAURINE, mg | 27.7 | 5.83 | ACIDE LINOLÉNIQUE, mg | 400 | 84 |
| | | | ACIDE ARACHIDONIQUE (ARA), mg | 102 | 21,5 |
| | | | ACIDE DOCOSAHEXAÉNOÏQUE (ADH), mg | 38 | 8 |
| | | | CARNITINE, mg | 11 | 2,32 |
| | | | TAURINE, mg | 27,7 | 5,83 |
| INGREDIENTS: CORN SYRUP SOLIDS (55%), HIGH OLEIC SAFFLOWER OIL (9%), MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES (8%), SOY OIL (7%), L-GLUTAMINE (2%); LESS THAN 2% OF: C. COHNII OIL, M. ALPINA OIL, L-ASPARAGINE, L-LEUCINE, L-LYSINE ACETATE, DATEM, CALCIUM PHOSPHATE, L-VALINE, POTASSIUM PHOSPHATE, L-ISOLEUCINE, L-ARGININE, L-PHENYLALANINE, L-TYROSINE, L-THREONINE, POTASSIUM CITRATE, SODIUM CITRATE, L-PROLINE, L-SERINE, L-ALANINE, GLYCINE, L-HISTIDINE, L-METHIONINE, ASCORBIC ACID, | | | INGRÉDIENTS: SOLIDES DU SIROP DE MAÏS (55%), HUILE DE CARTHAME À TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE OLÉIQUE (9%), TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE MOYENNE (8%), HUILE DE SOYA (7%), L-GLUTAMINE (2%); MOINS DE 2% DE: HUILE DE C. COHNII, HUILE DE M. ALPINA, L-ASPARAGINE, L-LEUCINE, ACÉTATE DE L-LYSINE, ESTERS TARTRIQUES DES MONO- ET DIGLYCÉRIDES ACÉTYLÉS, PHOSPHATE DE CALCIUM, L-VALINE, PHOSPHATE DE POTASSIUM, L-ISOLEUCINE, L-ARGININE, L-PHÉNYLALANINE, L-TYROSINE, L- | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>MAGNESIUM CHLORIDE, CALCIUM CARBONATE, L-CYSTINE DIHYDROCHLORIDE, L-TRYPTOPHAN, SALT, CHOLINE CHLORIDE, INOSITOL, FERROUS SULFATE, TAURINE, ASCORBYL PALMITATE, ZINC SULFATE, dl-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE, L-CARNITINE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, COPPER SULFATE, MANGANESE SULFATE, VITAMIN A PALMITATE, RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, FOLIC ACID, BETA-CAROTENE, BIOTIN, PHYLLIQUINONE, CHROMIUM CHLORIDE, POTASSIUM IODIDE, SODIUM SELENATE, SODIUM MOLYBDATE, VITAMIN D₃ AND VITAMIN B₁₂.</p> | <p>THRÉONINE, CITRATE DE POTASSIUM, CITRATE DE SODIUM, L-PROLINE, L-SÉRINE, L-ALANINE, GLYCINE, L-HISTIDINE, L-MÉTHIONINE, ACIDE ASCORBIQUE, CHLORURE DE MAGNÉSIUM, CARBONATE DE CALCIUM, DICHLORHYDRATE DE L-CYSTINE, L-TRYPTOPHANE, SEL, CHLORURE DE CHOLINE, INOSITOL, SULFATE FERREUX, TAURINE, PALMITATE D'ASCORBYLE, SULFATE DE ZINC, ACÉTATE DE DL-ALPHA-TOCOPHÉRYLE, L-CARNITINE, NICOTINAMIDE, PANTOTHÉNATE DE CALCIUM, CHLORHYDRATE DE THIAMINE, SULFATE DE CUIVRE, SULFATE DE MANGANÈSE, PALMITATE DE VITAMINE A, RIBOFLAVINE, CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE, ACIDE FOLIQUE, BÊTA-CAROTÈNE, BIOTINE, PHYLLIQUINONE, CHLORURE DE CHROME, IODURE DE POTASSIUM, SÉLÉNATE DE SODIUM, MOLYBDATE DE SODIUM, VITAMINE D₃ ET VITAMINE B₁₂.</p> |
| | <p>Abbott Nutrition Abbott Laboratories Columbus, Ohio 43219-3034 USA</p> | <p>Abbott Nutrition Abbott Laboratories Columbus, Ohio 43219-3034 États-Unis</p> |
| | <p>C. COHNII OIL IS A SOURCE OF DHA. M. ALPINA OIL IS A SOURCE OF ARA</p> | <p>L'HUILE DE C. COHNII EST UNE SOURCE D'ADH. L'HUILE DE M. ALPINA EST UNE SOURCE D'ARA.</p> |