

Comment reconnaître une surdose d'opioïdes

Quiconque utilise des opioïdes, même en petite quantité, risque une surdose.

Le fentanyl et d'autres substances dangereuses sont mélangés à d'autres drogues ou vendus en tant que drogues comme l'héroïne, l'oxycodone, la cocaïne et l'ecstasy/MDMA.

SIGNES D'UNE SURDOSE D'OPIOÏDES



Lèvres ou ongles bleus



Étourdissements et confusion



Incapacité à se réveiller



Bruits de suffocation, gargouillements ou ronflements



Respiration lente, faible ou inexistante



Somnolence ou difficulté à rester éveillé

VOUS SOUPÇONNEZ UNE SURDOSE?

Appelez le **911** ou votre numéro d'urgence local

Demandez de **L'AIDE** au personnel du festival

Administrez de la **NALOXONE** si vous en avez

DEMEUREZ avec la personne jusqu'à l'arrivée des secours

La Loi sur les bons samaritains peut vous protéger contre des simples accusations de possession. Vous avez le pouvoir de sauver une vie.

Ensemble, nous pouvons mettre **#FinAuxSurdoses**

**SOYEZ
AU FAIT**

DROGUES : OBTENEZ LES FAITS.
CONNAISSEZ LES RISQUES.

Renseignez-vous sur Canada.ca/Opioides



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

Canada