

# Comment reconnaître une surdose d'opioïdes

Quiconque utilise des opioïdes, même en petite quantité, risque une surdose.

Le fentanyl et d'autres substances dangereuses sont mélangés à d'autres drogues ou vendus en tant que drogues comme l'héroïne, l'oxycodone, la cocaïne et l'ecstasy/MDMA.

## SIGNES D'UNE SURDOSE D'OPIOÏDES



Lèvres ou ongles bleus ou gris

Étourdissements et confusion

Incapacité à se réveiller



Bruits de suffocation, gargouillements ou ronflements

Respiration lente, faible ou inexistante

Somnolence ou difficulté à rester éveillé

## VOUS SOUPÇONNEZ UNE SURDOSE?

Appelez le **911** ou votre numéro d'urgence local

Administrez de la **NALOXONE** si vous en avez

**DEMEUREZ** avec la personne jusqu'à l'arrivée des secours

Même si vous avez pris de la drogue ou en avez sur vous, la *Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose* vous offre une certaine protection juridique.

Ensemble, nous pouvons mettre  
**#FinAuxSurdoses**

Renseignez-vous sur **Canada.ca/Opioides**

**SOYEZ AU FAIT**

DROGUES : OBTENEZ LES FAITS.  
CONNASSEZ LES RISQUES.



Santé Canada

Health Canada