

**Apports alimentaires (ng/kg de poids corporel/jour) de biphényles polychlorés (BPC) totale chez les Canadiens de différents groupes d'âge-sexe, Étude de la diète totale à Montreal, 1993**

| Groupes d'âge-sexe                         | Dietary intake<br>(ng/kg bw/day) |
|--|----------------------------------|
| 0-1 mois, garçons et filles                | 23.79                            |
| 2-3 mois, garçons et filles                | 16.60                            |
| 4-6 mois, garçons et filles                | 20.54                            |
| 7-9 mois, garçons et filles                | 17.60                            |
| 9-12 mois, garçons et filles               | 14.38                            |
| 1-4 ans, garçons et filles                 | 17.40                            |
| 5-11 ans, garçons et filles                | 11.28                            |
| 12-19 ans, garçons                         | 7.63                             |
| 20-39 ans, hommes                          | 6.73                             |
| 40-64 ans, hommes                          | 5.05                             |
| 65+ ans, hommes                            | 4.53                             |
| 12-19 ans, filles                          | 6.04                             |
| 20-39 ans, femmes                          | 5.16                             |
| 40-64 ans, femmes                          | 4.58                             |
| 65+ ans, femmes                            | 3.17                             |
| Tous les âges Canadien,<br>homes et femmes | 5.44                             |