

Ratio iode-créatinine dans l'urine (mmol iode/mmol créatinine)

Moyenne et percentiles choisis de la concentration dans l'urine, en fonction du sexe et des groupes d'âge des ANREF, population canadienne à domicile, Enquête canadienne sur les mesures de la santé, de 2007 à 2009

Sexe	Groupe d'âge	n	Moyenne (Intervalle de confiance à 95 %)	Percentiles choisis (Intervalle de confiance à 95 %)						
				5 ^e	10 ^e	25 ^e	50 ^e	75 ^e	90 ^e	95 ^e
Masculin	9-13	436	255 (208-303)	66 (55-78)	83 (69-97)	113 (99-127)	175 (146-203)	286 (231-342)	457 (297-617)	747^E (362-1131)
	14-18	293	155 (128-182)	41 (36-46)	49 (40-58)	70 (59-80)	114 (83-144)	196 (157-236)	274 (224-325)	373 (272-474)
	19-30	283	143 (104-183)	34 (29-39)	40 (29-50)	60 (46-74)	91 (66-115)	155 (138-171)	231 (163-298)	F
	31-50	634	152 (134-170)	36 (33-39)	45 (39-51)	64 (55-73)	99 (88-109)	169 (145-193)	317 (249-386)	460 (311-608)
	51-70	544	177 (137-216)	49 (36-63)	55 (49-61)	79 (69-89)	123 (103-142)	196 (169-223)	333^E (200-465)	490 (324-657)
	71-79	174	259 (176-342)	56 (47-65)	67 (54-79)	83 (69-97)	129 (99-159)	215 (168-262)	349 (222-476)	761^E (315-1206)
	19-79	1635	164 (142-186)	36 (32-40)	48 (42-54)	69 (62-76)	107 (97-116)	176 (156-197)	304 (231-376)	461 (323-600)
Féminin	9-13	393	216 (187-245)	58 (38-78)	70 (54-87)	102 (85-119)	170 (152-188)	255 (209-300)	369 (270-468)	556 (404-709)
	14-18	288	160 (131-188)	43 (39-48)	53 (41-65)	78 (67-89)	113 (95-131)	179 (151-206)	334^E (212-456)	428 (310-546)
	19-30	314	163 (137-189)	44 (41-47)	50 (43-57)	72 (61-83)	116 (99-134)	190 (157-222)	347 (253-441)	494 (354-634)
	31-50	761	198 (170-227)	55 (43-66)	69 (60-78)	94 (82-105)	140 (122-159)	220 (189-252)	393 (282-503)	540 (442-638)
	51-70	566	238 (203-273)	58 (46-69)	77 (61-93)	117 (100-134)	174 (144-205)	278 (236-320)	426 (296-557)	598 (470-726)
	71-79	176	353 (276-430)	83^E (50-117)	102 (76-128)	146 (113-179)	238 (153-322)	434 (339-528)	593 (406-780)	767 (715-819)
	19-79	1817	213 (193-233)	51 (46-57)	65 (58-71)	96 (88-103)	149 (137-161)	247 (221-272)	431 (362-500)	569 (505-633)

Source des données : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1

E Donnée avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %; à utiliser avec prudence

F Donnée avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimée en raison de la variabilité extrême de l'échantillonnage

Remarques

Population à domicile âgée de 9 à 79 ans, à l'exception des personnes à qui les critères d'exclusion s'appliquent. Pour en savoir davantage sur les critères d'exclusion, consultez le [Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé \(ECMS\) : cycle 1](#).

Les poids « bootstrap » compris dans l'ensemble de données ont servi à évaluer l'intervalle de confiance à 95 % pour toutes les moyennes et tous les percentiles en supposant une distribution de Student à 11 degrés de liberté.