

Vitamine B₁₂ dans le sérum (picomol/l)

Moyenne et percentiles choisis de la concentration dans le sérum, en fonction du sexe et des groupes d'âge des ANREF, population canadienne à domicile, Enquête canadienne sur les mesures de la santé de 2007 à 2009

Sexe	Groupe d'âge	n	Moyenne (Intervalle de confiance à 95 %)	Percentiles choisis (Intervalle de confiance à 95 %)						
				5 ^e	10 ^e	25 ^e	50 ^e	75 ^e	90 ^e	95 ^e
Masculin	9-13	390	402 (374-429)	204 (185-223)	226 (204-248)	289 (266-313)	373 (330-416)	502 (466-537)	608 (568-648)	658 (636-679)
	14-18	279	359 (327-390)	173 (142-204)	204 (178-230)	244 (218-269)	325 (295-354)	467 (399-534)	569 (509-630)	616 (576-656)
	19-30	292	326 (306-347)	171 (150-192)	192 (181-202)	233 (206-261)	299 (283-316)	392 (352-432)	517 (470-564)	557 (476-639)
	31-50	650	326 (310-342)	153 (130-176)	179 (165-193)	234 (220-248)	298 (284-312)	402 (366-438)	529 (479-579)	591 (549-633)
	51-70	537	310 (297-323)	143 (128-158)	165 (152-177)	200 (180-220)	280 (258-301)	389 (368-411)	508 (473-544)	598 (548-649)
	71-79	170	331 (301-362)	155 (139-170)	179 (158-201)	223 (200-247)	303 (258-348)	419 (338-499)	550 (486-614)	571 (535-607)
	19-79	1649	322 (313-331)	154 (143-165)	178 (172-184)	224 (210-237)	295 (285-305)	393 (377-409)	520 (490-550)	588 (566-611)
Féminin	9-13	361	414 (398-430)	199 (174-224)	230 (209-250)	306 (266-346)	411 (390-431)	519 (483-555)	615 (584-646)	669 (632-705)
	14-18	285	326 (295-357)	127 (96-158)	152 (128-177)	224 (194-255)	287 (253-321)	410 (336-484)	573 (473-673)	624 (569-679)
	19-30	333	304 (282-326)	143 (126-160)	154 (138-171)	195 (181-210)	269 (245-293)	401 (351-450)	512 (442-581)	578 (513-643)
	31-50	756	342 (315-368)	141 (124-158)	167 (138-195)	222 (202-243)	307 (277-337)	457 (407-506)	571 (535-608)	626 (569-682)
	51-70	557	357 (344-370)	157 (140-173)	187 (172-201)	223 (215-231)	322 (298-345)	464 (422-506)	585 (566-604)	652 (628-675)
	71-79	169	392 (350-434)	136 (104-168)	168 (126-209)	238 (187-290)	361 (293-429)	545 (493-597)	632 (602-662)	669 (628-710)
	19-79	1815	341 (326-356)	143 (133-153)	169 (155-184)	217 (209-225)	304 (281-328)	448 (420-477)	574 (558-590)	630 (609-650)

Source des données : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1

Remarques

Population à domicile âgée de 9 à 79 ans, à l'exception des personnes à qui les critères d'exclusion s'appliquent. Pour en savoir davantage sur les critères d'exclusion, consultez le [Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé \(ECMS\) : cycle 1](#).

Les poids « bootstrap » compris dans l'ensemble de données ont servi à estimer l'intervalle de confiance à 95 % pour toutes les moyennes et tous les percentiles, en supposant une distribution de Student à 11 degrés de liberté.

Un immunoessai compétitif d'activité enzymatique par chimiluminescence (Immulite® 2000 DPC) a servi à mesurer les niveaux de vitamine B₁₂ dans le sérum.

Une valeur égale à la moitié de la limite de détection a été attribuée aux mesures se trouvant sous la limite. La limite de détection est de 111 pmol/l.