

Programmes de vaccination de routine et de rattrapage des provinces et territoires pour les nourrissons et les enfants au Canada (en date d'avril 2026)

Ce tableau résume les calendriers de vaccination de routine pour les nourrissons et les enfants de toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Il est mis à jour régulièrement en collaboration avec le Comité canadien d'immunisation (CCI).

VACCINS		Calendriers de vaccination provinciaux et territoriaux												
Abréviations	Description	CB	AB	SK	MB	ON	QC ²	NB	NE	IPE	TNL	YN	TNO	NU
DCaT-VPI-Hib	Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio (vaccin inactivé) et Haemophilus influenzae type B	Âge: 18 mois	Âge: 18 mois	Âge: 2,4,6,18mois	Âge: 2,4,6,18mois	Âge: 2,4,6,18mois	Âge: 12mois	Âge: 2,4,6,18mois	Âge: 2,4,6,18mois	Âge: 18 mois	Âge: 2,4,6,18mois	Âge: 18 mois	Age: 2,4,6,18 mos	Âge: 2,4,6,18 mois
DCaT-HB-VPI-Hib	Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l'hépatite B, la polio (vaccin inactivé) et Haemophilus influenzae type B	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6 ans				Âge: 2,4 mois			Âge: 2,4,6 mois		Âge: 2,4,6 mois		
dcaT-VPI	Vaccin contre la diphtérie (dose réduite), la coqueluche (dose réduite), le tétanos et la polio (vaccin inactive)	Âge: 4-6 ans	Âge: 4 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-5 ans	Âge: 4-6ans ³	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-6ans ³	Âge: 4-6 ans
dcaT	Vaccin contre la diphtérie (dose réduite), la coqueluche acellulaire (dose réduite) et le tétanos	9 ^e année	9 ^e année	8 ^e année	8 ^e année ou 9 ^e année	Âge: 14-16ans		7 ^e année	7 ^e année	9 ^e année	7 ^e et 8 ^e année	9 ^e année	7 ^e année	6 ^e année
dT	Vaccin contre la diphtérie (dose réduite) et le tétanos						Secondaire 3							
BCG	Vaccin Bacille de Calmette-Guérin												Âge: 1 mois	Âge: 1 mois
HAHB	Vaccin contre les hépatites A et B						Âge: 18 mois							
HA	Vaccin contre l'hépatite A	Âge: 6, 18 mois, Enfants autochtones seulement					4 ^e année du primaire							
HB	Vaccin contre l'hépatite B	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 3 doses (DCaT- HB-VPI-Hib)	6 ^e année (2 doses) (rattrapage)	6 ^e année (2 doses)	6 ^e année (2 doses)	7 ^e année (2 doses)	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 2 doses (DCaT-HB- VPI-Hib) Un vaccin HAHB à 18 mois	Âge: À la naissance, 2,6 mois	7 ^e année (2 doses)	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 3 doses (DCaT- HB-VPI-Hib)	6 ^e année (2 doses)	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 3 doses (DCaT-HB- VPI-Hib)	Âge: À la naissance, 1,6 mois	Âge: À la naissance, 1,9 mois
RRO	Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons	Âge: 12 mois				Âge: 12mois						Âge: 12mois		
Var	Vaccin contre la varicelle	Âge: 12 mois				Âge: 15mois						Âge: 12mois		6 ^e année (rattrapage)
RRO-V	Vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle	Âge: 4-6 ans (2 ^e dose)	Âge: 12, 18 mois	Âge: 12,18mois	Âge: 12 mois, 4-6 ans	Âge: 4-6 ans (2 ^e dose)	Âge: 12,18mois	Âge: 12,18mois	Âge: 12mois, 18 mois	Âge: 12,18mois	Âge: 12,18mois	Âge: 4-6 ans (2 ^e dose)	Âge: 12,18mois	Âge: 12-18 mois
Men-C-C	Vaccins monovalents conjugués contre le méningocoque	Âge: 2,12 mois	Âge: 4,12 mois	Âge: 12 mois		Âge: 12 mois	Âge: 18 mois	Âge: 12mois	Âge: 12 mois	Âge: 12 mois	Âge: 12 mois	Âge: 2,12 mois		Âge: 12 mois
Men-C-ACYW-135	Vaccins quadrivalent conjugué contre le méningocoque	9 ^e année	9 ^e année	8 ^e année	Âge: 12 mois et 6 ^e année	7 ^e année	Secondaire 3	9 ^e année	7 ^e année	9 ^e année	4 ^e année	9 ^e année	Âge: 2,12 mois et 12 ^e année ⁴	9 ^e année
Pneu-C-20	Vaccin conjugué contre le pneumocoque 20 valent	Âge: 2,4,12 mois												Âge: 2,4,6,15 mois
Pneu-C-15	Vaccin conjugué contre le pneumocoque 15 valent		Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2, 4, et 12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,6,18mois	

Rota	Vaccin contre le rotavirus ⁴	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6 mois
VPH	Vaccins contre le virus du papillome humain	6 ^e année (1 dose)	6 ^e année (2 doses)	6 ^e année (2 doses)	6 ^e année (2 doses)	7 ^e année (2 doses)	4 ^e année (1 dose)	7 ^e année (1 dose)	7 ^e année (2 doses)	6 ^e année (2 doses)	6 ^e année (2 doses)	6 ^e année (1 dose)	4 ^e , 5 ^e ou 6 ^e année (2 doses)	6 ^e année (1 dose)
Inf	Vaccins contre la grippe	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Non recommandé mais offert annuellement aux 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus
VRS	Anticorps monoclonaux contre virus respiratoire syncytial (ceci n'est pas un vaccin)			Tous les nourrissons nés pendant la saison du VRS (du 1 ^{er} octobre au 31 mars)	Tous les nourrissons nés pendant la saison du VRS (du 1 ^{er} octobre au 31 mars)	Tous les nourrissons nés le 1 ^{er} avril ou après et âgés de moins de 8 mois au moment de la vaccination	Tous les nourrissons nés à partir du 1 ^{er} avril de l'année en cours			Tous les nourrissons nés le 1 ^{er} avril ou après et âgés de moins de 8 mois au moment de la vaccination	Nourrissons et enfants à risque élevé de maladie grave causée par le VRS	Tous les nourrissons (<9 mois) entrant dans la saison du VRS ou nés pendant celle-ci	Tous les nourrissons de 0 à 3 mois entrant dans la saison du VRS ou nés pendant celle-ci	Tous les nourrissons à la naissance

LÉGENDE	
Abbréviation/ note de bas de page	Définition
1	Si l'enfant poursuit ses études postsecondaires ou les recrues militaires qui vivront dans un milieu de vie collectif.
2	Un programme de mise à jour du carnet vaccinal est en place en 3 ^e année du secondaire au Québec. Ce programme inclut la mise à jour de la vaccination pour l'ensemble des maladies suivantes : la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, les oreillons, les infections à méningocoque de sérogroupe C, la varicelle, l'hépatite A, l'hépatite B et les infections à VPH. Programme de rattrapage temporaire : Veuillez également noter que les enfants en quatrième année d'école primaire seront vaccinés contre l'hépatite A.
3	Le DCaT-VPI-Hib peut être remplacé par le dcaT-VPI en période de rupture de stocks pour les enfants de 4 à 6 ans.
4	Deux vaccins contre le rotavirus sont autorisés au Canada : Rotarix (2 doses) et RotaTeq (3 doses).
	Le vaccin n'est pas financé par les fonds publics dans cette province ou ce territoire.