## Programmes de vaccination de routine et de rattrapage des provinces et territoires pour les nourrissons et les enfants au Canada (en date de septembre 2025)

Ce tableau résume les calendriers de vaccination de routine pour les nourrissons et les enfants de toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Il est mis à jour régulièrement en collaboration avec le Comité canadien d'immunisation (CCI).

	VACCINS	Calendriers de vaccination provinciaux et territoriaux												
Abréviations	Description	СВ	AB	SK	MB	ON	QC <sup>2</sup>	NB	NE	IPE	TNL	YN	TNO	NU
DCaT-VPI-Hib	Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche , le tétanos, la polio (vaccin inactivé) et Haemophilus influenzae type B	Âge: 18 mois	Âge: 18mois	Âge: 2,4,6,18mois	Âge: 2,4,6,18mois	Âge: 2,4,6,18mois	Âge: 12mois	Âge: 2,4,6,18 mois	Âge: 2,4,6,18 mois	Âge: 18mois	Âge: 2,4,6,18mois	Âge: 18mois	Age: 2,4,6,18mos	Âge: 2,4,6,18 mois
DCaT-HB-VPI-Hib	Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche , le tétanos, l'hépatite B, la polio (vaccin inactivé) et Haemophilus influenzae type B	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6ans				Âge: 2,4mois			Âge: 2,4,6mois		Âge: 2,4,6mois		
dcaT-VPI	Vaccin contre la diphtérie (dose réduite), la coqueluche (dose réduite), le tétanos et la polio (vaccin inactive)	Âge: 4-6 ans	Âge: 4 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-6ans	Âge: 4-6ans	Âge: 4 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-5 ans	Âge: 4-6ans³	Âge: 4-6ans	Âge: 4-6ans³	Âge: 4-6 ans
dcaT	Vaccin contre la diphtérie (dose réduite), la coqueluche acellulaire (dose réduite) et le tétanos	9 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	8 <sup>e</sup> année	8º année ou 9º année	Âge: 14-16ans		7 <sup>e</sup> année	7 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	8 <sup>e</sup> et 9 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	7 <sup>e</sup> année	6 <sup>e</sup> année
dT	Vaccin contre la diphtérie (dose réduite) et le tétanos						Secondaire 3							
BCG	Vaccin Bacille de Calmette-Guérin												Âge: 1 mois	Âge: 1 mois
НАНВ	Vaccin contre les hépatites A et B						Âge: 18mois							
НА	Vaccin contre l'hépatite A	Âge: 6, 18 mois, Enfants autochtones seulement					4 <sup>e</sup> année du primaire							
НВ	Vaccin contre l'hépatite B	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 3 doses (DCaT- HB-VPI- Hib)	(2doses) 6 <sup>e</sup> année	(2doses) 6ºannée	(2doses) 6º année	(2doses) 7 <sup>e</sup> année	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 2 doses (DCaT-HB- VPI-Hib) Unvaccin HAHB à 18 mois	Âge: À la naissance, 2,6 mois	(2doses) 7 <sup>e</sup> année	Administré aux nourrissons avec unvaccin combiné à 3 doses (DCaT- HB-VPI-Hib)	(2doses) 6 <sup>e</sup> année	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 3 doses (DCaT-HB- VPI-Hib)	Âge: Àla naissance, 1,6 mois	Âge: À la naissance, 1,9 mois
RRO	Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons	Âge: 12 mois				Âge: 12mois						Âge: 12mois		
Var	Vaccin contre la varicelle	Âge: 12 mois				Âge: 15mois	Âge: 4-6ans					Âge: 12mois		6 <sup>e</sup> année
RRO-V	Vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle	2 <sup>e</sup> dose Âge: 4-6 ans	Âge: 12, 18 mois	Âge: 12,18mois	Âge: 12 mois,4-6 ans	2 <sup>e</sup> dose Âge: 4-6 ans	Âge: 12,18mois	Âge: 12,18mois	Âge: 12 mois,18 mois	Âge: 12,18mois	Âge: 12,18mois	(2 <sup>e</sup> dose) Âge:4-6 ans	Âge: 12,18mois	Âges 12-18 mois
Men-C-C	Vaccins monovalents conjugués contre le méningocoque	Âge: 2,12 mois	Âge: 4,12mois	Âge: 12mois		Âge: 12mois	Âge: 18 mois	Âge: 12mois	Âge: 12mois	Âge: 12mois	Âge: 12mois	Âge: 2,12mois	Âge: 2,12mois	Âge: 12 mois
Men-C-ACYW-135	Vaccins quadrivalent conjugué contre le méningocoque	9 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	8 <sup>e</sup> année	Âge: 12mois et 6 <sup>e</sup> année	7 <sup>e</sup> année	Secondaire 3	9 <sup>e</sup> année	7 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	4 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	12 <sup>e</sup> année <sup>1</sup>	9 <sup>e</sup> année
Pneu-P-23	Vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque													Âge: 2-3 ans
Pneu-C-13	Vaccin conjugué contre le pneumocoque 13 valent	Âge: 2,4,12 mois									Âge: 2,4,12 mois			Âge: 2,4,6,15 mois
Pneu-C-15	Vaccin conjugué contre le pneumocoque 15 valent		Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2, 4, et 12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois		Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,6,18mois	





Rota	Vaccin contre le rotavirus⁴	Âge: 2 et 4 mois	Âge: 2 et 4 mois	Âge: 2, 4 et 6 mois	Âge: 2 et 4 mois	Âge: 2 et 4 mois	Âge: 2 et 4 mois	Âge: 2,4 et 6 mois	Âge: 2,4 et 6 mois	Âge: 2,4 et 6 mois	Âge: 2 et 4 mois	Âge: 2,4 et 6 mois	Âge: 2, 4 et 6 mois	Âge: 2, 4 et 6 mois
VPH	Vaccins contre le virus du papillome humain	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2doses) 6 <sup>e</sup> année	(2doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2doses) 7º année	(1 dose ) 4 <sup>e</sup> année	(1 dose) 7 <sup>e</sup> année	(2 doses) 7 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(1 dose) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 4 <sup>e</sup> , 5 <sup>e</sup> ou 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année
Inf	Vaccins contre la grippe	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Non recommandé mais offert annuellement aux 6 mois et plus	Âge: 6mois et plus	Âge: 6mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus
VRS	Anticorps monoclonaux contre virus respiratoire syncitial (ceci n'est pas un vaccin)			Tos les nourrissons nés pendant la saison du VRS (du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 mars)		Tous les nourrissons (<8 mois) entrant dans la saison du VRS ou nés pendant celle-ci	de l'appée en cours			Tous les nourrissons (<8 mois) entrant dans la saison du VRS ou nés pendant celle-ci				

LÉGENDE	
Abbréviation/ note de bas de page	Définition
1	Si l'enfant poursuit ses études postsecondaires ou les recrues militaires qui vivront dans un milieu de vie collectif.
2	Un programme de mise à jour du carnet vaccinal est en place en 3e année du secondaire au Québec. Ce programme inclut la mise à jour de la vaccination pour l'ensemble des maladies suivantes : la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, les oreillons, les infections à méningocoque de sérogroupe C, la varicelle, l'hépatite B et les infections à VPH. Programme de rattrapage temporaire : Veuillez également noter que les enfants en quatrième année d'école primaire seront vaccinés contre l'hépatite A.
3	Le DCaT-VPÍ-Hib peut être remplacé par le dcaT-VPÍ en période de rupture de stocks pour les enfants de 4 à 6 ans.
4	Deux vaccins contre le rotavirus sont autorisés au Canada : Rotarix (2 doses) et RotaTeq (3 doses).
	Le vaccin n'est pas financé par les fonds publics dans cette province ou ce territoire.

