

## Programmes de vaccination systématique (et de rattrapage) des provinces et des territoires pour les nourrissons et les enfants au Canada (en date d'avril 2024)

Le tableau ci-dessous résume les calendriers de vaccination systématique pour les nourrissons et les enfants de toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Ces calendriers sont mis à jour régulièrement en collaboration avec la Coalition canadienne des infirmières et infirmiers pour l'immunisation (CCII) et le Comité canadien sur l'immunisation (CCI). Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site [Canada.ca/Vaccins](https://Canada.ca/Vaccins).

VACCINS														
Calendriers de vaccination provinciaux et territoriaux														
Abréviations	Description	CB	AB	SK	MB	ON	QC <sup>2</sup>	NB	NE	IPE	TNL	YN	TNO	NU
DCaT-VPI-Hib	Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio (vaccin inactivé) et Haemophilus influenzae type B	Âge: 18 mois	Âge: 18 mois	Âge: 2,4,6,18 mois	Âge: 2,4,6,18 mois	Âge: 2,4,6,18 mois	Âge: 12 mois	Âge: 2,4,6,18 mois	Âge: 2,4,6,18 mois	Âge: 18 mois	Âge: 2,4,6,18 mois	Âge: 18 mois	Age: 2,4,6,18 mos	Âge: 2,4,6,18 mois
DCaT-HB-VPI-Hib	Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l'hépatite B, la polio (vaccin inactivé) et Haemophilus influenzae type B	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6 ans				Âge: 2,4 mois			Âge: 2,4,6 mois		Âge: 2,4,6 mois		
dcaT-VPI	Vaccin contre la diphtérie (dose réduite), la coqueluche (dose réduite), le tétanos et la polio (vaccin inactivé)	Âge: 4-6 ans	Âge: 4 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4 ans	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-5 ans	Âge: 4-6 ans <sup>3</sup>	Âge: 4-6 ans	Âge: 4-6 ans <sup>3</sup>	Âge: 4-6 ans
dcaT	Vaccin contre la diphtérie (dose réduite), la coqueluche acellulaire (dose réduite) et le tétanos	9 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	8 <sup>e</sup> année	8 <sup>e</sup> année ou 9 <sup>e</sup> année	Âge: 14-16 ans		7 <sup>e</sup> année	7 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	7 <sup>e</sup> année	6 <sup>e</sup> année
dT	Vaccin contre la diphtérie (dose réduite) et le tétanos						3 <sup>e</sup> année du secondaire							
BCG	Vaccin Bacille de Calmette-Guérin												Âge: 1 mois	Âge: 1 mois
HAHB	Vaccin contre les hépatites A et B						Âge: 18 mois							
HB	Vaccin contre l'hépatite B	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 3 doses (DCaT-HB-VPI-Hib)	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 7 <sup>e</sup> année	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 2 doses (DCaT-HB-VPI-Hib) Un vaccin HAHB à 18 mois	Âge: À la naissance, 2,6 mois	(2 doses) 7 <sup>e</sup> année	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 3 doses (DCaT-HB-VPI-Hib)	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	Administré aux nourrissons avec un vaccin combiné à 3 doses (DCaT-HB-VPI-Hib)	Âge: À la naissance, 1,6 mois	Âge: À la naissance, 1,9 mois
RRO	Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons	Âge: 12 mois				Âge: 12 mois						Âge: 12 mois		
Var	Vaccin contre la varicelle	Âge: 12 mois				Âge: 15 mois	Âge: 4-6 ans					Âge: 12 mois		6 <sup>e</sup> année
RRO-V	Vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle	2 <sup>e</sup> dose Âge: 4-6 ans	Âge: 12, 18 mois	Âge: 12, 18 mois	Âge: 12 mois, 4-6 ans	2 <sup>e</sup> dose Âge: 4-6 ans	Âge: 12, 18 mois	Âge: 12, 18 mois	Âge: 12 mois, 18 mois	Âge: 12, 18 mois	Âge: 12, 18 mois	(2 <sup>e</sup> dose) Âge: 4-6 ans	Âge: 12, 18 mois	Âges 12-18 mois
Men-C-C	Vaccins monovalents conjugués contre le méningocoque	Âge: 2, 12 mois	Âge: 4, 12 mois	Âge: 12 mois		Âge: 12 mois	Âge: 18 mois	Âge: 12 mois	Âge: 12 mois	Âge: 12 mois	Âge: 12 mois	Âge: 2, 12 mois	Âge: 2, 12 mois	Âge: 12 mois
Men-C-ACYW-135	Vaccins quadrivalent conjugué contre le méningocoque	9 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	6 <sup>e</sup> année	Âge: 12 mois et 6 <sup>e</sup> année	7 <sup>e</sup> année	3 <sup>e</sup> année du secondaire	9 <sup>e</sup> année	7 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	4 <sup>e</sup> année	9 <sup>e</sup> année	12 <sup>e</sup> année <sup>1</sup>	9 <sup>e</sup> année
Pneu-P-23	Vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque													Âge: 2-3 ans
Pneu-C-13	Vaccin antipneumococcique conjugué 13 valent	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,12 mois	Âge: 2,4,6,18 mois	Âge: 2,4,6,15 mois
Pneu-C-10	Vaccin antipneumococcique conjugué 10 valent						Âge: 2,4 mois							
Rota	Vaccin contre le rotavirus <sup>4</sup>	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6 mois	Âge: 2,4,6 mois
VPH	Vaccins contre le virus du papillome humain	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 7 <sup>e</sup> année	(2 doses) 1 <sup>re</sup> dose en 4 <sup>e</sup> année du primaire et 2 <sup>e</sup> dose en 3 <sup>e</sup> année du secondaire	(2 doses) 7 <sup>e</sup> année	(2 doses) 7 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année	9-14 ans: 2 doses 15 ans+: 3 doses	(2 doses) 6 <sup>e</sup> année
Inf	Vaccins contre la grippe	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Ce n'est pas au calendrier régulier.	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus	Âge: 6 mois et plus

## LÉGENDE

Abbréviation/ note de bas de page	Définition
1	Si l'enfant poursuit ses études postsecondaires à l'extérieur du territoire.
2	Un programme de mise à jour du carnet vaccinal est en place en 3e année du secondaire au Québec. Ce programme inclut la mise à jour de la vaccination pour l'ensemble des maladies suivantes : la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, les oreillons, les infections à méningocoque de séro groupe C, la varicelle, l'hépatite A, l'hépatite B et les infections à VPH. Programme de rattrapage temporaire : Veuillez également noter que les enfants en quatrième année d'école primaire seront vaccinés contre l'hépatite A.
3	Le DCaT-VPI-Hib peut être remplacé par le dcaT-VPI en période de rupture de stocks pour les enfants de 4 à 6 ans.
4	Deux vaccins antirotavirus sont autorisés au Canada : Rotarix (2 doses) et RotaTeq (3 doses).
	Le vaccin n'est pas financé par les fonds publics dans cette province ou ce territoire.
	<u>Un programme spécifique de rattrapage est en cours.</u> Un programme de rattrapage est défini comme une mesure temporaire afin de mettre en œuvre un nouveau programme de vaccination pour un certain groupe d'âge (p. ex. une dose supplémentaire d'un vaccin est recommandée et un programme ciblé est mis en place). Il peut également être utilisé lorsqu'un vaccin est ajouté à un plus jeune âge (p. ex. durant la petite enfance). Ainsi, le programme existant continue jusqu'à ce que la première cohorte de nourrissons « rattrape » le groupe d'âge vacciné actuellement (p. ex. le vaccin contre l'hépatite B est ajouté au programme pour les nourrissons, mais la vaccination en milieu scolaire pour ce vaccin continue jusqu'à ce que ces nourrissons atteignent l'âge ciblé). Ceci étant dit, les provinces et territoires peuvent offrir au niveau individuel des vaccins de rattrapage sans qu'un programme spécifique ne soit mis en place.

