

Progrès du Canada vers l'atteinte des cibles mondiales en matière de VIH (90-90-90)

À la fin de 2020, environ **62 790 personnes vivaient avec le VIH (PVIH)** au Canada

Objectifs pour le continuum de soins pour le VIH

90 % PVIH avaient reçu un diagnostic


87 % des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH suivaient un traitement

95 % des personnes recevant un traitement antirétroviral avaient une charge virale supprimée

1 personne sur 10 vivant avec le VIH au Canada ne connaissait pas son statut sérologique




Environ **16 690 personnes** n'étaient pas engagées ou représentées dans le continuum de soins du VIH



2020

Les cibles du continuum de soins du VIH pour les femmes vivant avec le VIH au Canada sont inférieures à ceux pour les hommes



L'atteinte des cibles pour le VIH varie d'une province ou région à l'autre¹

- 1^{er}** Six des 10 juridictions ont atteint la première cible de 90
- 2^{ème}** Six des 10 juridictions ont atteint la deuxième cible de 90
- 3^e** Huit des 10 juridictions ont atteint le troisième objectif de 90

Les cibles de continuum de soins pour le VIH varient selon les populations clés²



Les personnes utilisatrices de drogues injectables (2017-2019)³




Communauté africaine, caribéenne et noire en Ontario (2018)⁴



Les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes dans trois centres urbains (2017-2019)⁵



Les personnes incarcérées dans établissements correctionnels fédéraux (2020)



Premières Nations en Saskatchewan (2020)



¹ Certaines provinces et certains territoires ont été regroupés en une région afin de s'aligner sur la façon dont les soins sont dispensés et en raison du petit nombre de cellules.

² Les données sur les populations clés ne représentent pas toujours des données au niveau national, et un ensemble complet de mesures n'est pas disponible pour toutes les communautés.

³ Tarasuk J, J. Zhang, A. Lemyre, F. Cholette, M. Bryson et D. Paquette. « Résultats nationaux de l'enquête Track auprès des utilisateurs de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019 », Relevé des maladies transmissibles au Canada, 2020, vol. 46, no 5, p. 155-168.

⁴ Ontario HIV Epidemiology and Surveillance Initiative. « Un instantané des diagnostics de VIH et de la cascade des soins VIH parmi les personnes africaines, caraïbéennes et noires en Ontario ». 7 février 2022.

⁵ Rapports de site cohorte d'Engage. <https://www.engage-men.ca/fr/>

⁶ On considère qu'une personne est au courant de son statut si elle a subi un test de dépistage du VIH avant son incarcération, qu'elle a accepté un test volontaire à l'admission, qu'elle a été référée pour un test de dépistage du VIH ou qu'elle en a demandé un pendant l'incarcération. Cette mesure sert à établir par procuration le premier indicateur de 90 pour les établissements correctionnels fédéraux, d'après les données actuellement disponibles.