

كونوا على اطلاع بالحقائق:

## تطعيم الأطفال ضد مرض كوفيد-19

تساعد لقاحات كوفيد-19 الأطفال على محاربة الفيروس الذي يُسبب مرض كوفيد-19، وتُوفر حماية قوية ضد الآثار الشديدة المترتبة عنه.



وافقت وزارة الصحة الكندية على لقاحات كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 سنة. من المهم أن يحصل الأطفال على أحدث لقاحات كوفيد-19 المتوفرة. وهذا يعني حصولهم على جميع جرعات اللقاح الموصى بها لهم.

ويمكن أن تشمل الحالات الطبية الكامنة على السمنة، والربو، ومتلازمة داون، والاضطرابات العصبية، وحالات ضعف المناعة، لكن بعض الأطفال الذين يمرضون بشدة قد لا تكون لديهم أية عوامل خطورة.

عند جمع التطعيم مع تدابير الصحة العامة الفردية الأخرى مثل البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض وارتداء كمامة إذا كان السن مناسباً (لا ينبغي للأطفال الذين يقل عمرهم عن سنتين أن يرتدوا الكمامات)، فإن التطعيم يُوفر مستوى إضافياً من الحماية ضد الفيروس. يساعد التطعيم الجهاز المناعي على مواجهة الفيروس بشكل أسرع ويحمي من الشعور بالمرض الشديد نتيجة كوفيد-19.

حتى الأطفال الذي سبق وأصيبوا بمرض كوفيد-19 لا زال عليهم تلقي التطعيم، حيث يساعد التطعيم بعد الإصابة على تعزيز استجابة الجهاز المناعي وقد يوفر حماية قوية وأطول ضد كوفيد-19، بما في ذلك المتحورات الجديدة.

إن تطعيم الأطفال ضد مرض كوفيد-19 له فوائد تعود بالنفع على صحتهم وسلامتهم. وعلى الرغم من أن الأطفال أقل احتمالاً لإصابتهم بالتعب الشديد نتيجة كوفيد-19 في حالة إصابتهم، لكنهم ما زالوا:

، قد يحتاجون إلى دخول المستشفى نتيجة المضاعفات الناتجة عن كوفيد-19، مثل صعوبة التنفس  
، قد يعانون من آثار طويلة الأمد حتى وإن بدى عليهم التعافي من المرض (حالة ما بعد كوفيد-19، المعروفة أيضاً باسم "كوفيد الطويل").

، قد يعانون من مضاعفة نادرة لكنها خطيرة تُسمى متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال (MIS-C)  
قد يكون الأطفال المصابون بحالات طبية كامنة معينة معرضين لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد نتيجة لكوفيد-19.

### ما الذي عليك معرفته

اتبع العلماء إجراءات دقيقة عند تطوير اللقاحات ومراجعتها. توفرت اللقاحات بسرعة نظراً لعقود من التقدم في العلم والتكنولوجيا في تطوير اللقاحات التي مهدت الطريق، والأبحاث المخصصة الجديدة والدعم التنظيمي والتمويل ومستوى التعاون الدولي غير المسبوق.



يمكن أن تحدث آثار جانبية خفيفة حيث يستجيب جسم طفلك للقاح. وعادةً ما تتلاشى هذه التفاعلات تلقائياً خلال ساعات أو أيام. ويمكن أن تتضمن الاحمرار، والألم، والتورم في مكان الحقنة، وأعراض عامة أخرى مثل القشعريرة، والحمى الخفيفة، والإرهاق، والصداع، وألم المفاصل وألم العضلات. أما ردود الفعل التحسسية الشديدة فهي نادرة جداً ويمكن معالجتها. وإذا حدثت، فعادةً ما تحدث بعد تلقي اللقاح بقليل.

تخضع اللقاحات للمراقبة للتأكد من سلامتها ولمراقبة الآثار الجانبية. بالإضافة إلى وجود أنظمة قوية لمراقبة سلامة اللقاحات بالنسبة للكبار، يوجد لدى كندا أيضاً نظام لمراقبة سلامة التطعيمات الخاصة بالأطفال. وتُعد شبكة Active لبرنامج مراقبة التطعيمات (IMPACT) هي شبكة للأطفال قائمة بالمستشفيات وتديرها الجمعية الكندية للأطفال. وقد راقبت IMPACT تطعيم الأطفال منذ أكثر من 20 سنة.

إذا كانت لديك أسئلة حول لقاحات كوفيد-19، فتحدث إلى مقدم الرعاية الطبية.

كونوا على اطلاع بالحقائق. اكتشف المزيد على [Canada.ca/covid-vaccine](https://Canada.ca/covid-vaccine) وتوجه إلى الموقع الإلكتروني لمقاطعتك أو إقليمك للحصول على المعلومات الخاصة بالمنطقة التي تعيش فيها.