

瞭解事實：

兒童接種 COVID-19 疫苗

加拿大衛生部已批准用於 5 至 11 歲兒童的 COVID-19 疫苗。該疫苗可幫助身體抵抗病毒，從而降低兒童感染 COVID-19 並出現癥狀的可能性。



儘管兒童和青少年不太可能因 COVID-19 而患重症，但他們仍然可能：

- ，因 COVID-19 而身體不適
- ，受到感染而沒有任何癥狀
- ，患上一種罕見但嚴重的併發症，稱為兒童多系統發炎綜合症 (MIS-C)
- ，將 COVID-19 傳播給他人
- ，如果他們真的被感染，則會受到長期影響

COVID-19 最常見的長期影響包括疲倦、頭痛、體重減輕、肌肉疼痛、睡眠障礙、咳嗽和難以思考或集中注意力。

本身患有某些疾病的兒童因 COVID-19 而引發重症的風險可能增加，但一些沒有風險因素的兒童也可能出現重症。

疫苗接種提供了額外的一層病毒防護，可以幫助兒童更安全地參與重要活動，如課堂學習、體育和社交活動。

您應該瞭解什麼



科學家們在開發和審查疫苗時遵循了謹慎的程序。疫苗之所以可以很快面市，是因為有專門的研究資金和罕見的國際合作水準。這些疫苗是以多年來針對其他傳染病開發的科學技術為基礎的。

5 至 11 歲兒童的疫苗劑量較小。與許多其他疫苗一樣，COVID-19 疫苗的劑量取決於個人的年齡，而不是體重，因為年齡是我們免疫系統反應能力的關鍵因素。對這些疫苗的研究發現，較小的劑量為兒童提供了很好的 COVID-19 保護。

疫苗不會讓您的孩子感染 COVID-19，因為不含導致這種疾病的病毒。

疫苗不會改變 DNA。疫苗絕不會與 DNA 相互作用。

疫苗不會影響您孩子的生育能力。多項獨立研究顯示，沒有證據表明 COVID-19 疫苗會影響生育能力。

副作用



對疫苗接種的反應通常是輕微的，並在數小時或數天內自行消失。這些可能包括注射部位發紅、酸痛和腫脹，以及其他一般性癥狀，如發冷、低燒、疲倦、頭痛、關節痛和肌肉酸痛。

嚴重的過敏反應非常罕見，並且是可以治療的。如果過敏真的出現的話，通常是在接種疫苗后不久。

疫苗的安全性和副作用受到監測。

加拿大除了有強大的 COVID-19 疫苗安全監測系統，對兒童疫苗接種還有另外的安全監測系統。**疫苗接種監測計劃 ACTIVE** (The Immunization Monitoring Program ACTIVE (IMPACT)) 網絡是一個以醫院為基礎的兒科網絡，由加拿大兒科學會管理，該組織 20 多年來一直監測兒童疫苗接種。

如果您對 COVID-19 疫苗有任何疑問，請諮詢醫務人員。

瞭解事實。在 Canada.ca/covid-vaccine 上可以瞭解更多資訊，也可以訪問您所在省或地區的網站，瞭解您居住地的具體資訊。

