

Syphilis

Qu'est-ce que la syphilis?

- La syphilis est une infection transmissible sexuellement (ITS) causée par des bactéries.

Le taux de syphilis infectieuse a augmenté de 178 % au cours des dix dernières années.

Comment la syphilis se transmet-elle?

- La syphilis se transmet lorsqu'une personne infectée a des relations sexuelles vaginales, anales et/ou orales avec une autre personne sans porter de condom.

Signes et symptômes

- Parfois indolores, des plaies ouvertes peuvent apparaître à l'intérieur ou sur l'extérieur du pénis, du vagin, du rectum ou de la bouche.
- Ganglions enflés, y compris derrière les oreilles, sous la mâchoire, dans les aisselles et dans la région de l'aine.
- Une éruption cutanée et/ou des symptômes similaires à ceux de la grippe.

De nombreuses personnes n'auront pas de symptômes au début d'une infection; il est donc important de subir souvent un test de dépistage si vous êtes sexuellement actif.

Faites un test de dépistage

- Un test de dépistage est rapide et simple et se fait au moyen d'un test sanguin et/ou d'un prélèvement.
- Si vous avez été victime de violence sexuelle, vous devriez faire un test de dépistage de la syphilis et d'autres ITS.
- Parlez à votre médecin ou à une infirmière ou communiquez avec une clinique de santé sexuelle ou un service de santé local pour savoir si vous devriez faire un test de dépistage pour la syphilis et d'autres ITS.

Le nombre de bébés atteints de syphilis augmente.

Si vous êtes enceinte

- Vous devriez faire un test de dépistage de la syphilis le plus tôt possible.
- Si vous avez l'infection, vous risqueriez de la transmettre à votre bébé avant la naissance ou au moment de l'accouchement. La syphilis non traitée peut causer des anomalies congénitales et la mortalité (accouchement d'un mort-né).
- Le traitement de la syphilis ne présente aucun danger durant la grossesse.

Parlez à votre ou vos partenaires

- Si vous avez la syphilis, vous devriez en informer votre ou vos partenaires sexuels afin qu'ils ou elles puissent être testés et traités.
- Si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler avec votre ou vos partenaires, demandez de l'aide à votre médecin, à une infirmière ou à un bureau local de santé publique.
- Parlez à votre ou vos partenaires au sujet des ITS et de l'utilisation de moyens de protection, afin que vous puissiez prendre une décision informée au sujet de votre santé sexuelle.

Se faire traiter

- La syphilis peut être traitée au moyen d'antibiotiques.

Pour plus d'informations, visitez :

www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/syphilis.html



Agence de la santé
publique du Canada

Public Health
Agency of Canada

Canada