

Du 2 au 8 décembre 2018 (semaine de déclaration 49)

Sommaire global


- L'activité grippale a continué d'augmenter au cours de la semaine 49.
- Le virus de la grippe A est la souche prédominante en circulation au Canada, dont la majorité sont de sous-type A(H1N1)pdm09.
- Autant dans les détections en laboratoire que dans les hospitalisations, la majorité des cas ont été signalés chez des personnes âgées de moins de 65 ans.

Activité grippale et pseudogrippale (propagation géographique)

Au cours de la semaine 49, les niveaux d'activité grippale ont continué à augmenter (figure 1):

- Huit régions ont signalé une activité localisée : en C.-B.(1), Alb.(1), Sask(1), Man.(1), Ont.(2), Qc.(1) et N.-B.(1)
- Une activité sporadique a été signalée dans 34 régions : C.-B.(4), Alb.(4), Sask(2), Man.(5), Ont.(4), Qc.(5), N.-B.(3), T.N.L.(2), Î.-P.É.(1), T.N.-O.(2), Nt(1) et Yn.(1)
- Aucune activité n'a été signalée dans 12 régions.

Figure 1 – Carte de l'activité grippale et pseudogrippale globale par province et territoire, Canada, semaine 2018-49



Détections de la grippe et d'autres virus respiratoires

Au cours de la semaine 49, les résultats suivants ont été signalés par des laboratoires sentinelles au Canada (figure 2) :

- Le pourcentage de tests positifs pour la grippe a continué à augmenter, étant 19,3 % de tests positifs.
- 1 500 détections de grippe en laboratoire ont été signalées, dont 99 % étaient de type A.

À ce jour cette saison, 6 158 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été signalés (figure 3) :


- 99% d'entre eux étant imputable à la grippe A;
- Parmi les 3 209 virus de la grippe A sous-typés, 94 % étaient le virus A(H1N1)pdm09.
- Des différences relatives à la répartition des types et des sous-types de grippe ont été observées entre les provinces et territoires.

À ce jour cette saison, des informations détaillées sur l'âge et le type / sous-type ont été reçues pour 6 024 cas de grippe confirmés en laboratoire (tableau 1).

- 70 % de toutes les détections de la grippe A(H1N1)pdm09 ont été signalées chez des personnes de moins de 45 ans.
- 68 % de toutes les détections de la grippe A(H3N2) ont été signalées chez des adultes âgés de 65 ans ou plus.

Pour obtenir des données cumulatives et hebdomadaires plus détaillées sur la grippe, veuillez lire la description pour les [figures 2 et 3](#) ou le rapport intitulé [Détection de virus des voies respiratoires au Canada](#).

Figure 2 – Nombre et pourcentage de tests de détection de la grippe positifs, par type, sous-type et semaine de surveillance, Canada, semaines 2018-35 à 2018-49



La zone ombragée désigne les semaines où le taux de positivité était d'au moins 5 % ou où le nombre minimal de tests positifs était de 15, signalant le début et la fin de l'[activité grippale saisonnière](#) (en anglais seulement).

Figure 3 – Nombre cumulative d'échantillons positifs pour la grippe, par type/sous-type et province/territoire, Canada, semaines 2018-35 à 2018-49




Tableau 1 – Nombre cumulatif d'échantillons positifs pour la grippe, par type, sous-type et groupe d'âge, en fonction des rapports détaillés des cas confirmés en laboratoire, Canada, semaines 2018-35 à 2018-49

Groupes d'âge (ans)	Cumulatif (26 août 2018 au 8 décembre 2018)						
	Influenza A				B Total	Influenza A et B	
	A Total	A(H1N1) pdm09	A(H3N2)	A (NonS) ¹		#	%
0-4	1277	698	4	575	10	1287	21%
5-19	1247	637	5	605	15	1262	21%
20-44	1490	724	27	739	13	1503	25%
45-64	1131	555	43	533	9	1140	19%
65+	813	331	167	315	19	832	14%
Total	5958	2945	246	2767	66	6024	100%

1 Non sous-typé : L'échantillon a été typé en tant que grippe A, mais aucun résultat n'était disponible pour ce qui est du sous-type.


Surveillance syndromique/syndrome grippal

Surveillance syndromique assurée par les professionnels de la santé sentinelles

Au cours de la semaine 49, 2,1 % des consultations auprès de professionnels des soins de santé étaient attribuables à un syndrome grippal (SG) (figure 4). Le pourcentage de visites pour SG est resté aux niveaux prévus pour cette période de l'année.

Figure 4 – Pourcentage de visites pour le syndrome grippal déclarées par les sentinelles chaque semaine, Canada, semaines 2018-35 à 2018-49

Nombre de déclarations par les sentinelles pour la semaine 49: 102



La zone ombragée désigne les pourcentages maximaux et minimaux signalés par semaine entre les saisons 2013-14 et 2017-18

Surveillance syndromique participative


Au cours de la semaine 49, 2 218 participants ont soumis des données au programme «La grippe à l'oeil». De ce nombre, 44 (2,0 %) ont signalé des symptômes de toux et de fièvre (figure 5).

Parmi les 44 participants qui ont signalé de la fièvre et de la toux :

- 27 % ont consulté un professionnel de la santé.
- 80 % ont signalé avoir manqué des jours de travail ou d'école, soit un total combiné de 118 jours d'absence au travail ou à l'école.

Figure 5 – Pourcentage de participants qui ont signalé de la fièvre et de la toux, Canada, semaines 2018-40 à 2018-49

Nombre de participants qui ont soumis des données pour la semaine 49: 2 218



Surveillance des éclosions de la grippe


Au cours de la semaine 49, cinq nouvelles éclosions de grippe ont été signalées dans des établissements de soins de longue durée (ESLD) (2), des établissements de soins de courte durée (1) et d'autres cadres (2). Quatre nouvelles éclosions de syndrome grippal ont été signalées au cours de la semaine 49.

À date cette saison, 52 éclosions de la grippe confirmées ont été signalées (figure 6):

- 25 éclosions ont été signalées dans des ESLD, 11 dans des écoles, sept dans des établissements de soins de courte durée, et huit dans d'autres cadres.
- Tous les 43 éclosions pour lesquelles le type de grippe était connu étaient associées à la grippe A.
- Parmi les 33 éclosions pour lesquelles le sous-type de grippe A était connu :
 - 25 étaient associées à la grippe A(H1N1);
 - 8 étaient associées à la grippe A(H3N2);

Jusqu'à maintenant cette saison, 35 éclosions de syndrome grippal ont été signalées; 26 se sont produites dans des ESLD, six dans des écoles, et trois dans des établissements de soins de courte durée.

Figure 6 - Nombre de nouvelles éclosions de la grippe confirmées en laboratoire par semaine, Canada, semaines 2018-35 à 2018-49



Surveillance des cas sévères de grippe

Hospitalisations et décès associés à la grippe déclarés par les provinces et territoires

À ce jour cette saison, plus de 705 hospitalisations associées à la grippe ont été signalées par les provinces et territoires participants¹.

Hospitalisations (tableau 2) :

- 99% (702) étaient liées à la grippe A
- Le taux d'hospitalisation estimé le plus élevé est parmi les enfants de moins de 5 ans.

Cas admis aux services de soins intensifs et décès :

- Jusqu'à maintenant cette saison, 90 admissions dans une unité de soins intensifs et 16 décès ont été signalés.

Tableau 2 - Nombre cumulatif et taux estimé d'hospitalisations par groupe d'âge signalées par les provinces et territoires participants¹, Canada, semaines 2018-35 à 2018-49

Groupes d'âge (ans)	Cumulative (26 août 2018 au 8 décembre 2018)		
	Influenza A	Influenza B	Taux pour 100 000 habitants
0-4	131	0	27.52
5-19	88	0	6.34
20-44	115	0	4.04
45-64	182	0	8.36
65+	186	3	15.53
Total	702	3	
%	100%	0%	

¹Des hospitalisations attribuables à la grippe sont déclarés par l'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord-Ouest, et le Yukon. Seules les hospitalisations nécessitant des soins médicaux intensifs sont signalées par la Saskatchewan. Le taux cumulatif d'hospitalisations est calculé à partir de la population totale pour chaque groupe d'âge dans les provinces et les territoires participants.

Hospitalisations et décès associés à la grippe chez les enfants

Au cours de la semaine 49, 37 hospitalisations associées à la grippe chez des enfants (16 ans et moins) ont été signalées par le réseau du Programme canadien de surveillance active de l'immunisation (IMPACT). Les hospitalisations chez des enfants signalées par le réseau IMPACT sont à des niveaux que l'on n'observe normalement pas avant la fin de décembre (figure 7).

À ce jour cette saison, 228 hospitalisations pédiatriques ont été signalées (figure 8) :

- Tous les cas sauf trois sont associés à la grippe A.
- Parmi les 154 cas pour lesquels on connaît le sous-type de grippe, 152 (98,7 %) étaient associées à la grippe A(H1N1)pdm09.

À ce jour cette saison, 33 admissions dans une unité de soins intensifs ont été signalées et aucun décès.

Figure 7 – Nombre d'hospitalisations pédiatriques (≤ 16 ans) associées à la grippe signalées par le réseau IMPACT, par semaine, Canada, semaines 2018-35 à 2018-49





Figure 8 - Nombre cumulé d'hospitalisations pédiatriques (≤ 16 ans) associées à la grippe par groupe d'âge signalées par le réseau IMPACT, Canada, semaines 2018-35 à 2018-49



Hospitalisations et décès associés à la grippe chez les adultes

La surveillance des hospitalisations associées à la grippe confirmée en laboratoire chez les adultes (âgés de 16 ans ou plus) menée par le réseau du Programme canadien de surveillance active de l'immunisation (CIRN) a débuté le 1 novembre pour la saison grippale 2018-19.

À ce jour cette saison, 38 hospitalisations ont été signalées :

- 33 (87 %) étaient associées à la grippe A et trois à la grippe B.
- 20 des 38 cas (53 %) sont des adultes âgés de 65 ans ou plus.

Caractérisation des souches grippales

Depuis le 1^{er} septembre 2018, le Laboratoire national de microbiologie (LNM) a caractérisé 182 virus de la grippe (25 A(H3N2), 144 A(H1N1) et 13 B) qui ont été reçus des laboratoires canadiens.

Caractérisation génétique des virus de type A(H3N2) :

23 virus A(H3N2) ne se sont pas développés à un titre suffisamment élevé pour la caractérisation antigénique au moyen des épreuves d'inhibition de l'héماغglutination (IH). Par conséquent, le LNM a effectué une caractérisation génétique, afin de déterminer l'identité du groupe génétique de ces virus.

L'analyse de séquences du gène HA de ces virus a montré que :

- Trois virus appartiennent au groupe génétique 3C.2a.
- 20 virus appartiennent au groupe génétique 3C.2a1.

Le virus apparenté au virus A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 appartient au sous-groupe génétique 3C.2a1. Cette souche est le composant de la grippe A(H3N2) du vaccin antigrippal de l'hémisphère Nord 2018-2019.

Caractérisation antigénique :

Grippe A(H3N2) :

- Deux virus de la grippe A(H3N2) ont été caractérisés antigéniquement comme apparentés à A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 par un test IH utilisant un antisérum obtenu contre les virus A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 cultivés dans des œufs.
- Le virus apparenté au virus A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 est le composant de la grippe A(H3N2) du vaccin antigrippal de l'hémisphère Nord 2018-2019.
- Les deux virus de la grippe A(H3N2) caractérisés appartenaient au groupe génétique 3C.2a1.

Grippe A(H1N1) :

- 144 virus A(H1N1) caractérisés étaient antigéniquement apparentés à A/Michigan/45/2015, composant de la grippe A(H1N1) du vaccin antigrippal de l'hémisphère Nord 2018-2019.

Grippe de type B :

Les virus de la grippe B peuvent être divisés en deux lignées antigéniquement distinctes représentées par les virus B/Yamagata/16/88 et B/Victoria/2/87. Les composants de l'influenza B recommandés pour le vaccin antigrippal de l'hémisphère nord 2018-2019 sont B/Colorado/06/2017 (lignée Victoria) et B/Phuket/3073/2013 (lignée Yamagata).

- 13 virus de la grippe B ont été caractérisés antigéniquement comme apparentés à B/Phuket/3073/2013, qui appartient à la lignée Yamagata, composant de la grippe B du vaccin antigrippal **quadrivalent** de l'hémisphère Nord 2018-2019.

Résistance aux antiviraux

Résistance aux antiviraux – Amantadine :

132 virus de la grippe A (20 A(H3N2) et 112 A(H1N1)) ont été testés pour leur résistance à l'amantadine, et il a été constaté que :

- Tous les 132 virus de l'influenza A étaient résistants à l'amantadine.

Résistance aux antiviraux – Oseltamivir :

185 virus de la grippe (22 A(H3N2), 150 A(H1N1) et 13 B) ont été testés pour leur résistance à l'oseltamivir, et il a été constaté que :

- Tous les 185 virus de l'influenza étaient sensibles à l'oseltamivir.

Résistance aux antiviraux – Zanamivir

185 virus de la grippe (22 A(H3N2), 150 A(H1N1) et 13 B) ont été testés pour la résistance au zanamivir, et il a été constaté que :

- Tous les 185 virus de l'influenza étaient sensibles au zanamivir.

Rapports provinciaux et internationaux sur la grippe

- | | |
|---|---|
| - Alberta* – Influenza Surveillance | - Australie* – Influenza Surveillance Report and Activity Updates |
| - Colombie Britannique* – Influenza Surveillance | - Europe* – Surveillance reports and disease data on seasonal influenza |
| - Manitoba* – Seasonal Influenza Reports | - Nouvelle-Zélande* – Influenza Weekly Update |
| - Nouveau-Brunswick – Influenza Surveillance Reports | - Royaume Uni* -- Weekly Influenza Activity Reports |
| - Terre-Neuve-et-Labrador* – Surveillance and Disease Reports | - Organisation panaméricaine de la santé* – Influenza Situation Report |
| - Nouvelle-Écosse* – Respiratory Watch Report | - United States Centres for Disease Control and Prevention* – Weekly Influenza Summary Update |
| - Ontario* – Respiratory Pathogen Bulletin | - Organisation mondiale de la Santé* – FluNet |
| - Île-du-Prince-Édouard* – Influenza Summary | |
| - Saskatchewan* – Influenza Reports | |
| - Québec – Système de surveillance de la grippe | |

*Disponible en Anglais seulement

Notes

Pour en savoir plus sur les définitions, les descriptions et le programme FluWatch en général, consultez la page [Vue d'ensemble de la surveillance de la grippe au Canada](#). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la grippe, consultez notre page Web sur [la grippe](#).

Ce [rapport](#) est disponible sur la page Web du gouvernement du Canada sur la grippe.

This [report](#) is available in both official languages.

Nous voudrions remercier tous les partenaires participant au programme Surveillance de l'influenza cette année.