

## Sommaire global


- Tous les indicateurs de l'activité grippale demeurent exceptionnellement bas pour cette période de l'année, malgré la surveillance continue de la grippe partout au Canada.
- Jusqu'à maintenant cette saison, il n'y a aucune preuve de la propagation communautaire de la grippe malgré des dépistages continus au-dessus des niveaux saisonniers. L'activité grippale a demeuré sous le seuil requis pour déclarer le début de la saison de la grippe 2020-2021.
- Trois éclosions de syndrome grippal (SG) ont été signalée dans des écoles et/ou des garderies au cours des semaines 10 à 11; et un total de 124 éclosions de SG signalées à date cette saison. Aucune éclosion de grippe confirmée en laboratoire n'a été signalée à ce jour cette saison.
- 12 105 personnes ont participé au programme ActionGrippe, et 19 (0,16%) participants ont déclaré avoir de la toux et de la fièvre, ce qui demeure bas comparativement aux saisons précédentes. Fournissez des renseignements utiles pour faire le suivi des cas de grippe et de COVID-19 au Canada. [Inscrivez-vous au programme ActionGrippe.](#)
- L'enquête 2020-2021 sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière a montré que la couverture vaccinale était similaire à celle des saisons précédentes.
- De nombreux indicateurs de surveillance de la grippe peuvent être influencés par la pandémie du COVID-19, y compris les changements dans les comportements de recherche de soins et la capacité de dépistage. Les données actuelles devraient être interprétées en tenant compte de ce contexte. Consultez le [Mise à jour quotidienne sur l'épidémiologie](#) pour de l'information sur les cas de la COVID-19 au Canada.
- Avez-vous déjà oublié ce qui s'est passé pendant la dernière saison de la grippe? Ne vous inquiétez pas, le rapport ÉpiGrippe est là pour ça! Consultez le [Rapport annuel d'ÉpiGrippe : saison grippale 2019-2020](#) pour obtenir l'analyse officielle du Canada.

## Activité grippale et pseudogrippale (propagation géographique)

Au cours de la semaine 11, aucune activité de la grippe/SG n'a été signalée (figure 1).

**Figure 1 – Carte de l'activité grippale et pseudogrippale par province et territoire, Canada, semaine 2021-11**

Nombre de régions qui ont fait état de la situation dans la semaine 11 : 53 sur 53



## Détections de la grippe confirmée en laboratoire

Au cours des semaines 10 à 11, deux détections de grippe en laboratoire ont été signalée.

Jusqu'à maintenant cette saison, 66 détections de la grippe ont été signalées (figure 2), ce qui est nettement inférieur aux six dernières saisons, où une moyenne de 43 097 détections de la grippe ont été signalées pour la saison jusqu'à présent. Les provinces et les territoires surveillent tous de près les indicateurs de l'activité grippale cette saison. Les données du rapport ÉpiGrippe représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction et peuvent changer en fonction de données plus récentes.

Trente-et-un détections de la grippe signalées à ce jour cette saison ont été associées à la réception récente d'un vaccin vivant atténue contre l'influenza; il ne s'agit pas de virus grippaux saisonniers dont la propagation est communautaire. Les souches du vaccin vivant atténue contre l'influenza sont atténueées, mais peuvent être récupérées par écouvillonnage nasal chez les enfants et les adultes après la vaccination avec ce produit (c.-à-d. excrétion du virus). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document intitulé [Chapitre sur la grippe du Guide canadien d'immunisation et Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2020-2021 \(section IV.2\)](#).

Dans l'ensemble, le pourcentage de tests de laboratoire positifs pour la grippe demeure à des niveaux exceptionnellement bas, malgré les niveaux élevés de tests constatés cette semaine. Au cours des semaines 10 à 11, on a effectué 42, 855 tests de dépistage de la grippe dans des laboratoires ayant communiqué des rapports et le pourcentage de tests de laboratoire positifs pour la grippe était de 0 %. Comparativement aux six dernières saisons, le nombre de tests effectués cette semaine était plus élevé que la moyenne (22 040) et le pourcentage de tests positifs pour la grippe demeure bien inférieur à la moyenne (22,3 %) (figures 3a et 3b).


Au Canada, à l'échelle nationale, la saison de la grippe commence habituellement vers la semaine 47 (mi-novembre) et s'entend d'une période où au moins 5 % des résultats au test de dépistage de la grippe sont positifs et où le nombre minimal de tests positifs observés à l'échelle nationale est de 15. Au cours des six dernières saisons, la saison de la grippe a commencé dès la semaine 43 (mi-octobre) et au plus tard à la semaine 1 (début de janvier). En date de la semaine 11, l'activité grippale demeure sous le seuil requis pour déclarer le début de la saison de la grippe 2020-2021.

L'actuelle pandémie de COVID-19 a une incidence sur les tests de dépistage de la grippe et d'autres virus respiratoires. Les changements dans les pratiques de test en laboratoire peuvent nuire à la comparabilité des données par rapport aux semaines ou aux saisons précédentes.

Pour obtenir des données cumulatives et hebdomadaires plus détaillées sur la grippe, veuillez lire la description pour le la [Figure 2](#) ou le rapport intitulé [Détection de virus des voies respiratoires au Canada](#).

**Figure 2 – Nombre et pourcentage de tests de détection de la grippe positifs, par type, sous-type et semaine de surveillance, Canada, semaines 2020-35 à 2021-11**


Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation dans la semaine 11: 31 sur 35




La zone ombragée désigne les semaines où le taux de positivité était d'au moins 5 % et où le nombre minimal de tests positifs était de 15, signalant le début et la fin de [l'activité grippale saisonnière](#) (article en anglais seulement).

**Figure 3 – Comparaison par rapport aux saisons précédentes du nombre de tests de dépistage de la grippe (a) et du pourcentage de tests positifs (b) au Canada, par semaine, semaines 2020-35 à 2021-11**

a) Nombre actuel de tests de dépistage de la grippe par rapport aux saisons précédentes



b) Pourcentage actuel de tests positifs pour la grippe par rapport aux saisons précédentes



La zone ombrée représente les données maximal et minimal du nombre de tests de dépistage de la grippe (a) ou le pourcentage de tests positifs (b) signalé par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020.

## Surveillance syndromique/syndrome grippal


### Surveillance syndromique assurée par les professionnels de la santé sentinelles

Au cours des semaines 10 à 11, une moyenne de 0,3 % des visites de professionnels de la santé était attribuable à un syndrome d'allure grippale (SAG), ce qui demeure un taux inférieur à la moyenne des saisons précédentes (Figure 4).

Il convient d'interpréter cette tendance avec prudence, car on observe des changements dans le comportement des personnes qui demandent des soins de santé, ainsi qu'un plus petit nombre de signalements par les sentinelles par rapport aux saisons précédentes.

**Figure 4 – Pourcentage de visites pour le syndrome grippal déclarées par les sentinelles chaque semaine, Canada, semaines 2020-35 à 2021-11**

Nombre de sentinelles qui ont fait état de la situation au cours de la semaine 11: 50



La zone ombrée en bleu représente les pourcentages maximal et minimal signalé par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020.


### ActionGrippe (Surveillance syndromique participative)

Au cours de la semaine 11, 12 105 participants ont soumis des données au programme ActionGrippe, et 19 participants (0,16 %) ont signalé des symptômes de toux et de fièvre (figure 5). Le pourcentage de participants qui signalent une toux et de la fièvre reste à des niveaux très bas qui peuvent être attribuables aux mesures de santé publique adoptées pour réduire la propagation de la COVID-19. Les signalements du programme ActionGrippe ne sont pas touchés par les changements dans les services de santé ou les comportements favorisant la santé.

Si vous souhaitez participer au programme [ActionGrippe](#), [inscrivez-vous aujourd'hui](#).

**Figure 5 – Pourcentage de participants au programme ActionGrippe qui ont signalé une toux et de la fièvre, Canada, semaines 2020-35 à 2021-11**

Nombre de participants qui ont soumis des données pour la semaine 11: 12 105



*La zone ombrée en bleu représente les pourcentages maximal et minimal de participants qui signalent une toux et de la fièvre par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020.*

**Figure en ligne - Répartition géographique des participants au programme ActionGrippe ayant signalé une toux et de la fièvre, Canada, semaine 2021-11**

Cliquez sur la carte pour accéder au lien



## Surveillance des éclosions de la grippe

Au cours des semaines 10 à 11 trois éclosions de syndrome grippal (SG) ont été signalées dans des écoles et/ou des garderies.

À date cette saison, 124 éclosions de syndrome grippal (SG) ont été signalées dans des écoles et/ou des garderies, et aucune autre éclosion de grippe ou de SG n'a été signalée dans d'autres milieux.

Les éclosions de SG dans les écoles et les garderies sont déterminées lorsque plus de 10 % d'absentéisme attribuable au SG est signalé dans ces milieux. Le nombre d'éclosions de SG signalées dans les écoles et les garderies est plus élevé comparativement à la même période au cours des deux saisons précédentes. Ce n'est pas inattendu compte tenu des changements apportés à la surveillance des éclosions, notamment en raison de la vigilance accrue exercée dans les écoles pour surveiller et signaler l'absentéisme en raison de syndromes grippaux, ainsi que l'augmentation des restrictions imposées quant à la fréquentation des enfants présentant des symptômes de maladie respiratoire virale dans ces milieux.

Les éclosions de SG ne sont pas propres à un seul agent pathogène respiratoire et peuvent être causées par la grippe ou d'autres virus respiratoires, y compris le rhinovirus et le SARS-CoV-2, le virus responsable de la maladie COVID-19. Pour de plus amples renseignements sur les virus respiratoires qui circulent actuellement au Canada, veuillez consulter le rapport intitulé [Détection de virus des voies respiratoires au Canada](#).

Nombre de provinces et de territoires ayant déclaré des données au cours des semaines 10 à 11<sup>1</sup>: 13 sur 13

<sup>1</sup> *Toutes les provinces et tous les territoires (PT) participent au système de surveillance des éclosions d'ÉpiGrippe. Ce système surveille les éclosions de grippe et de SG dans les établissements de soins de longue durée, les établissements de soins actifs, les écoles et les garderies, les collectivités éloignées et/ou isolées, et les établissements classés dans la catégorie « Autre ». Ce ne sont pas tous les PT déclarants qui signalent des éclosions dans tous ces contextes. Tous les PT signalent des éclosions confirmées en laboratoire dans les ESLD. Quatre provinces et territoires (N.-B., T.-N.-L., N.-É. et Yukon) signalent des éclosions de SG dans les écoles et/ou les garderies.*

## Surveillance des cas sévères de grippe

### Hospitalisations et décès associés à la grippe déclarés par les provinces et territoires

Au cours des semaines 10 à 11, aucune hospitalisation associée à la grippe n'a été signalée par les provinces et territoires participants<sup>1</sup>. À ce jour cette saison, aucune hospitalisation associée à la grippe n'a été signalée par les provinces et territoires participants

Nombre de provinces et territoires qui ont fait état de la situation au cours des semaines 10 à 11: 9 sur 9

<sup>1</sup> *Des hospitalisations attribuables à la grippe sont déclarés par l'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord-Ouest, et le Yukon. Seules les hospitalisations nécessitant des soins médicaux intensifs sont signalées par la Saskatchewan.*

### Hospitalisations et décès associés à la grippe chez les enfants

Au cours des semaines 10 à 11, aucune hospitalisation associée à la grippe confirmée en laboratoire n'a été signalée. À ce jour cette saison, moins de cinq hospitalisations associées à la grippe chez les enfants (âgés de 16 ans ou moins) ont été signalées par le réseau du Programme canadien de surveillance active de l'immunisation (IMPACT).

## **Hospitalisations et décès associés à la grippe chez les adultes**

La surveillance des hospitalisations associées à la grippe confirmée en laboratoire chez les adultes (âgés de 16 ans ou plus) menée par le réseau du Programme canadien de surveillance active de l'immunisation (CIRN) n'a pas débuté pour la saison grippale 2020-2021.

### **Caractérisation des souches grippales**

En raison de la très faible circulation de la grippe jusqu'à maintenant cette saison, le Laboratoire national de microbiologie n'a pas reçu d'échantillons de virus grippaux ayant été recueillis pendant la saison de 2020-2021 pour la caractérisation des souches.

### **Résistance aux antiviraux**

En raison de la très faible circulation de la grippe jusqu'à maintenant cette saison, le Laboratoire national de microbiologie n'a pas reçu d'échantillons de virus grippaux ayant été recueillis pendant la saison de 2020-2021 pour les tests de résistance aux antiviraux.

### **Surveillance des vaccins**

La surveillance des vaccins fait référence aux activités en lien avec le suivi de la couverture et de l'efficacité du vaccin contre la grippe.

#### **Couverture vaccinale**

L'enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière est une enquête téléphonique annuelle menée en janvier et février auprès des Canadiens pour savoir s'ils ont reçu le vaccin annuel contre la grippe cette saison-là. La couverture vaccinale est mesurée en pourcentage de personnes ayant déclaré avoir reçu le vaccin antigrippal au cours d'une saison grippale donnée.

Au cours de la saison grippale 2020-2021, la couverture était similaire à celle de la [saison 2019-2020](#) :

- 32 % parmi les personnes de 18 à 64 ans.
  - 29 % parmi les personnes de 18 à 64 ans sans conditions médicales chroniques.
  - 41 % parmi les personnes de 18 à 64 ans atteints de conditions médicales chroniques.
- 70 % parmi les personnes de 65 ans et plus.

**Tableau 1 - Couverture vaccinale contre la grippe saisonnière chez les adultes (n = 3 032)\* selon le groupe à risque†, et le genre‡, Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, Canada, septembre 2020 à février 2021**

Groupe d'âge (années)	Total		Hommes		Femmes	
	N	Couverture vaccinale % (IC à 95 %)	N	Couverture vaccinale % (IC à 95 %)	N	Couverture vaccinale % (IC à 95 %)
Total des adultes (≥18)	3014	40.4 (38.4-42.4)	1399	35.2 (32.5-38.0)	1595	45.2 (42.4-48.1)
18-64	2152	32.4 (30.1-34.6)	1024	27.3 (24.3-30.3)	1115	37.4 (34.1-40.7)
	646	40.5 (36.2-44.8)	286	36.9 (30.7-43.1)	354	43.5 (37.5-49.4)
	1498	29.2 (26.6-31.8)	734	24.2 (20.8-27.6)	757	34.6 (30.6-38.5)
≥65	862	70.4 (67.1-73.8)	375	68.0 (62.8-73.2)	480	72.8 (68.4-77.1)

\*18 personnes ne se rappelaient pas si elles avaient reçu le vaccin contre la grippe et ont par conséquent été exclues des estimations de la couverture.

†11 personnes entre 18 et 64 ans n'ont pas indiqué si elles souffraient d'une condition médicale chronique et ont par conséquent été exclues de l'analyse stratifiée.

‡11 personnes n'ont pas indiqué leur sexe et 9 personnes ne se sont pas identifiées comme étant un homme ou une femme. Par conséquent, ces personnes ont été exclues de l'analyse stratifiée.

## Efficacité vaccinale

Les estimations de l'efficacité du vaccin contre la grippe sont habituellement disponibles en février ou en mars de chaque année. Étant donné la faible circulation de la grippe cette saison jusqu'à maintenant, les estimations de l'efficacité du vaccin ne seront pas disponibles pour la saison 2020-2021.

## Rapports provinciaux et internationaux sur la grippe

- Colombie-Britannique\* – [Influenza Surveillance; Vaccine Effectiveness Monitoring](#)
- Alberta\* – [Respiratory Virus Surveillance](#)
- Saskatchewan\* – [Influenza Reports](#)
- Manitoba\* – [Seasonal Influenza Reports](#)
- Ontario\* – [Ontario Respiratory Pathogen Bulletin](#)
- Québec – [Système de surveillance de la grippe](#)
- Nouveau Brunswick – [Rapport sur la surveillance de la grippe](#)
- Île-du-Prince-Édouard\* – [Influenza Summary](#)
- Nouvelle-Écosse\* – [Respiratory Watch Report](#)
- Terre-Neuve-et-Labrador\* – [Surveillance and Disease Reports](#)
- Yukon\* – [Information on Pandemic, Influenza, Seasonal Flu, Avian Flu and H1N1](#)
- Territoires du Nord-Ouest\* – [Influenza/ Flu Information](#)
- Nunavut\* – [Influenza Information](#)
- Organisation mondiale de la Santé - [Global Influenza Programme, Influenza Updates](#) (en anglais seulement)
- Organisation panaméricaine de la santé (OPS)\* – [Rapport sur la situation de l'influenza de l'Organisation panaméricaine de la santé](#)
- U.S. Centers for Disease Prevention & Control (CDC)\* - [Weekly Influenza Summary Update](#)
- ECDC\* – [Surveillance reports and disease data on seasonal influenza](#)
- United Kingdom\* – [Weekly Influenza Activity Reports](#)
- Hong Kong Centre for Health Protection\* - [Flu Express](#)
- Australie\* – [Influenza Surveillance Report and Activity Updates](#)
- Nouvelle-Zélande\* – [Influenza Weekly Update](#)

\*Disponible en Anglais seulement

