

ÉPIGRIPPE

15 mai au 21 mai 2022
(Semaine 20)



Faits saillants de la semaine

- L'activité grippale a légèrement diminué par rapport à la semaine précédente (semaine 19), mais reste au-dessus du seuil épidémique. L'activité grippale continue d'être signalée dans presque toutes les régions de la totalité des provinces et territoires.

Virologique

- Au cours de la semaine 20, 1 793 détections de la grippe (1 781 grippe A et 12 grippe B) ont été signalées.
- Parmi les détections avec des renseignements détaillés sur l'âge, la majorité des détections se trouvaient chez des personnes de moins de 45 ans.

Syndromique

- Le pourcentage de visites pour le syndrome grippal était de 1,8 % au cours de la semaine 20. Le pourcentage de visites pour le syndrome grippal dépasse les niveaux prépandémie typiques de cette période de l'année.
- Le pourcentage de participants ActionGrippe ayant déclaré de la fièvre et de la toux était de 1,2 % au cours de la semaine 20.

Éclosions

- Au cours de la semaine 20, 2 éclosions de grippe confirmées en laboratoire ont été signalées.
- Du 29 août 2021 au 21 mai 2022 (semaines 35 à 20), 44 éclosions de grippe confirmées en laboratoire ont été signalées à ce jour cette saison.

Cas sévères

- Du 29 août 2021 au 21 mai 2022 (semaines 35 à 20), 363 hospitalisations associées à la grippe ont été signalées dans les provinces et territoires participants.
- Après une forte augmentation, le réseau IMPACT a signalé une diminution des hospitalisations associées à la grippe dans la population pédiatrique au cours de la semaine 20.

Autres remarques

- Le prochain rapport sur la surveillance de la grippe (semaine 21) sera publié le 3 juin 2022.
- Les rapports hebdomadaires sur les détections en laboratoire de la grippe et d'autres virus respiratoires saisonniers se poursuivront par l'entremise de notre programme de [Surveillance et détection de virus des voies respiratoires](#).




Activité grippale et pseudogrippale (propagation géographique)

Au cours de la semaine 20, l'activité grippale a été signalée dans presque toutes les provinces et tous les territoires. Parmi les 41 régions qui ont signalé une activité grippale, 83 % ont signalé une activité sporadique et 17 % une activité localisée (figure 1).

Figure 1 – Carte de l'activité grippale et pseudogrippale par province et territoire, Canada, semaine 2022-20

Nombre de régions qui ont fait état de la situation dans la semaine 20: 45 sur 53



Détectations de la grippe confirmée en laboratoire

Au cours de semaine 20, 1 793 détections en laboratoire (1 781 cas d'influenza A et 12 cas d'influenza B) ont été signalés. Suite à une forte augmentation au début du mois d'avril, le nombre de détections et le pourcentage hebdomadaire de tests positifs pour la grippe ont diminué cette semaine, mais demeurent au-dessus des niveaux généralement observés à cette période de l'année.

Les résultats suivants ont été rapportés par les laboratoires sentinelles du Canada au cours de la semaine 20 (figures 2 et 3) :

- Le pourcentage hebdomadaire de tests positifs pour la grippe a été de 10,7 % et est supérieur aux niveaux attendus avant la pandémie¹ (3,2 à 9,1 %).
- Au total, 16 316 tests pour la grippe ont été effectués. Le nombre de tests hebdomadaires effectués est supérieur à la moyenne hebdomadaire avant la pandémie¹ de 3 862 tests hebdomadaires.
- Parmi les détections de la grippe A qui ont été sous-typées, 98 % (268 sur 274) étaient la grippe A(H3N2).

À ce jour, cette saison (du 29 août 2021 au 21 mai 2022), 11 064 détections de la grippe ont été signalées :


- 99 % (10 918) étaient de type A
- Parmi les détections de grippe A qui ont été sous-typées (2 223), 98 % étaient la grippe A(H3N2).
- Le nombre total de détections de la grippe est inférieur à ce que nous avons observé avant la pandémie¹, où une moyenne de 46 356 détections de la grippe a été signalée à ce stade-ci de la saison.

Des renseignements détaillés sur l'âge et le type et le sous-type ont été reçus pour 9 772 détections de la grippe confirmées en laboratoire (figure 4). Parmi les 9 772 détections, 4 787 (49 %) se trouvaient chez des personnes de moins de 0 à 20 ans et 2 521 (26 %) chez des personnes de 20 à 44 ans.

Pour obtenir des données cumulatives et hebdomadaires plus détaillées sur la grippe, veuillez lire la description pour les figures 2 et 3 ou le rapport intitulé [Détection de virus des voies respiratoires au Canada](#).


Figure 2 – Nombre et pourcentage de tests de détection de la grippe positifs, par type, sous-type et semaine de surveillance, Canada, semaine 2021-35 à 2022-20

Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation dans la semaine 20: 32 sur 34




La zone ombragée indique les semaines où le taux de positivité était d'au moins 5 % et où un minimum de 15 tests positifs ont été observés, ce qui indique la période d'activité grippale saisonnière.

Figure 3 – Comparaison par rapport aux saisons précédentes du nombre de tests de dépistage de la grippe et du pourcentage de tests positifs au Canada, par semaine, semaine 2021-35 à 2022-20



La zone ombrée représente les données maximal et minimal du nombre de tests de dépistage de la grippe ou le pourcentage de tests positifs signalé par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020. Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Figure 4 – Pourcentage de détection de la grippe positifs, par type/sous-type et groupe d'âge, en fonction des rapports détaillés des cas confirmés en laboratoire, Canada, semaines 2021-35 à 2022-20



Notes sur les données de laboratoire :

L'actuelle pandémie de COVID-19 a une incidence sur les tests de dépistage de la grippe et d'autres virus respiratoires. Les changements dans les pratiques de test en laboratoire peuvent nuire à la comparabilité des données par rapport aux semaines ou aux saisons précédentes.

En raison des différents protocoles d'essai des laboratoires à travers le Canada, il existe des différences dans le nombre de détections incluses dans divers calculs, tableaux et chiffres pour l'ensemble des produits.

Les détections cumulatives de cette saison comprennent 11 co-infections de l'influenza A et B (22 détections au total) qui sont soupçonnées d'être associées à la réception récente du [vaccin vivant atténué contre l'influenza \(VVAI\)](#). Les co-infections connues ou signalées comme étant associées au VVAI administré récemment sont retirées par le laboratoire qui les a présentées ou par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) à compter de la 44^e semaine car elles ne représentent pas la transmission communautaire de virus de la grippe saisonnière.

Surveillance syndromique/syndrome grippal

Surveillance syndromique assurée par les professionnels de la santé sentinelles


Au cours de la semaine 20, 1,8 % des visites de professionnels de la santé étaient attribuables à un syndrome grippal (SG). Au cours des dernières semaines, le pourcentage de consultations pour syndrome grippal s'est stabilisé, mais demeure légèrement supérieur aux niveaux prépandémiques typiques de cette période de l'année.

Depuis le début de la saison, le pourcentage de visites pour syndrome grippal se situe dans ou proche des limites prévues avant la pandémie. Les symptômes de SG ne sont pas propres à un seul agent pathogène respiratoire et peuvent être dus à la grippe ou à d'autres virus respiratoires, y compris le virus respiratoire syncytial et même le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19.

Il convient d'interpréter cette tendance avec prudence, car on observe des changements dans le comportement des personnes qui demandent des soins de santé, ainsi qu'un plus petit nombre de signalements par les sentinelles ces dernières semaines par rapport aux saisons précédentes.

Figure 5 – Pourcentage de visites pour le syndrome grippal déclarées par les sentinelles chaque semaine, Canada, semaines 2021-35 à 2022-20

Nombre de sentinelles qui ont fait état de la situation au cours de la semaine 20: 48



La zone ombrée en bleu représente les pourcentages maximal et minimal signalé par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020. Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

ActionGrippe (Surveillance syndromique participative)

Au cours de la semaine 20, 10 892 participants ont soumis des données au programme ActionGrippe, et 1,2 % du participants ont signalé des symptômes de toux et de fièvre (figure 6). Le pourcentage de participants ActionGrippe qui signalent une toux et une fièvre a diminué au cours des dernières semaines.

Les rapports de toux et de fièvre ne sont pas spécifiques à un seul pathogène respiratoire et peuvent être causé par la grippe ou d'autres virus respiratoires, y compris le virus respiratoire syncytial, le rhinovirus et même la COVID-19. Les signalements du programme ActionGrippe ne sont pas touchés par les changements dans les services de santé ou les comportements favorisant la santé.

Parmi les 127 participants qui ont signalé une toux et de la fièvre :


- 17 % ont consulté un professionnel de la santé, soit une part plus importante que dans les dernières semaines;
- 81 % ont signalé avoir manqué des jours de travail ou d'école, une proportion similaire aux dernières semaines; soit un total combiné de 122 jours d'absence au travail ou à l'école (moyenne de 4,0 jours).

Les Territoires du Nord-Ouest ont eu le taux de participation le plus élevé cette semaine (51 participants par 100 000 habitants) et les quartiers des codes postaux K0A et K2J, ont eu le plus grand nombre de participants (119). Voyez ce qui se passe dans votre [quartier](#)! Des ensembles de données téléchargeables sont également disponibles sur [Cartes ouvertes](#).

Si vous souhaitez participer au programme [ActionGrippe](#), [inscrivez-vous](#) aujourd'hui.

Figure 6 – Pourcentage de participants au programme ActionGrippe qui ont signalé une toux et de la fièvre, Canada, semaine 2021-35 à 2022-20

Nombre de participants qui ont soumis des données pour la semaine 20: 10 892



La zone ombrée en bleu représente les pourcentages maximal et minimal de participants qui signalent une toux et de la fièvre par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020. Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Surveillance des éclosions de la grippe

Au cours de la semaine 20, les éclosions suivantes ont été signalées au Canada :

- 2 épidémies de grippe confirmées en laboratoire ont été signalées, toutes deux dans des établissements de soins de longue durée
- 2 éclosions de syndrome grippal (SG) dans les écoles ou les garderies ont été signalées.

À ce jour, cette saison (du 29 août 2021 au 21 mai 2022) :

- 44 éclosions de la grippe confirmées en laboratoire ont été signalées
 - 22 dans des établissements de soins de longue durée
 - 16 dans des établissements classés comme « autres »
 - 3 dans des collectivités éloignées ou isolées
 - 3 dans des établissements de soins actifs
 - Toutes les éclosions étaient attribuables à la grippe de type A, dont 16 étaient attribuables à la grippe de type A (H3N2), 2 à la grippe de type A (H1N1), et les autres n'avaient pas un sous-type de la grippe A.
- 89 éclosions de SG ont été signalées
 - Toutes les éclosions sauf deux ont été signalées dans les écoles ou dans les garderies.

Les éclosions de SG ne sont pas spécifiques à un seul pathogène respiratoire et peuvent être causées par la grippe ou d'autres virus respiratoires, y compris le virus respiratoire syncytial, le rhinovirus et même la COVID-19. De nombreux virus respiratoires en plus de la grippe circulent couramment à l'automne et l'hiver, et peuvent causer des grappes de cas de maladie respiratoire qui pourraient être capturés comme SG.

Nombre de provinces et territoires¹ qui ont fait état de la situation au cours de la semaine 20: 11 sur 13

¹Toutes les provinces et tous les territoires (PT) participent au système de surveillance des éclosions d'ÉpiGrippe. Ce système surveille les éclosions de grippe et de SG dans les établissements de soins de longue durée, les établissements de soins actifs, les écoles et les garderies, les collectivités éloignées et/ou isolées, et les établissements classés dans la catégorie « Autre ». Ce ne sont pas tous les PT déclarants qui signalent des éclosions dans tous ces contextes. Tous les PT signalent des éclosions confirmées en laboratoire dans les ESLD. Quatre provinces et territoires (N.-B., T.-N.-L., N.-É. et Yukon) signalent des éclosions de SG dans les écoles et/ou les garderies.

Surveillance des cas sévères de grippe

Hospitalisations et décès associés à la grippe déclarés par les provinces et territoires

Au cours de la semaine 20, 15 hospitalisations associées à la grippe et une admission dans une unité de soins intensifs ont été signalées par les provinces et les territoires participants².

À ce jour, cette saison (du 29 août 2021 au 21 mai 2022), parmi les provinces et territoires participants :

- 363 hospitalisations associées à la grippe ont été signalées par les provinces et les territoires participants.
 - Toutes les hospitalisations sauf une étaient dues à la grippe A.
 - Parmi les cas pour lesquels le sous-type a été signalé (153), 99 % étaient associés à la grippe A(H3N2).
 - La plus grande proportion d'hospitalisations (39 %) se trouvait chez des adultes de 65 ans et plus.
- 31 admissions dans des unités de soins intensifs associées à la grippe et 8 décès associés à la grippe ont été signalés.

Nombre de provinces et de territoires ayant déclaré des données au cours de la semaine 20: 8 sur 9

²Des hospitalisations attribuables à la grippe sont déclarées par l'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord-Ouest, et le Yukon. Seules les hospitalisations nécessitant des soins médicaux intensifs sont signalées par la Saskatchewan.

Hospitalisations et décès associés à la grippe chez les enfants

Au cours de la semaine 20, 25 hospitalisations associées à la grippe chez les enfants (âgés de 16 ans ou moins) ont été signalées par le réseau du Programme canadien de surveillance active de l'immunisation (IMPACT) (figure 7). Après une forte augmentation au cours des dernières semaines, les hospitalisations associées à la grippe dans la population pédiatrique diminuent mais se situent au-delà des niveaux généralement observés à cette période de l'année.

À ce jour cette saison (du 29 août 2021 au 21 mai 2022) :

- 187 hospitalisations pédiatriques associées à l'influenza ont été signalées
 - 117 (63 %) étaient parmi les enfants âgés de moins de 5 ans (figure 8).
 - 185 (99%) étaient associées à la grippe A.
- 16 admissions à une unité de soins intensifs (USI) ont été signalées.

Figure 7 – Nombre d'hospitalisations pédiatriques (≤ 16 ans) associées à la grippe signalées par le réseau IMPACT, par semaine, Canada, semaines 2021-35 à 2022-20





Figure 8 - Nombre cumulé d'hospitalisations pédiatriques (≤ 16 ans) associées à la grippe par groupe d'âge signalées par le réseau IMPACT, Canada, semaines 2021-35 à 2022-20



Hospitalisations et décès associés à la grippe chez les adultes

Au cours de la semaine 20, cinq hospitalisations associée à la grippe chez les adultes (16 ans et plus) a été signalée par le Réseau canadien de recherche sur l'immunisation (CIRN) (Réseau SOS).

À ce jour cette saison (du 29 août 2021 au 21 mai 2022), 25 hospitalisations d'adultes associées à la grippe ont été signalées par le Réseau SOS du CIRN.

Caractérisation des souches grippales

À ce jour cette saison (du 29 août 2021 au 21 mai 2022), le Laboratoire national de microbiologie (LNM) a caractérisé 110 virus de la grippe (106 A(H3N2), 4 A(H1N1)) qui ont été reçus des laboratoires au Canada.

Grippe A(H3N2)

Caractérisation génétique

L'analyse de séquence du gène HA de ces virus a montré que les 106 virus A(H3N2) appartenaient au groupe génétique 3C.2a1b.2a2.

Le virus A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) est la composante grippale A(H3N2) du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère Nord de 2021-2022 et appartient au groupe génétique 3C.2a1b.2a1.

Le virus A/Darwin/6/2021 (H3N2) est la composante grippale A(H3N2) du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère sud de 2022 et appartient au groupe génétique 3C.2a1b.2a2.

Caractérisation antigénique

Parmi les 104 virus A(H3N2) caractérisés :

- 26 virus étaient antigéniquement similaires au virus analogue à A/Cambodge/e0826360/2020 (H3N2)
- 78 ont montré des titrages réduits avec des antisérums élevés contre le virus analogue à A/Cambodge/e0826360/2020 (H3N2) cultivé dans l'œuf.

Grippe A(H1N1)

Caractérisation antigénique

Parmi les quatre virus A(H1N1) caractérisés :

- Trois virus A(H1N1) caractérisé était antigéniquement apparenté à A/Wisconsin/588/2019
- Un virus a montré une réduction de leur titre avec l'antisérum de furet contre le virus A/Wisconsin/588/2019 propagé par culture cellulaire.

A/Wisconsin/588/2019 est le composant de la grippe A(H1N1) du vaccin antigrippal de l'hémisphère Nord 2021-2022.

Résistance aux antiviraux

Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) évalue également la résistance antivirale des virus de la grippe reçus des laboratoires au Canada.

Oseltamivir

108 virus de la grippe (104 A(H3N2) et 4 A(H1N1)) ont été testés pour leur résistance à l'oseltamivir, et il a été constaté que :

- Tous les virus de la grippe étaient sensibles à l'oseltamivir.

Zanamivir

108 virus de la grippe (104 A(H3N2) et 4 A(H1N1)) ont été testés pour leur résistance au zanamivir, et il a été constaté que :

- Tous les virus de la grippe étaient sensibles au zanamivir.

Surveillance des vaccins

La surveillance des vaccins fait référence aux activités en lien avec le suivi de la couverture et de l'efficacité du vaccin contre la grippe.

Couverture vaccinale

L'enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière est une enquête téléphonique annuelle menée en janvier et février auprès des Canadiens pour savoir s'ils ont reçu le vaccin annuel contre la grippe cette saison-là. La couverture vaccinale est mesurée en pourcentage de personnes ayant déclaré avoir reçu le vaccin antigrippal au cours d'une saison grippale donnée.

Au cours de la saison grippale 2021-2022, la couverture était similaire à celle de la saison [2020-2021](#) :

- 30 % parmi les personnes de 18 à 64 ans.
 - 27 % parmi les personnes de 18 à 64 ans sans conditions médicales chroniques.
 - 38 % parmi les personnes de 18 à 64 ans atteints de conditions médicales chroniques.
- 71 % parmi les personnes de 65 ans et plus.

Tableau 1 - Couverture vaccinale contre la grippe saisonnière chez les adultes (n = 3 502)* selon le groupe à risque†, et le genre‡, Enquête sur la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière, Canada, septembre 2021 à février 2022

Groupe d'âge (années)	Total		Hommes		Femmes	
	N	Couverture vaccinale % (IC à 95 %)	N	Couverture vaccinale % (IC à 95 %)	N	Couverture vaccinale % (IC à 95 %)
Total des adultes (≥18)	3487	38.7 (36.9-40.6)	1548	33.4 (30.8-36.0)	1914	43.9 (41.3-46.5)
18-64	2389	30.1 (28.0-32.2)	1079	24.9 (22.1-27.8)	1286	35.0 (31.9-38.1)
atteints de conditions médicales chroniques	713	37.6 (33.6-41.7)	298	37.0 (31.0-43.1)	407	38.3 (32.9-43.8)
sans conditions médicales chroniques	1658	26.8 (24.4-29.2)	769	19.9 (16.9-23.0)	873	33.7 (29.9-37.4)
≥65	1098	71.0 (68.1-74.0)	469	67.0 (62.2-71.8)	628	74.6 (70.9-78.3)

*18 personnes ne se rappelaient pas si elles avaient reçu le vaccin contre la grippe et ont par conséquent été exclues des estimations de la couverture.

†11 personnes entre 18 et 64 ans n'ont pas indiqué si elles souffraient d'une condition médicale chronique et ont par conséquent été exclues de l'analyse stratifiée.

‡11 personnes n'ont pas indiqué leur sexe et 9 personnes ne se sont pas identifiées comme étant un homme ou une femme. Par conséquent, ces personnes ont été exclues de l'analyse stratifiée.

Efficacité vaccinale

Les estimations de l'efficacité réelle (ER) du vaccin antigrippal au cours de la saison sont habituellement disponibles en février ou en mars de chaque année. Compte tenu de la faible circulation grippale cette saison à ce jour, les estimations de l'ER ne seront pas disponibles pour la saison 2021-2022.

Rapports provinciaux et internationaux sur la grippe

- Colombie-Britannique* – [Influenza Surveillance; Vaccine Effectiveness Monitoring](#)
- Alberta* – [Respiratory Virus Surveillance](#)
- Saskatchewan* – [Influenza Reports](#)
- Manitoba* – [Seasonal Influenza Reports](#)
- Ontario* – [Ontario Respiratory Pathogen Bulletin](#)
- Québec – [Système de surveillance de la grippe](#)
- Nouveau Brunswick – [Rapports sur la surveillance de la grippe](#)
- Île-du-Prince-Édouard* – [Influenza Summary](#)
- Nouvelle-Écosse* – [Respiratory Watch Report](#)
- Terre-Neuve et Labrador* – [Surveillance and Disease Reports](#)
- Yukon* – [Information on Pandemic, Influenza, Seasonal Flu, Avian Flu and H1N1](#)
- Territoires du Nord-Ouest* – [Influenza/ Flu Information](#)
- Nunavut* – [Influenza Information](#)
- Organization mondiale de la Santé* – [Global Influenza Programme](#)
- Organization panaméricaine de la santé* – [Influenza situation report](#)
- U.S. Centers for Disease Prevention & Control* – [Weekly Influenza Summary Update](#)
- European Centre for Disease Prevention and Control* – [Surveillance reports and disease data on seasonal influenza](#)
- Royaume-Uni* – [Weekly Influenza Activity Reports](#)
- Hong Kong Centre for Health Protection* – [Flu Express](#)
- Australie* – [Influenza Surveillance Report and Activity Updates](#)
- Nouvelle-Zélande* – [Influenza Weekly Update](#)

* en anglais seulement

Notes

Les données du rapport ÉpiGrippe représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction et peuvent changer en fonction de données plus récentes.

Pour en savoir plus sur les définitions, les descriptions et le programme ÉpiGrippe en général, consultez la [Vue d'ensemble de la surveillance de la grippe](#) au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la grippe, consultez notre page Web sur la [grippe](#).

Nous voudrions remercier tous nos partenaires participant au programme ÉpiGrippe cette année.

Ce [rapport](#) est disponible sur la page Web du gouvernement du Canada sur la grippe

This [report](#) is available in both official languages.