L'hépatite B au Canada : Mise à jour des données de surveillance de 2020

En 2020, 3 004 cas[1] d'hépatite B (cas aigus, chroniques et non précisés combinés) ont été déclarés à travers le Canada pour un taux[2] de 8,2 cas pour 100 000 personnes.

La pandémie de COVID-19 a eu pour effet de réduire la demande et l'accès aux services liés aux infections transmissibles sexuellement et par le sang, y compris le dépistage. Cela a probablement eu un impact sur les taux de nouveaux diagnostics de l'hépatite B en 2020, en les réduisant artificiellement.

Hépatite B aiguë

(infections pouvant durer jusqu'à six mois)

Les taux de cas déclarés d'hépatite B aiguë au niveau national étaient stables de 2012 à 2019. En 2020, 123 cas aigus d'hépatite B[3] ont été déclarés, soit un taux de 0,34 cas pour 100 000 personnes.

Taux de cas déclarés d'hépatite B aiguë, 2011 à 2020[4]



Hépatite B aiguë selon le sexe et le groupe d'âge, 2020

63% des cas déclarés d'hépatite B aiguë étaient **des hommes**.

Parmi **les hommes**, ceux âgés de **40 à 59 ans** avaient **le taux de cas déclarés le plus élevé d'hépatite B aiguë**.

Parmi **les femmes**, celles âgées de **20 à 24 ans** avaient **le taux de cas déclarés le plus élevé d'hépatite B aiguë**.

Taux de cas déclarés pour 100 000 personnes d'hépatite B aiguë par province et territoire au Canada, 2020



SO : données non fournies.
DI : données non présentées lorsque le nombre de cas est entre zéro et cinq.

Hépatite B chronique et non précisée

(infections qui durent plus de six mois)

Les taux de cas déclarés d'infections chroniques et non précisées au niveau national étaient stables de 2015 à 2019. En 2020, 2 881 cas d'hépatite B chronique et non précisée ont été déclarés, soit un taux de 7,9 cas pour 100 000 personnes[5].

Taux de cas déclarés d'hépatite B chronique et non précisée, 2011 à 2020



Hépatite B chronique et non précisée selon le sexe et le groupe d'âge, 2020

56% des cas déclarés d'hépatite B chronique et non précisée étaient **des hommes**.

Parmi **les hommes et les femmes, les taux de cas déclarés d'hépatite B chronique et non précisée** étaient les plus élevés chez les 30 à 39 ans.

Taux de cas déclarés pour 100 000 personnes d'hépatite B chronique et non précisée par province et territoire au Canada, 2020



SO : données non fournies.
DI : données non présentées lorsque le nombre de cas est entre zéro et cinq.

L'hépatite B peut être prévenue par la vaccination

Le dépistage de l'hépatite B est recommandé en présence de facteurs de risque, pendant la grossesse et pour les personnes immunodéprimées[6]

1. Source des données : Système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (https://maladies.canada.ca/declaration-obligatoire/). 2. Les données sur le dénominateur de la population proviennent des estimations annuelles de la population d'avril 2022 de Statistique Canada. 3. Toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador, ont fourni des données sur l'hépatite B aiguë en 2020. 4. La déclaration de l'hépatite B aiguë par les provinces et les territoires varie de 2011 à 2020. Pour connaître les modèles de déclaration, veuillez consulter le site https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/surveillance/infections-transmissibles-sexuellement-et-par-sang.html. 5. L'ensemble des provinces et territoires, à l'exception du Manitoba, ont fourni des données sur l'hépatite B chronique et non précisée pour 2020. 6. Soins primaires de l'hépatite B – Aide-Mémoire (VHB-AM) (https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/soins-primaires-hepatite-b-aide-memoire.html).

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de la Santé, 2023.
Cat. : HP40-335/1-2020F-PDF | ISBN : 978-0-660-47720-6 | Pub. : 220780

Agence de la santé publique du Canada
Public Health Agency of Canada

Canada