


Virus de l'hépatite C (VHC)

Dépistage et diagnostic

Pour les professionnels de la santé



67 %

des Canadiens ont indiqué qu'ils n'avaient jamais passé un test de dépistage pour l'hépatite C




44 %

des personnes vivant avec le VHC ne savent pas qu'elles sont infectées

Offrir le dépistage à :

L'hépatite C est souvent **ASYMPTOMATIQUE**



Diagnostic de VIH ou d'hépatite B



Symptômes ou signes cliniques de maladie hépatique




Exposition en milieu de travail (p. ex. piqûre d'aiguille)

Diagnostic de l'hépatite C :


Adoptez une **APPROCHE ACTIVE** pour le dépistage

Le diagnostic de l'infection par le VHC nécessite deux tests

1 Test de dépistage des anticorps anti-hépatite C (ANTI-VHC)



2 Test de détection de l'acide ribonucléique du VHC (ARN du VHC)



Orientation aux soins :

L'hépatite C est **CURABLE**

Rx

Les traitements antiviraux à action directe sans interféron offrent une réponse virologique soutenue **>90 %**



Les régimes de traitement durent de 8 à 24 semaines et ont peu d'effets secondaires



Consultez un professionnel de la santé expérimenté dans la prise en charge de l'hépatite virale

Pour plus d'informations, consultez Canada.ca et recherchez l'hépatite C pour les professionnels de la santé

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Santé, 2018 | Cat. : HP40-254/2019F-PDF | ISBN : 978-0-660-31801-1 | Pub. : 190196



Agence de la santé publique du Canada

Public Health Agency of Canada

Canada