



Accès et recours aux soins de santé et aux services de prévention

Résultats des participants autochtones à l'enquête Track auprès des personnes utilisatrices de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019

Qu'est-ce que l'enquête Track auprès des personnes utilisatrices de drogues injectables (UDI)?

Un système de surveillance comportementale et biologique qui permet de suivre la prévalence du VIH et de l'hépatite C ainsi que les comportements à risque associés chez les personnes UDI au Canada *

42,2%


des participants à l'enquête se sont identifiés comme autochtones

Principaux résultats chez les participants autochtones (n=997)


Accès aux soins de santé primaires

72,2% avaient accès à des soins de santé primaires
63,9% avaient un fournisseur de soins de santé primaires régulier


Les 4 principaux types de soins de santé primaires parmi ceux qui avaient accès à des soins de santé primaires



Utilisation des services de santé et de prévention au cours des 12 derniers mois



Dépistage du VIH et de l'hépatite C




Utilisation de services d'un guérisseur traditionnel au cours des 12 derniers mois

25,1%


Ont utilisé les services d'un guérisseur traditionnel au cours des 12 derniers mois




Plus élevé chez les hommes cisgenres




Plus élevé chez les personnes vivant dans une communauté autochtone



Plus élevé chez les personnes qui ont fréquenté un pensionnat autochtone



Plus élevé chez les personnes avec une mauvaise santé mentale



Expérience de la stigmatisation et/ou de la discrimination


90,2% ont déjà vécu de la stigmatisation et/ou de la discrimination dans leur vie



84,6% ont déjà vécu de la stigmatisation et/ou de la discrimination au cours des douze derniers mois



45,7% ont évité des services de soins de santé en raison d'antécédents de stigmatisation et de discrimination, au cours des douze derniers mois



Sensibilisation à la PPRE

11,5% étaient sensibilisés à la prophylaxie préexposition au VIH par voie orale (PPRE)



* La phase 4 de l'enquête Track auprès des personnes UDI a été menée entre 2017 et 2019 dans 14 sites sentinelles à travers le Canada. Au total, 2383 personnes UDI ont participé à cette enquête et parmi eux, 2360 ont répondu à la question sur le statut autochtone. Cette infographie se concentre sur les résultats des participants autochtones (997 sur 2360). Une comparaison est faite pour les femmes et les hommes cisgenres ; cependant, en raison du faible nombre, cela n'a pas été possible pour les participants qui ont identifié leur genre comme transféminin ou transmasculin. Pour de plus amples renseignements, consultez l'intégralité de notre rapport dans le Relevé des maladies transmissibles au Canada : Résultats nationaux de l'enquête Track auprès des utilisatrices de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019.

[†]ITSS: infection transmissible sexuellement et par le sang

Remerciements: Cette infographie a été réalisée grâce à une collaboration entre Communities, Alliances & Networks et l'Agence de la santé publique du Canada. Les auteurs remercient les participants à l'enquête, les équipes des sites sentinelles et les chercheurs principaux des sites (qui ont travaillé avec les autorités régionales et locales de santé, les chercheurs et les organisations communautaires) et le Laboratoire national de microbiologie. Nous tenons également à remercier l'équipe de rédaction : Meghan Sullivan, Donna Bush, Christian Hui, Melissa Morris, Tami Starlight, Renée Masching, Leigh Jonah et Jill Tarasuk. Un grand merci à Matthew Bonn et Nelson Hollinger pour la vérification de l'infographie.

Accès et recours aux soins de santé et aux services de prévention | Pub: 210303 | Cat: HP40-294/2021F-PDF | ISBN: 978-0-660-40313-7 | Fre. | PDF

