

Estimations de l'hépatite virale chez les populations clés

Canada, 2021

L'hépatite B et l'hépatite C touchent de manière disproportionnée certaines populations et communautés¹.

Hépatite C


On estime que **0,56 %** de la population générale² vivait avec **l'hépatite C chronique**³.

On estime que **0,99 %** de la population générale avait **déjà eu l'hépatite C**⁴.

La proportion estimée de personnes qui avaient l'hépatite C varie selon les populations clés :

Personnes utilisatrices de drogues par injection⁵

(100 300 personnes⁶)




dont environ **1 personne sur 2** ne savait pas qu'elle avait contracté l'infection.

64,2 % ou **64 400** personnes avaient déjà eu l'hépatite C

Personnes incarcérées dans des prisons fédérales

(12 405 personnes)




dont environ **1 personne sur 3** ne savait pas qu'elle avait contracté l'infection.

11,1 % ou **1 400** personnes avaient déjà eu l'hépatite C

Adultes de la cohorte de naissances de 1945 à 1975

(14 267 340 personnes)



dont environ **1 personne sur 3** ne savait pas qu'elle avait contracté l'infection.

1,9 % ou **270 000** personnes avaient déjà eu l'hépatite C

Personnes ayant déjà utilisé des drogues par injection

(388 400 personnes⁶)



35,4 % ou **137 000** personnes avaient déjà eu l'hépatite C

Personnes incarcérées dans des prisons provinciales

(18 950 personnes)



14,2 % ou **2 700** personnes avaient déjà eu l'hépatite C

Immigrants provenant de pays où l'hépatite C est courante⁷


(1 276 405 personnes)



4,0 % ou **51 500** personnes avaient déjà eu l'hépatite C

Premières Nations


(1 048 400 personnes)



8,0 % ou **84 000** personnes avaient déjà eu l'hépatite C

Hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes

(669 613 personnes⁶)



3,0 % ou **20 100** personnes avaient déjà eu l'hépatite C

La **proportion** estimée de personnes vivant avec l'hépatite C chronique était la plus élevée parmi les **personnes utilisatrices de drogues par injection**.

Le **nombre** estimé de personnes vivant avec l'hépatite C chronique était le plus élevé chez les **adultes nés entre 1945 et 1975**.

Les informations étaient insuffisantes pour fournir des estimations nationales chez les Inuits et les Métis, ainsi que des estimations sur la connaissance de leur infection pour certaines populations clés.


Hépatite B

Environ **0,68 %** de la population générale vivait avec **l'hépatite B chronique**⁸

La proportion estimée de personnes qui vivaient avec l'hépatite B varie selon les populations clés :


Immigrants provenant de pays où l'hépatite B est courante⁹

(5 599 485 personnes)



Hommes gais, bisexuels et hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes

(669 613 personnes⁶)



Personnes incarcérées dans des prisons fédérales

(12 405 personnes)



La **proportion** et le **nombre** estimés les plus élevés de personnes vivant avec l'hépatite B chronique étaient chez les **immigrants en provenance de pays où l'hépatite B est courante**.

Les informations étaient insuffisantes pour fournir des estimations nationales chez les personnes utilisatrices de drogues par injection, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les personnes incarcérées dans les prisons provinciales, et des estimations de la connaissance de leur infection pour toutes les populations clés.

Bien que le fardeau global de l'hépatite virale soit faible dans la population générale canadienne, les estimations nationales de 2021 indiquent que certaines populations et communautés restent disproportionnellement touchées, et qu'un nombre important de personnes au Canada bénéficieraient de tests et de traitements ciblés.

1 En raison du chevauchement important entre ces populations clés, elles n'ont pas été considérées comme étant mutuellement exclusives. Les méthodes, les résultats complets et une liste de référence sont disponibles dans Périnet S. et coll., Estimations nationales relatives à l'hépatite B et à l'hépatite C pour 2021 : mesurer les progrès du Canada vers l'élimination de l'hépatite virale en tant que problème de santé publique, Relevé des maladies transmissibles au Canada (soumis).

2 Estimations pour la population générale progrès du Canada vers l'élimination disponibles à l'adresse <https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/progress-towards-eliminating-viral-hepatitis-threat-2021/progres-vers-elimination-hepatite-virale-menace-2021.pdf>

3 Cela représente les personnes atteintes d'une infection virémique comme approximation de l'hépatite C chronique.

4 Cela représente les personnes vivant avec un statut positif aux anticorps du virus de l'hépatite C, y compris celles atteintes d'une hépatite C chronique, celles dont l'infection s'est résolue de manière spontanée et celles qui ont été guéries grâce à un traitement.

5 Au cours des 12 derniers mois

6 La taille de la population a été estimée par une méthode du multiplicateur direct.

7 Pays ou région dont la prévalence des anticorps du virus de l'hépatite B est estimée à 2 % ou plus

8 Cela représente les personnes ayant un antigène de surface de l'hépatite B positif comme approximation de l'hépatite B chronique.

9 Pays ou région dont la prévalence de l'antigène de surface de l'hépatite B est estimée à 2 % ou plus