



Syphilis chez les femmes et syphilis congénitale au Canada, 2019

En 2019, près de **2 000** cas de syphilis infectieuse ont été signalés chez les femmes au Canada



Les femmes représentent près d'un 1 cas de syphilis sur 4

La proportion de cas étant des femmes a augmenté de 6 % en 2015, à **24 %** en 2019



Les femmes en âge de procréer sont les plus touchées


De 2015 à 2019, les taux étaient les plus élevés chez les femmes âgées de **15-39 ans**




Le nombre de cas signalés de syphilis congénitale est plus élevé que jamais

En 2019, il y a eu **45 cas confirmés** et **25 cas probables*** de syphilis congénitale

Taux de syphilis infectieuse chez les femmes et taux de syphilis congénitale



Nombre de cas confirmés de syphilis congénitale



Facteurs de risque pour la syphilis maternelle et congénitale au Canada[†]



Accès et recours aux soins prénatals
Insuffisants ou inexistants



Consommation de substances
Alcool, tabac et méthamphétamines



Statut socio-économique
Faible revenu



Géographie
Résidence rurale ou éloignée



Stigmatisation
Traumatisme historique
Discrimination dans les soins de santé

Les données préliminaires pour 2018 et 2019 ont été partagées par les provinces et territoires et pourraient différer légèrement des chiffres définitifs

*L'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et le Québec ont une définition de cas probable pour la syphilis congénitale

[†]Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à *Syphilis au Canada - Rapport technique sur les tendances épidémiologiques, les déterminants et interventions, 2020*



Agence de la santé publique du Canada
Public Health Agency of Canada

