



TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES

Tableau A : Indicateurs de prévention et de dépistage par caractéristiques sociodémographiques et déterminants sociaux de la santé des participants à l'enquête Track auprès des utilisateurs de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019 (n = 2 383)

	Total des caractéristiques socio-démographiques et des déterminants sociaux de la santé (n = 2 383)		Recours à un programme de distribution de seringues au cours des douze derniers mois ^a			Fréquentation d'un site d'injection ou de consommation supervisée au cours des douze derniers mois ^a			Recours à la méthadone, à la buprénorphine ou à un autre traitement de substitution aux opiacés au cours des douze derniers mois ^b			Antécédents de dépistage du VIH			Antécédents de dépistage du VHC		
	n	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%
Caractéristiques sociodémographiques																	
Identité de genre																	
Femme cisgenre	775	32,7	540	588	91,8	77	589	13,1	287	588	48,8	691	751	92,0	686	747	91,8
Homme cisgenre	1 556	65,6	920	1 029	89,4	141	1 027	13,7	482	1 026	47,0	1 351	1 505	89,8	1 363	1 507	90,4
Personne transféminine ^c	24	1,0	16	18	88,9	2	18	11,1	4	18	22,2	22	23	95,7	20	22	90,9
Personne transmasculine ^d	17	0,7	11	14	78,6	3	14	21,4	5	14	35,7	11	14	78,6	12	14	85,7
Groupe d'âge																	
Moins de 25 ans	161	6,8	116	128	90,6	18	128	14,1	47	128	36,7	123	152	80,9	122	153	79,7
25 à 39 ans	1 058	44,5	706	770	91,7	124	771	16,1	421	769	54,7	939	1 023	91,8	934	1 020	91,6
40 à 54 ans	895	37,6	523	577	90,6	58	575	10,1	247	577	42,8	796	866	91,9	800	865	92,5
55 ans ou plus	264	11,1	144	177	81,4	23	177	13,0	65	175	37,1	222	257	86,4	229	257	89,1
Site sentinel																	
Whitehorse (Yn)	49	2,1	40	48	83,3	3	48	6,3	20	48	41,7	44	47	93,6	45	48	93,8
Centre et nord de l'île de Vancouver (C.-B.)	179	7,5	166	176	94,3	110	176	62,5	114	175	65,1	161	173	93,1	158	173	91,3
Prince Albert (Sask.)	184	7,7	166	176	94,3	4	174	2,3	96	175	54,9	162	175	92,6	160	173	92,5
Regina (Sask.)	205	8,6	191	202	94,6	4	202	2,0	75	202	37,1	181	199	91,0	182	196	92,9
Winnipeg (Man.)	181	7,6	152	171	88,9	5	171	2,9	26	171	15,2	131	163	80,4	121	161	75,2
Thunder Bay (Ont.)	200	8,4	174	198	87,9	30	199	15,1	106	199	53,3	170	197	86,3	176	195	90,3
London (Ont.)	206	8,6	190	202	94,1	2	202	1,0	101	202	50,0	178	199	89,4	185	200	92,5
Hamilton (Ont.)	157	6,6	133	154	86,4	61	154	39,6	70	154	45,5	132	148	89,2	135	150	90,0
Ottawa (Ont.) et région de l'Outaouais (Qc)	200	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	197	91,4	176	196	89,8
Montréal (Qc)	200	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	200	98,5	196	200	98,0
Québec (Qc)	125	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	123	95,1	117	122	95,9
Autres sites urbains de la province de Québec ^e	167	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	164	94,5	153	166	92,2
Nouveau-Brunswick	200	8,4	184	197	93,4	2	197	1,0	114	195	58,5	169	189	89,4	176	190	92,6
Terre-Neuve	130	5,5	94	129	72,9	2	129	1,6	58	129	45,0	103	125	82,4	106	126	84,1
Niveau d'instruction le plus élevé																	
Études secondaires non terminées	1 139	48,0	711	789	90,1	91	789	11,5	359	787	45,6	967	1 091	88,6	980	1 093	89,7
Études secondaires terminées	621	26,2	406	453	89,6	59	453	13,0	213	452	47,1	550	606	90,8	549	601	91,3
Études supérieures réalisées après les études secondaires	613	25,8	368	406	90,6	71	405	17,5	205	406	50,5	558	597	93,5	552	597	92,5



Tableau A : Indicateurs de prévention et de dépistage par caractéristiques sociodémographiques et déterminants sociaux de la santé des participants à l'enquête Track auprès des utilisateurs de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019 (n = 2 383) (suite)

	Total des caractéristiques socio-démographiques et des déterminants sociaux de la santé (n = 2 383)	Recours à un programme de distribution de seringues au cours des douze derniers mois ^a			Fréquentation d'un site d'injection ou de consommation supervisée au cours des douze derniers mois ^a			Recours à la méthadone, à la buprénorphine ou à un autre traitement de substitution aux opiacés au cours des douze derniers mois ^b			Antécédents de dépistage du VIH			Antécédents de dépistage du VHC				
		n	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%
Caractéristiques sociodémographiques																		
Difficultés financières ^f rencontrées au cours des douze derniers mois																		
Non	207	14,0	171	202	84,7	12	202	5,9	67	202	33,2	161	195	82,6	160	191	83,8	
Oui	1 272	86,0	1 129	1 247	90,5	209	1 246	16,8	612	1 244	49,2	1 091	1 219	89,5	1 098	1 219	90,1	
Situation de logement au cours des six derniers mois																		
Situation de logement précaire ^g	1 486	62,6	1 062	1 169	90,8	196	1 169	16,8	548	1 168	46,9	1 282	1 430	89,7	1 296	1 430	90,6	
Situation de logement stable	888	37,4	425	480	88,5	25	479	5,2	231	478	48,3	794	865	91,8	787	863	91,2	
Antécédents d'incarcération ^h																		
Non	422	24,3	368	418	88,0	68	418	16,3	170	417	40,8	332	403	82,4	327	397	82,4	
Oui	1 314	75,7	1 122	1 235	90,9	155	1 234	12,6	610	1 233	49,5	1 146	1 262	90,8	1 165	1 265	92,1	
Santé mentale																		
Passable à excellente	1 401	84,0	1 234	1 376	89,7	178	1 375	12,9	651	1 374	47,4	1 188	1 345	88,3	1 200	1 341	89,5	
Mauvaise	267	16,0	243	261	93,1	42	261	16,1	122	260	46,9	231	256	90,2	231	256	90,2	
Antécédents de stigmatisation et de discrimination ⁱ																		
Non	166	11,3	131	162	80,9	13	162	8,0	65	161	40,4	128	159	80,5	131	157	83,4	
Oui	1 298	88,7	1 156	1 276	90,6	207	1 275	16,2	612	1 274	48,0	1 114	1 243	89,6	1 119	1 242	90,1	
Antécédents de violences physiques, sexuelles ou psychologiques durant l'enfance																		
Non	220	15,0	188	214	87,9	26	215	12,1	100	215	46,5	168	209	80,4	168	207	81,2	
Oui	1 243	85,0	1 102	1 224	90,0	192	1 222	15,7	576	1 220	47,2	1 074	1 193	90,0	1 081	1 191	90,8	
Antécédents de violences physiques, sexuelles ou psychologiques de la part d'un partenaire sexuel																		
Non	351	24,1	293	344	85,2	44	344	12,8	152	344	44,2	269	334	80,5	268	328	81,7	
Oui	1 107	75,9	994	1 090	91,2	175	1 089	16,1	524	1 087	48,2	970	1 064	91,2	977	1 066	91,7	
Statut autodéclaré à l'égard du VIH																		
Statut séronégatif pour le VIH	1 756	75,4	1 105	1 206	91,6	184	1 204	15,3	612	1 203	50,9	1 752	1 752	100,0	1 689	1 737	97,2	
Statut séropositif pour le VIH	214	9,2	130	138	94,2	8	138	5,8	75	137	54,7	214	214	100,0	206	208	99,0	
Statut non connu	360	15,4	244	296	82,4	30	297	10,1	89	297	30,0	110	329	33,4	183	342	53,5	
Statut autodéclaré à l'égard de l'hépatite C ^j																		
Non infecté	870	37,4	565	633	89,3	80	632	12,7	257	630	40,8	821	853	96,2	844	844	100,0	
Actuellement infecté	662	28,5	403	431	93,5	56	430	13,0	246	430	57,2	634	654	96,9	662	662	100,0	
Antécédents d'infection	422	18,1	257	279	92,1	45	279	16,1	174	279	62,4	407	414	98,3	421	421	100,0	
Statut non connu	373	16,0	254	298	85,2	39	299	13,0	99	299	33,1	207	367	56,4	157	367	42,8	
Total			1 490	1 653	90,1	223	1 652	13,5	780	1 650	47,3	2 080	2 299	90,5	2 086	2 296	90,9	

Abréviations : C.-B., Colombie-Britannique; Man., Manitoba; Ont., Ontario; Qc, Québec; Sask., Saskatchewan; VIH, virus de l'immunodéficience humaine; Yn, Yukon; -, question n'ayant pas été posée dans ce site

^a Cette question n'a pas été posée dans les sites du réseau SurvUDI

^b Le total représente le nombre total de personnes associées à l'indicateur concerné et à la caractéristique démographique correspondante, à l'exception des personnes ayant répondu par « Je ne sais pas », « Refus » et « Non indiqué »

^c Les personnes transféminines inclut les personnes de sexe masculin à la naissance, mais qui s'identifient comme femmes ou non binaires

^d Les personnes transmasculines inclut les personnes de sexe féminin à la naissance, mais qui s'identifient comme hommes ou non binaires

^e Les autres sites urbains de la province de Québec étaient l'Abitibi-Témiscamingue, la Montérégie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Cantons de l'Est et la Mauricie-Centre-du-Québec

^f Défini en tant qu'avoir eu du mal à « joindre les deux bouts » au cours de l'année précédant l'entrevue

^g Défini en tant qu'avoir vécu dans une chambre d'hôtel ou de motel, une maison de chambre ou une pension de famille, un refuge ou une auberge de jeunesse, une maison ou un foyer de transition, un établissement psychiatrique ou un centre de désintoxication, un lieu public ou un établissement correctionnel

^h Seules des données partielles étaient disponibles dans les sites du réseau SurvUDI

ⁱ Défini en tant qu'avoir déjà souffert de stigmatisation ou de discrimination (par exemple, évitement, pitié, blâme, honte, rejet, agression verbale ou intimidation) fondée sur l'origine ethnique ou culturelle, le statut de séropositivity pour le VIH, le statut de séropositivity pour l'hépatite C, l'orientation sexuelle, la consommation d'alcool ou de drogues ou le recours au travail sexuel

^j Seules des données partielles étaient disponibles dans les sites du réseau SurvUDI et dans le site de London



TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES

Tableau B : Indicateurs de comportements d'injection et de consommation de drogue par caractéristiques sociodémographiques et déterminants sociaux de la santé des participants à l'enquête Track auprès des utilisateurs de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019 (n = 2 383)

	Total des caractéristiques socio-démographiques et des déterminants sociaux de la santé (n = 2 383)			Pratique quotidienne de l'injection au cours du dernier mois ^a			Consommation de drogues injectables dans un lieu public au cours des six derniers mois			Emprunt d'aiguilles ou de seringues usagées au cours des six derniers mois			Emprunt d'autres matériaux d'injection usagés (par exemple, eau, filtres, réchauds, garrots, ouate, acidifiants) au cours des six derniers mois			Emprunt de matériel de consommation usagé autre que du matériel d'injection (par exemple pailles, billets de banque ou pipes) au cours des six derniers mois ^a		
	n	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	
Caractéristiques sociodémographiques																		
Identité de genre																		
Femme cisgenre	775	32,7	309	727	42,5	393	767	51,2	96	761	12,6	348	758	45,9	408	691	59,0	
Homme cisgenre	1 556	65,6	497	1 386	35,9	818	1 543	53,0	165	1 534	10,8	512	1 520	33,7	722	1 327	54,4	
Personne transféminine ^c	24	1,0	6	21	28,6	17	24	70,8	4	23	17,4	11	23	47,8	10	21	47,6	
Personne transmasculine ^d	17	0,7	7	16	43,8	12	16	75,0	6	14	42,9	11	16	68,8	9	15	60,0	
Groupe d'âge																		
Moins de 25 ans	161	6,8	62	147	42,2	113	159	71,1	20	155	12,9	80	157	51,0	91	144	63,2	
25 à 39 ans	1 058	44,5	419	961	43,6	664	1 049	63,3	144	1 040	13,8	434	1 037	41,9	576	923	62,4	
40 à 54 ans	895	37,6	283	808	35,0	384	885	43,4	82	880	9,3	290	874	33,2	379	762	49,7	
55 ans ou plus	264	11,1	58	238	24,4	82	263	31,2	24	263	9,1	77	255	30,2	106	229	46,3	
Site sentinelle																		
Whitehorse (Yn)	49	2,1	6	48	12,5	19	48	39,6	3	46	6,5	18	47	38,3	34	48	70,8	
Centre et nord de l'île de Vancouver (C.-B.)	179	7,5	68	179	38,0	139	178	78,1	19	177	10,7	67	175	38,3	125	174	71,8	
Prince Albert (Sask.)	184	7,7	78	177	44,1	104	176	59,1	17	174	9,8	105	174	60,3	78	171	45,6	
Regina (Sask.)	205	8,6	81	203	39,9	77	201	38,3	16	201	8,0	86	203	42,4	120	195	61,5	
Winnipeg (Man.)	181	7,6	96	178	53,9	96	177	54,2	26	175	14,9	88	169	52,1	113	170	66,5	
Thunder Bay (Ont.)	200	8,4	54	197	27,4	97	199	48,7	8	199	4,0	70	199	35,2	129	195	66,2	
London (Ont.)	206	8,6	-	-	-	122	204	59,8	31	205	15,1	81	202	40,1	-	-	-	
Hamilton (Ont.)	157	6,6	63	157	40,1	87	156	55,8	15	154	9,7	69	154	44,8	82	145	56,6	
Ottawa (Ont.) et région de l'Outaouais (Qc)	200	8,4	54	198	27,3	81	200	40,5	26	200	13,0	42	199	21,1	97	197	49,2	
Montréal (Qc)	200	8,4	96	200	48,0	141	200	70,5	25	199	12,6	41	200	20,5	120	178	67,4	
Québec (Qc)	125	5,3	46	124	37,1	51	124	41,1	17	123	13,8	26	125	20,8	42	110	38,2	
Autres sites urbains de la province de Québec ^e	167	7,0	45	167	26,9	45	167	26,9	30	166	18,1	37	154	24,0	53	156	34,0	
Nouveau-Brunswick	200	8,4	86	198	43,4	132	198	66,7	22	193	11,4	92	195	47,2	109	195	55,9	
Terre-Neuve	130	5,5	49	129	38,0	52	129	40,3	16	127	12,6	60	128	46,9	51	125	40,8	
Niveau d'instruction le plus élevé																		
Études secondaires non terminées	1 139	48,0	376	1 025	36,7	597	1 126	53,0	127	1 116	11,4	414	1 110	37,3	555	992	55,9	
Études secondaires terminées	621	26,2	218	570	38,2	323	616	52,4	65	611	10,6	234	604	38,7	308	549	56,1	
Études supérieures réalisées après les études secondaires	613	25,8	226	556	40,6	320	610	52,5	79	607	13,0	233	605	38,5	289	514	56,2	
Difficultés financières ^f rencontrées au cours des douze derniers mois																		
Non	207	14,0	71	204	34,8	84	204	41,2	9	202	4,5	58	201	28,9	90	195	46,2	
Oui	1 272	86,0	510	1 260	40,5	719	1 256	57,2	133	1 242	10,7	597	1 241	48,1	750	1 221	61,4	



Tableau B : Indicateurs de comportements d'injection et de consommation de drogue par caractéristiques sociodémographiques et déterminants sociaux de la santé des participants à l'enquête Track auprès des utilisateurs de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019 (n = 2 383) (suite)

	Total des caractéristiques socio-démographiques et des déterminants sociaux de la santé (n = 2 383)	Pratique quotidienne de l'injection au cours du dernier mois ^a			Consommation de drogues injectables dans un lieu public au cours des six derniers mois			Emprunt d'aiguilles ou de seringues usagées au cours des six derniers mois			Emprunt d'autres matériels d'injection usagés (par exemple, eau, filtres, réchauds, garrots, ouate, acidifiants) au cours des six derniers mois			Emprunt de matériel de consommation usagé autre que du matériel d'injection (par exemple pailles, billets de banque ou pipes) au cours des six derniers mois ^a					
		n	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	n	total ^b	%	
Caractéristiques sociodémographiques																			
Situation de logement au cours des six derniers mois																			
Situation de logement précaire ^g	1 486	62,6	519	1 317	39,4	983	1 473	66,7	181	1 458	12,4	607	1 453	41,8	800	1 275	62,7		
Situation de logement stable	888	37,4	301	834	36,1	258	880	29,3	89	877	10,1	273	867	31,5	351	780	45,0		
Antécédents d'incarcération^h																			
Non	422	24,3	159	401	39,7	227	419	54,2	37	413	9,0	185	413	44,8	224	388	57,7		
Oui	1 314	75,7	434	1 114	39,0	728	1 297	56,1	144	1 288	11,2	560	1 283	43,6	640	1 076	59,5		
Santé mentale																			
Passable à excellente	1 401	84,0	475	1 221	38,9	744	1 387	53,6	124	1 375	9,0	591	1 371	43,1	690	1 179	58,5		
Mauvaise	267	16,0	101	237	42,6	169	263	64,3	45	261	17,2	137	260	52,7	145	231	62,8		
Antécédents de stigmatisation et de discriminationⁱ																			
Non	166	11,3	49	164	29,9	62	163	38,0	4	162	2,5	41	162	25,3	62	154	40,3		
Oui	1 298	88,7	523	1 288	40,6	733	1 285	57,0	137	1 270	10,8	609	1 268	48,0	774	1 250	61,9		
Antécédents de violences physiques, sexuelles ou psychologiques durant l'enfance																			
Non	220	15,0	83	218	38,1	95	216	44,0	10	215	4,7	75	213	35,2	114	209	54,5		
Oui	1 243	85,0	493	1 235	39,9	698	1 232	56,7	130	1 218	10,7	574	1 217	47,2	718	1 195	60,1		
Antécédents de violences physiques, sexuelles ou psychologiques de la part d'un partenaire sexuel																			
Non	351	24,1	119	348	34,2	154	348	44,3	23	343	6,7	115	344	33,4	153	333	45,9		
Oui	1 107	75,9	456	1 100	41,5	638	1 096	58,2	118	1 085	10,9	532	1 082	49,2	680	1 067	63,7		
Statut autodéclaré à l'égard du VIH																			
Statut séronégatif pour le VIH	1 756	75,4	632	1 609	39,3	944	1 753	53,9	195	1 744	11,2	645	1 732	37,2	852	1 537	55,4		
Statut séropositif pour le VIH	214	9,2	65	188	34,6	95	213	44,6	35	212	16,5	84	209	40,2	87	182	47,8		
Statut non connu	360	15,4	109	325	33,5	187	356	52,5	39	353	11,0	143	354	40,4	201	316	63,6		
Statut autodéclaré à l'égard de l'hépatite C																			
Non infecté	870	37,4	282	817	34,5	439	867	50,6	75	862	8,7	282	854	33,0	461	789	58,4		
Actuellement infecté	662	28,5	241	563	42,8	395	661	59,8	112	655	17,1	288	654	44,0	282	532	53,0		
Antécédents d'infection	422	18,1	160	395	40,5	193	421	45,8	48	421	11,4	143	417	34,3	185	376	49,2		
Statut non connu	373	16,0	124	342	36,3	197	372	53,0	33	369	8,9	158	369	42,8	207	334	62,0		
Total			822	2 155	38,1	1 243	2 357	52,7	271	2 339	11,6	882	2 324	38,0	1 153	2 059	56,0		

Abréviations : C.-B., Colombie-Britannique; Man., Manitoba; Ont., Ontario; Qc, Québec; Sask., Saskatchewan; VIH : virus de l'immunodéficience humaine; Yn, Yukon; -, question n'ayant pas été posée dans ce site.

^a Cette question n'a pas été posée au site de London

^b Le total représente le nombre total de personnes associées à l'indicateur concerné et à la caractéristique démographique correspondante, à l'exception des personnes ayant répondu par « Je ne sais pas », « Refus » et « Non indiqué »

^c Les personnes transféminines inclut les personnes de sexe masculin à la naissance, mais qui s'identifient comme femmes ou non binaires

^d Les personnes transmasculines inclut les personnes de sexe féminin à la naissance, mais qui s'identifient comme hommes ou non binaires

^e Les autres sites urbains de la province de Québec étaient l'Abitibi-Témiscamingue, la Montérégie, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, les Cantons de l'Est et la Mauricie–Centre-du-Québec

^f Défini en tant qu'avoir eu du mal à « joindre les deux bouts » au cours de l'année précédant l'enquête

^g Défini en tant qu'avoir vécu dans une chambre d'hôtel ou de motel, une maison de chambre ou une pension de famille, un refuge ou une auberge de jeunesse, une maison ou un foyer de transition, un établissement psychiatrique ou un centre de désintoxication, un lieu public ou un établissement correctionnel

^h Seules des données partielles étaient disponibles dans les sites du réseau SurvUDI

ⁱ Défini en tant qu'avoir déjà souffert de stigmatisation ou de discrimination (par exemple, évitement, pitié, blâme, honte, rejet, agression verbale ou intimidation) fondée sur l'origine ethnique ou culturelle, le statut de séropositivité pour le VIH, le statut de séropositivité pour l'hépatite C, l'orientation sexuelle, la consommation d'alcool ou de drogues ou le recours au travail sexuel

^j Seules des données partielles étaient disponibles dans les sites du réseau SurvUDI et dans le site de London



TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES

Tableau C : Indicateurs de comportements sexuels à risque par caractéristiques sociodémographiques et déterminants sociaux de la santé des participants à l'enquête Track auprès des utilisateurs de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019 (n = 2 383)

	Total des caractéristiques socio-démographiques et des déterminants sociaux de la santé (n = 2 383)		Deux partenaires sexuels ou plus au cours des six derniers mois ^a			Utilisation irrégulière du préservatif lors de relations vaginales ou anales avec un partenaire sexuel occasionnel au cours des six derniers mois ^b			Relations sexuelles rémunérées au cours des six derniers mois			Absence de préservatif lors de la dernière relation sexuelle rémunérée ^c			Consommation de substances avant ou pendant les relations sexuelles au cours des six derniers mois ^c		
	n	%	n	total ^d	%	n	total ^d	%	n	total ^d	%	n	total ^d	%	n	total ^d	%
Caractéristiques sociodémographiques																	
Identité de genre																	
Femme cisgenre	775	32,7	273	718	38,0	129	219	58,9	189	629	30,0	36	151	23,8	413	487	84,8
Homme cisgenre	1 556	65,6	503	1 512	33,3	270	454	59,5	77	1 120	6,9	27	54	50,0	648	775	83,6
Personne transféminine ^e	24	1,0	12	21	57,1	9	13	69,2	9	20	45,0	2	6	33,3	14	16	87,5
Personne transmasculine ^f	17	0,7	8	14	57,1	5	10	50,0	4	13	30,8	1	4	25,0	10	11	90,9
Groupe d'âge																	
Moins de 25 ans	161	6,8	80	150	53,3	45	66	68,2	30	136	22,1	8	26	30,8	104	110	94,5
25 à 39 ans	1 058	44,5	395	1 004	39,3	207	345	60,0	147	874	16,8	30	116	25,9	564	653	86,4
40 à 54 ans	895	37,6	264	858	30,8	124	227	54,6	97	625	15,5	24	68	35,3	344	430	80,0
55 ans ou plus	264	11,1	58	257	22,6	36	59	61,0	6	150	4,0	4	5	80,0	75	98	76,5
Site sentinelles																	
Whitehorse (Yn)	49	2,1	21	48	43,8	10	19	52,6	7	43	16,3	0	7	0,0	37	43	86,0
Centre et nord de l'île de Vancouver (C.-B.)	179	7,5	61	169	36,1	34	59	57,6	28	135	20,7	9	27	33,3	120	131	91,6
Prince Albert (Sask.)	184	7,7	60	173	34,7	29	56	51,8	20	152	13,2	2	20	10,0	120	149	80,5
Regina (Sask.)	205	8,6	53	195	27,2	35	63	55,6	29	161	18,0	5	29	17,2	123	160	76,9
Winnipeg (Man.)	181	7,6	72	160	45,0	36	57	63,2	25	147	17,0	9	24	37,5	124	146	84,9
Thunder Bay (Ont.)	200	8,4	61	185	33,0	43	77	55,8	24	170	14,1	7	24	29,2	142	167	85,0
London (Ont.)	206	8,6	51	197	25,9	-	-	-	13	127	10,2	4	12	33,3	100	122	82,0
Hamilton (Ont.)	157	6,6	49	147	33,3	25	39	64,1	14	112	12,5	7	14	50,0	96	109	88,1
Ottawa (Ont.) et région de l'Outaouais (Qc)	200	8,4	61	193	31,6	36	55	65,5	18	147	12,2	-	-	-	-	-	-
Montréal (Qc)	200	8,4	53	196	27,0	25	55	45,5	11	115	9,6	-	-	-	-	-	-
Québec (Qc)	125	5,3	51	122	41,8	30	43	69,8	21	91	23,1	-	-	-	-	-	-
Autres sites urbains de la province de Québec ^g	167	7,0	58	166	34,9	30	47	63,8	12	119	10,1	-	-	-	-	-	-
Nouveau-Brunswick	200	8,4	87	192	45,3	49	72	68,1	41	159	25,8	16	41	39,0	136	157	86,6
Terre-Neuve	130	5,5	60	127	47,2	31	56	55,4	17	108	15,7	7	17	41,2	90	108	83,3
Niveau d'instruction le plus élevé																	
Études secondaires non terminées	1 139	48,0	360	1 073	33,6	183	300	61,0	124	848	14,6	31	100	31,0	509	612	83,2
Études secondaires terminées	621	26,2	215	595	36,1	106	197	53,8	78	471	16,6	12	56	21,4	294	356	82,6
Études supérieures réalisées après les études secondaires	613	25,8	221	597	37,0	121	198	61,1	77	463	16,6	22	58	37,9	281	320	87,8
Difficultés financières^h rencontrées au cours des douze derniers mois																	
Non	207	14,0	69	196	35,2	36	58	62,1	17	157	10,8	5	17	29,4	115	156	73,7
Oui	1 272	86,0	454	1 198	37,9	256	440	58,2	188	1 029	18,3	57	186	30,6	873	1 013	86,2
Situation de logement au cours des six derniers mois																	
Situation de logement précaire ⁱ	1 486	62,6	550	1 405	39,1	301	487	61,8	204	1 132	18,0	59	172	34,3	802	918	87,4
Situation de logement stable	888	37,4	247	863	28,6	111	208	53,4	73	651	11,2	7	40	17,5	283	371	76,3



Tableau C : Indicateurs de comportements sexuels à risque par caractéristiques sociodémographiques et déterminants sociaux de la santé des participants à l'enquête Track auprès des utilisateurs de drogues injectables au Canada, phase 4, 2017 à 2019 (n = 2 383) (suite)

	Total des caractéristiques socio-démographiques et des déterminants sociaux de la santé (n = 2 383)			Deux partenaires sexuels ou plus au cours des six derniers mois ^a			Utilisation irrégulière du préservatif lors de relations vaginales ou anales avec un partenaire sexuel occasionnel au cours des six derniers mois ^b			Relations sexuelles rémunérées au cours des six derniers mois			Absence de préservatif lors de la dernière relation sexuelle rémunérée ^c			Consommation de substances avant ou pendant les relations sexuelles au cours des six derniers mois ^c		
	n	%	n	total ^d	%	n	total ^d	%	n	total ^d	%	n	total ^d	%	n	total ^d	%	
Caractéristiques sociodémographiques																		
Antécédents d'incarcérationⁱ																		
Non	422	24,3	135	391	34,5	79	131	60,3	69	337	20,5	22	68	32,4	271	331	81,9	
Oui	1 314	75,7	461	1 251	36,9	228	384	59,4	153	1 012	15,1	44	147	29,9	817	961	85,0	
Santé mentale																		
Passable à excellente	1 401	84,0	470	1 337	35,2	234	409	57,2	167	1 085	15,4	50	165	30,3	893	1 069	83,5	
Mauvaise	267	16,0	100	242	41,3	55	86	64,0	50	217	23,0	16	49	32,7	186	211	88,2	
Antécédents de stigmatisation et de discrimination^k																		
Non	166	11,3	42	150	28,0	25	31	80,6	8	115	7,0	4	8	50,0	83	111	74,8	
Oui	1 298	88,7	479	1 235	38,8	265	465	57,0	196	1 062	18,5	58	194	29,9	898	1 049	85,6	
Antécédents de violences physiques, sexuelles ou psychologiques durant l'enfance																		
Non	220	15,0	75	203	36,9	51	75	68,0	21	181	11,6	7	21	33,3	147	179	82,1	
Oui	1 243	85,0	445	1 184	37,6	237	417	56,8	183	998	18,3	55	181	30,4	834	983	84,8	
Antécédents de violences physiques, sexuelles ou psychologiques de la part d'un partenaire sexuel																		
Non	351	24,1	102	335	30,4	63	105	60,0	21	269	7,8	6	21	28,6	204	264	77,3	
Oui	1 107	75,9	417	1 047	39,8	227	389	58,4	184	907	20,3	56	182	30,8	774	895	86,5	
Statut autodéclaré à l'égard du VIH																		
Statut séronégatif pour le VIH	1 756	75,4	615	1 703	36,1	315	528	59,7	218	1 353	16,1	49	168	29,2	812	956	84,9	
Statut séropositif pour le VIH	214	9,2	52	203	25,6	14	41	34,1	26	135	19,3	2	15	13,3	70	94	74,5	
Statut non connu	360	15,4	124	345	35,9	80	121	66,1	35	283	12,4	15	31	48,4	199	232	85,8	
Statut autodéclaré à l'égard de l'hépatite C																		
Non infecté	870	37,4	323	844	38,3	177	294	60,2	96	693	13,9	24	71	33,8	432	509	84,9	
Actuellement infecté	662	28,5	223	636	35,1	94	172	54,7	100	459	21,8	20	75	26,7	264	314	84,1	
Antécédents d'infection	422	18,1	123	412	29,9	64	115	55,7	50	327	15,3	5	38	13,2	183	222	82,4	
Statut non connu	373	16,0	122	361	33,8	75	109	68,8	32	290	11,0	16	29	55,2	201	236	85,2	

Abbreviations : C.-B., Colombie-Britannique; Man., Manitoba; Ont., Ontario; Qc, Québec; Sask., Saskatchewan; VIH, virus de l'immunodéficience humaine; Yn, Yukon; -, question n'ayant pas été posée dans ce site.

^a Le dénominateur exclut les participants sans antécédents de relations sexuelles.

^b L'utilisation irrégulière du préservatif est défini comme ne pas systématiquement utiliser un préservatif (c'est-à-dire jamais, parfois ou souvent) lors des relations sexuelles. Cette question n'a pas été posée au site de London.

^c Cette question n'a pas été posée dans les sites du réseau SurvUDI.

^d Le total représente le nombre total de personnes associées à l'indicateur concerné et à la caractéristique démographique correspondante, à l'exception des personnes ayant répondu par « Je ne sais pas », « Refus » et « Non indiqué ».

^e Les personnes transféminines inclut les personnes de sexe masculin à la naissance, mais qui s'identifient comme femmes ou non binaires.

^f Les personnes transmasculines inclut les personnes de sexe féminin à la naissance, mais qui s'identifient comme hommes ou non binaires.

^g Les autres sites urbains de la province de Québec étaient l'Abitibi-Témiscamingue, la Montérégie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Cantons de l'Est et la Mauricie-Centre-du-Québec.

^h Défini en tant qu'avoir eu du mal à « joindre les deux bouts » au cours de l'année précédent l'entrevue.

ⁱ Défini en tant qu'avoir vécu dans une chambre d'hôtel ou de motel, une maison de chambre ou une pension de famille, un refuge ou une auberge de jeunesse, une maison ou un foyer de transition, un établissement psychiatrique ou un centre de désintoxication, un lieu public ou un établissement correctionnel.

^j Seules des données partielles étaient disponibles dans les sites du réseau SurvUDI.

^k Défini en tant qu'avoir déjà souffert de stigmatisation ou de discrimination (par exemple, évitemen, pitié, blâme, honte, rejet, agression verbale ou intimidation) fondée sur l'origine ethnique ou culturelle, le statut de séropositivité pour le VIH, le statut de séropositivité pour l'hépatite C, l'orientation sexuelle, la consommation d'alcool ou de drogues ou le recours au travail sexuel.

^l Seules des données partielles étaient disponibles dans les sites du réseau SurvUDI et dans le site de London.



TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES

Tableau D : Indicateurs sélectionnés selon la phase de l'enquête Track auprès des utilisateurs de drogues injectables au Canada, phases 1 à 4, 2003 à 2019

Phase	Phase 1			Phase 2			Phase 3			Phase 4		
Années	2003 à 2005			2005 à 2008			2010 à 2012			2017 à 2019		
Nombre total de participants	2 986			2 982			2 687			2 383		
Nombre de sites sentinelles	7			10			11			14		
Caractéristiques sociodémographiques	n	total ^a	%									
Sexe à la naissance (identité de genre, phase 4 uniquement) ^b												
Féminin (femme cisgenre, phase 4 uniquement)	901	2 986	30,2	971	2 982	32,6	855	2 687	31,8	775	2 372	32,7
Masculin (homme cisgenre, phase 4 uniquement)	2 085	2 986	69,8	2 011	2 982	67,4	1 832	2 687	68,2	1 556	2 372	65,6
Âge en années	n = 2 981			n = 2 965			n = 2 687			n = 2 378		
Âge moyen (\pm écart-type)	35,7 (9,7)			37,5 (9,8)			39,4 (10,5)			40,1 (11,0)		
Âge médian	36			38			40			39		
Intervalle	14–73			15–70			16–71			15–78		
Statut d'Autochtone (Premières nations, Métis ou Inuits)	785	2 966	26,5	801	2 971	27,0	968	2 678	36,1	997	2 360	42,2
Niveau d'instruction le plus élevé												
Études secondaires non terminées	1 573	2 967	53,0	1 600	2 973	53,8	1 492	2 680	55,6	1 139	2 373	48,0
Études secondaires terminées	648	2 967	21,8	649	2 973	21,8	560	2 680	20,9	621	2 373	26,2
Études supérieures réalisées après les études secondaires	746	2 967	25,1	724	2 973	24,4	628	2 680	23,4	613	2 373	25,8
Situation de logement précaire au cours des six derniers mois ^c	1 657	2 981	55,6	1 693	2 974	56,9	1 371	2 683	51,1	1 486	2 374	62,6
Antécédents d'incarcération ^d	-	-	-	-	-	-	2 210	2 678	82,5	1 314	1 736	75,7
Consommation de drogues et comportements à risque au cours des six derniers mois												
Âge au moment de la première injection (en années)	n = 2 981			n = 2 973			n = 2 669			n = 2 356		
Âge moyen (\pm écart-type)	22 (8,0)			22,8 (8,4)			23,4 (8,9)			24,9 (9,7)		
Âge médian	19			20			21			22		
Intervalle	3–62			3–60			3–60			2–68		
Types de drogues utilisées par injection												
Cocaine	2 431	2 980	81,6	2 425	2 979	81,4	1 724	2 680	64,3	1 419	2 364	60,0
Hydromorphone	891	2 980	29,9	1 156	2 979	38,8	1 296	2 682	48,3	1 184	2 363	50,1
Méthamphétamine	202	2 980	6,8	391	2 979	13,1	414	2 680	15,5	1 027	2 360	43,5
Morphine	1 119	2 980	37,6	1 291	2 979	43,3	1 325	2 682	49,4	982	2 362	41,6
Héroïne	886	2 980	29,7	843	2 979	28,3	716	2 680	26,7	764	2 357	32,4
Fentanyl	50	2 980	1,7	166	2 979	5,6	334	2 680	12,5	572	2 350	24,3
Amphétamines	235	2 980	7,9	289	2 979	9,7	338	2 680	12,6	506	2 358	21,5
Crack	713	2 980	23,9	608	2 979	20,4	665	2 680	24,8	473	2 362	20,0
Types de drogues utilisées sans injection												
Cannabis	2 261	2 983	75,8	2 168	2 976	72,8	1 863	2 684	69,4	1 698	2 356	72,1
Alcool	2 333	2 983	78,2	2 193	2 976	73,7	1 714	2 684	63,9	1 472	2 355	62,5
Crack	1 917	2 983	64,3	2 003	2 976	67,3	1 541	2 684	57,4	1 125	2 352	47,8
Cocaïne	1 627	2 983	54,5	1 422	2 976	47,8	1 078	2 684	40,2	1 097	2 354	46,6
Méthamphétamine	410	2 983	13,7	358	2 976	12,0	294	2 684	11,0	1 010	2 349	43,0
Amphétamines	633	2 983	21,2	608	2 976	20,4	529	2 684	19,7	836	2 348	35,6
Méthadone	638	2 983	21,4	776	2 976	26,1	287	2 684	10,7	824	2 357	35,0
Benzodiazépines	1 325	2 983	44,4	1 036	2 976	34,8	648	2 684	24,1	705	2 349	30,0



Tableau D : Indicateurs sélectionnés selon la phase de l'enquête Track auprès des utilisateurs de drogues injectables au Canada, phases 1 à 4, 2003 à 2019 (suite)

Phase	Phase 1			Phase 2			Phase 3			Phase 4		
Années	2003 à 2005			2005 à 2008			2010 à 2012			2017 à 2019		
Nombre total de participants	2 986			2 982			2 687			2 383		
Nombre de sites sentinelles	7			10			11			14		
Caractéristiques sociodémographiques	n	total ^a	%									
Types de drogues utilisées sans injection (suite)												
Emprunt d'aiguilles ou de seringues usagées	594	2 943	20,2	640	2 937	21,8	415	2 671	15,5	271	2 339	11,6
Emprunt d'aiguilles ou de seringues usagées auprès de membres de la famille, d'amis et de partenaires sexuels ^e	371	569	65,2	482	609	79,1	328	400	82,0	224	263	85,2
Emprunt d'autres matériels d'injection usagés ^f	883	2 962	29,8	1 012	2 969	34,1	922	2 672	34,5	882	2 324	38,0
Comportements sexuels au cours des six derniers mois												
Deux partenaires sexuels ou plus	1 326	2 964	44,7	1 191	2 949	40,4	920	2 652	34,7	798	2 270	35,2
Relations sexuelles rémunérées ^g	282	2 425	11,6	301	2 345	12,8	281	1 987	14,1	280	1 786	15,7
Dépistage, prévalence et cascade de soins du VIH et connaissance du statut d'infection à la maladie												
Antécédents de dépistage du VIH	2 656	2 951	90,0	2 707	2 946	91,9	2 468	2 657	92,9	2 080	2 299	90,5
Prévalence du VIH ^h	433	2 900	14,9	363	2 876	12,6	291	2 593	11,2	222	2 162	10,3
Connaissance du statut de séropositivité pour le VIH ⁱ	336	432	77,8	287	360	79,7	232	290	80,0	179	216	82,9
Orientation vers les soins et les services liés au VIH ^{j,k}	295	335	88,1	262	285	91,9	214	232	92,2	170	179	95,0
Suivi actuel d'un TA ^l	173	333	52,0	158	285	55,4	165	232	71,1	157	179	87,7
Dépistage, prévalence et cascade de soins du VHC												
Antécédents de dépistage de l'hépatite C	2 562	2 929	87,5	2 659	2 932	90,7	2 417	2 646	91,3	2 086	2 296	90,9
Prévalence des anticorps anti-VHC ^h	1 830	2 813	65,1	1 985	2 876	69,0	1 750	2 575	68,0	1 375	2 141	64,2
Orientation vers les soins pour l'hépatite C ^m	683	1 335	51,2	699	1 386	50,4	592	1 380	42,9	115	237	48,5
Suivi actuel d'un traitement contre l'hépatite C ^l	-	-	-	34	1 364	2,5	28	1 385	2,0	9	236	3,8

Abréviations : VIH, virus de l'immunodéficience humaine; -, question n'ayant pas été posée dans ce site

^a Le total représente le nombre total de personnes associées à l'indicateur concerné et à la caractéristique démographique correspondante, à l'exception des personnes ayant répondu par « Je ne sais pas », « Refus » et « Non indiqué »

^b La mesure multidimensionnelle du sexe et du genre (1) a été utilisée pour mesurer l'identité de genre dans la phase 4

^c Défini en tant qu'avoir vécu, au cours des six mois précédant l'entrevue, dans un hôtel ou un motel, une maison de chambre ou une pension de famille, un refuge ou une auberge de jeunesse, une maison ou un foyer de transition, un établissement psychiatrique ou un centre de désintoxication, un lieu public ou un établissement correctionnel

^d Seules des données partielles étaient disponibles dans les sites du réseau SurvUDI

^e Parmi les participants ayant emprunté des aiguilles ou des seringues usagées

^f Les autres matériels d'injection usagés comprennent l'eau, les filtres, les réchauds, les cuillères, les garrots, les attaches, la ouate et les acidifiants

^g Une « relation sexuelle rémunérée » est défini en tant qu'avoir obtenu de l'argent, des biens ou autre chose en échange de relations sexuelles

^h Les algorithmes de dépistage du VIH et de l'hépatite C sont présentés à l'annexe 2

ⁱ Parmi les participants chez qui la présence des anticorps anti-VIH a été détectée et qui ont déclaré leur diagnostic d'infection au VIH. Les participants ayant déclaré que les résultats de leur dernier test de dépistage du VIH étaient positifs et dont la séropositivité pour le VIH a été confirmée à la suite de l'analyse de l'échantillon biologique fourni au moment de l'entrevue ont été classés comme ayant connaissance de leur statut de séropositivité pour le VIH

^j Parmi les participants ayant connaissance de leur statut de séropositivité pour le VIH

^k Défini comme étant suivi par un médecin ou un fournisseur de soins de santé pour des services liés au VIH (au cours des six mois précédant l'entrevue dans les phases 1 à 3, au moment de l'entrevue dans la phase 4)

^l Parmi les participants ayant connaissance de leur statut de séropositivité pour les anticorps anti-hépatite C dans les phases 1, 2 et 3. Parmi les participants ayant connaissance de leur statut de séropositivité pour l'ARN de l'hépatite C dans la phase 4

^m Défini comme étant suivi par un médecin ou un fournisseur de soins de santé pour des services liés à l'hépatite C (au cours des douze mois précédant l'entrevue dans les phases 1 à 3; au moment de l'entrevue dans la phase 4)

Référence

- Bauer GR, Braimoh J, Scheim AI, Dharma C. Transgender-inclusive measures of sex/gender for population surveys: mixed-methods evaluation and recommendations. PLoS One 2017;12(5):e0178043. DOI PubMed