

# Cadre d'indicateurs des maladies chroniques et des blessures Statistiques rapides, édition automne 2014

*Division de la surveillance et de l'épidémiologie, Centre de prévention des maladies chroniques, Agence de la santé publique du Canada*

 [Diffuser cet article sur Twitter](#)

GROUPES D'INDICATEURS	MESURE(S) D'INDICATEUR	DONNÉES LES PLUS RÉCENTES <sup>a</sup>	SOURCE DES DONNÉES (ANNÉE)
<strong>DÉTERMINANTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX</strong>			
Éducation	% de la population âgée de 20 ans et plus n'ayant pas terminé ses études secondaires	13,4 %	ESCC (2011-2012)
Revenu	% de l'ensemble de la population vivant sous les seuils de faible revenu après impôt	8,8 %	EDTR (2011)
Emploi	Taux de chômage annuel moyen (% de la population active âgée de 15 ans et plus ne travaillant pas pendant la période de référence)	7,2 %	EPA (2012)
<strong>FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION EN BAS ÂGE</strong>			
Poids à la naissance	% de naissances vivantes associées à un faible poids à la naissance	6,1 %	SEC (2011)
Allaitement maternel	% de femmes âgées de 15 ans et plus déclarant avoir nourri leur enfant exclusivement au sein pendant les six premiers mois ou plus	26,2 %	ESCC (2011-2012)
Exposition à la fumée	% de ménages avec enfants âgés de moins de 12 ans régulièrement exposés à la fumée de tabac à la maison	3,3 %	ESUTC (2012)
<strong>FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION COMPORTEMENTAUX</strong>			
Tabagisme	% de la population âgée de 15 ans et plus déclarant fumer (quotidiennement ou occasionnellement)	16,1 %	ESUTC (2012)
	% de la population âgée de 15 ans et plus déclarant fumer quotidiennement	11,9 %	ESUTC (2012)
Activité physique	% d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 17 ans faisant au moins 12 000 pas par jour (mesurés)	7,0 %	ÉAPJC (2009-2011)
	% de la population âgée de 20 ans et plus déclarant être « active » ou « modérément active » physiquement pendant ses loisirs	51,8 %	ESCC (2011-2012)
Comportement sédentaire	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant passer plus de 14 heures par semaine à regarder la télévision ou à utiliser l'ordinateur pendant ses loisirs	62,1 %	ESCC (2011-2012)
Saine alimentation	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant consommer des fruits et légumes au moins cinq fois par jour	40,3 %	ESCC (2011-2012)
Alimentation malsaine	% de la population âgée de 5 à 19 ans déclarant consommer des boissons sucrées tous les jours	27,2 %	ECMS (2009-2011)
Consommation d'alcool	% de la population âgée de 15 ans et plus déclarant boire davantage d'alcool que ce que préconisent les directives de consommation d'alcool à faible risque à long terme	14,4 %	ESCCAD (2012)
Stress chronique	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant que la plupart de ses journées ont été « assez stressantes » ou « extrêmement stressantes » au cours des 12 derniers mois	22,6 %	ESCC (2011-2012)
<strong>CONDITIONS À RISQUE</strong>			
Obésité	% d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 17 ans qui sont obèses (donnée mesurée)	11,7 %	ECMS (2009-2011)
	% de la population âgée de 18 ans et plus qui est obèse (donnée mesurée)	26,2 %	ECMS (2009-2011)
Hyperglycémie	% de la population âgée de 20 ans et plus ayant une glycémie élevée (donnée mesurée)	4,2 %	ECMS (2009-2011)
Hypertension	% de la population âgée de 20 ans et plus ayant une tension artérielle élevée (donnée mesurée)	7,8 %	ECMS (2009-2011)
Hypercholestérolémie	% de la population âgée de 20 ans et plus ayant un taux de cholestérol élevé (ratio cholestérol total sur cholestérol LHD [CT/C-LHD]) (donnée mesurée)	17,3 %	ECMS (2009-2011)

[Suite page suivante](#)

Correspondance : Marisol T. Betancourt, Division de la surveillance et de l'épidémiologie, Centre de prévention des maladies chroniques, Agence de la santé publique du Canada, 785, avenue Carling, Ottawa (Ontario) K1A 0K9; tél. : 613-957-9259; courriel : marisol.betancourt@phac-aspc.gc.ca

PRATIQUES DE PRÉVENTION DES MALADIES (PRÉVENTION SECONDAIRE)			
Contact avec un professionnel de la santé	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir consulté un médecin de famille ou un omnipraticien au moins une fois au cours des 12 derniers mois	75,2 %	ESCC (2012)
	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir consulté un dentiste, un hygiéniste dentaire ou un orthodontiste au moins une fois au cours des 12 derniers mois	66,0 %	ESCC (2012)
Dépistage des maladies	% de femmes âgées de 50 à 74 ans déclarant avoir subi au moins une mammographie au cours des cinq dernières années	83,5 %	ESCC (2012)
	% de femmes âgées de 25 à 69 ans déclarant avoir subi au moins un test PAP au cours des trois dernières années	79,7 %	ESCC (2012)
	% de la population âgée de 50 à 74 ans ayant subi au moins un test de recherche de sang occulte dans les selles, une colonoscopie ou une sigmoïdoscopie au cours de la période recommandée	51,1 %	ESCC (2012)
Vaccination (grippe)	% de la population âgée de 12 ans et plus souffrant d'un problème de santé chronique ayant déclaré avoir reçu un vaccin antigrippal saisonnier au cours des 12 derniers mois	47,4 %	ESCC (2011-2012)
ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL ET IMPACTS SUR LA SANTÉ			
Santé générale	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir une « très bonne » ou une « excellente » santé	59,9 %	ESCC (2011-2012)
	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant avoir une « très bonne » ou une « excellente » santé mentale	72,2 %	ESCC (2011-2012)
	Espérance de vie à la naissance	82,1 ans	SCSMC (2007-2009)
	Espérance de vie à 65 ans	20,8 ans	SCSMC (2007-2009)
	Espérance de vie ajustée en fonction de l'état de santé à la naissance	71,8 ans	SCSMC (2006-2008)
Morbidité – prévalence	Espérance de vie ajustée en fonction de l'état de santé à 65 ans	15,9 ans	SCSMC (2006-2008)
	% de la population âgée de 20 ans et plus souffrant d'au moins une maladie chronique importante (cancer, diabète, maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire obstructive chronique)	15,7 %	ESCC (2011-2012)
	Prévalence du diabète chez les enfants et les jeunes âgés de 19 ans ou moins	0,3 %	SCSMC (2010-2011) <sup>b</sup>
	Prévalence du diabète au sein de la population âgée de 20 ans et plus	9,6 %	SCSMC (2010-2011) <sup>b</sup>
	Prévalence des maladies cardiovasculaires au sein de la population âgée de 20 ans et plus (NOUVEAU)	6,3 %	ESCC (2011-2012)
	Prévalence d'accidents vasculaires cérébraux au sein de la population âgée de 20 ans et plus	1,3 %	ESCC (2011-2012)
	Prévalence de l'insuffisance cardiaque au sein de la population âgée de 40 ans et plus (NOUVEAU)	3,5 %	SCSMC (2010-2011)
	Prévalence des cardiopathies ischémiques au sein de la population âgée de 20 ans et plus (NOUVEAU)	8,4 %	SCSMC (2010-2011)
	Prévalence de l'asthme chez les enfants et les jeunes âgés de 19 ans ou moins	15,7 %	SCSMC (2010-2011) <sup>b</sup>
	Prévalence de l'asthme au sein de la population âgée de 20 ans et plus	9,0 %	SCSMC (2010-2011) <sup>b</sup>
Maladie chronique	Prévalence des maladies pulmonaires obstructives chroniques au sein de la population âgée de 35 ans et plus	9,3 %	SCSMC (2010-2011) <sup>b</sup>
	Prévalence de l'arthrite au sein de la population âgée de 20 ans et plus	17,6 %	ESCC (2011-2012)
	Prévalence de l'utilisation des services de santé en raison de troubles mentaux chez les enfants et jeunes âgés de 19 ans ou moins	8,3 %	SCSMC (2010-2011)
	Prévalence de l'utilisation des services de santé en raison de troubles mentaux chez les adultes âgés de 20 ans et plus	15,3 %	SCSMC (2010-2011)
	Prévalence de troubles anxieux et de l'humeur chez les enfants et jeunes âgés de 19 ans ou moins	7,2 %	ESCC (2011-2012)
	Prévalence de troubles anxieux et de l'humeur chez les adultes âgés de 20 ans et plus	11,2 %	ESCC (2011-2012)
	Prévalence de l'ostéoporose diagnostiquée au sein de la population âgée de 40 ans et plus (NOUVEAU)	11,0 %	SCSMC (2010-2011)
	% de la population ayant reçu un diagnostic de cancer au cours des 10 dernières années	2,4 %	RCC (1999-2008)
	% des hommes ayant reçu un diagnostic de cancer de la prostate au cours des 10 dernières années	1,1 %	RCC (1999-2008)
	% de la population ayant reçu un diagnostic de cancer du poumon au cours des 10 dernières années	0,1 %	RCC (1999-2008)
Cancer	% des femmes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein au cours des 10 dernières années	0,9 %	RCC (1999-2008)
	% de la population ayant reçu un diagnostic de cancer colorectal au cours des 10 dernières années	0,3 %	RCC (1999-2008)

Suite page suivante

## ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL ET IMPACTS SUR LA SANTÉ

Morbidité – incidence	Taux d'incidence du diabète chez les enfants et les jeunes âgés de 19 ans ou moins	40,7 par 100 000	SCSMC (2010-2011)
	Taux d'incidence du diabète au sein de la population âgée de 20 ans et plus	803,7 par 100 000	SCSMC (2010-2011)
	Taux d'incidence de l'asthme chez les enfants et les jeunes âgés de 19 ans ou moins	1141,3 par 100 000	SCSMC (2010-2011)
	Taux d'incidence de l'asthme au sein de la population âgée de 20 ans et plus	357,9 par 100 000	SCSMC (2010-2011)
	Taux d'incidence des maladies pulmonaires obstructives chroniques au sein de la population âgée de 35 ans et plus	909,2 par 100 000	SCSMC (2010-2011)
	Taux d'incidence de l'insuffisance cardiaque au sein de la population âgée de 40 ans et plus (NOUVEAU)	510,6 par 100 000	SCSMC (2010-2011)
	Taux d'incidence des cardiopathies ischémiques au sein de la population âgée de 20 ans et plus (NOUVEAU)	630,1 par 100 000	SCSMC (2010-2011)
	Taux d'incidence de l'infarctus aigu du myocarde au sein de la population âgée de 20 ans et plus (NOUVEAU)	243,0 par 100 000	SCSMC (2010-2011)
	Taux de fractures de la hanche au sein de la population âgée de 40 ans et plus (NOUVEAU)	147,9 par 100 000	SCSMC (2010-2011)
	Taux d'incidence de tous les cancers au sein de la population masculine	438 par 100 000 <sup>d</sup>	RCC (2010)
	Taux d'incidence de tous les cancers au sein de la population féminine	368 par 100 000 <sup>d</sup>	RCC (2010)
	Taux d'incidence du cancer de la prostate au sein de la population masculine	108 par 100 000 <sup>d</sup>	RCC (2010)
	Taux d'incidence du cancer du poumon au sein de la population masculine	63 par 100 000 <sup>d</sup>	RCC (2010)
	Taux d'incidence du cancer du poumon au sein de la population féminine	47 par 100 000 <sup>d</sup>	RCC (2010)
	Taux d'incidence du cancer colorectal au sein de la population masculine	57 par 100 000 <sup>d</sup>	RCC (2010)
	Taux d'incidence du cancer colorectal au sein de la population féminine	40 par 100 000 <sup>d</sup>	RCC (2010)
	Taux d'incidence du cancer du sein au sein de la population féminine	101 par 100 000 <sup>d</sup>	RCC (2010)
	Taux d'incidence des blessures non intentionnelles au sein de la population totale (NOUVEAU)	512,3 par 100 000	BDMH (2010-2011)
	Taux d'incidence des blessures intentionnelles auto-infligées au sein de la population totale (NOUVEAU)	47,3 par 100 000	BDMH (2010-2011)
	Taux d'incidence des blessures résultant d'une agression au sein de la population totale (NOUVEAU)	26,0 par 100 000	BDMH (2010-2011)
Multimorbidité	% de la population âgée de 20 ans et plus souffrant de plusieurs maladies chroniques (au moins 2 de 10 maladies chroniques <sup>c</sup> )	14,5 %	ESCC (2011-2012)
	% de la population âgée de 20 ans et plus souffrant de plusieurs maladies chroniques (au moins 3 de 10 maladies chroniques <sup>c</sup> )	4,9 %	ESCC (2011-2012)
Incapacité	% de la population âgée de 12 ans et plus déclarant être limitée « parfois » ou « souvent » dans ses activités en raison de problèmes de santé ou d'une maladie	33,9 %	ESCC (2012)
Mortalité	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable à une maladie chronique importante (maladies cardiovasculaires, tous les cancers, maladies respiratoires chroniques)	454,3 par 100 000	SEC (2010)
	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable aux maladies cardiovasculaires	199,1 par 100 000	SEC (2010)
	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable au cancer	211,4 par 100 000	SEC (2010)
	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable aux maladies respiratoires chroniques	43,8 par 100 000	SEC (2010)
	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable aux blessures non intentionnelles (NOUVEAU)	32,0 par 100 000	SEC (2010)
	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable à un homicide (NOUVEAU)	1,5 par 100 000	SEC (2010)
	Taux de mortalité au sein de l'ensemble de la population attribuable au suicide	11,6 par 100 000	SEC (2010)
	Ratio des taux de mortalité toutes causes confondues au sein de l'ensemble de la population âgée de 20 ans et plus : personnes atteintes du diabète / personnes non atteintes du diabète	Rapport de taux de 2,0 <sup>d</sup>	SCSMC (2010-2011)

Suite page suivante

## ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL ET IMPACTS SUR LA SANTÉ

Mortalité prématuée	Années potentielles de vie perdues en raison du cancer	1 480,6 par 100 000 SEC (2010)
	Années potentielles de vie perdues en raison des maladies cardiovasculaires	733,1 par 100 000 SEC (2010)
	Années potentielles de vie perdues en raison des maladies respiratoires chroniques	118,8 par 100 000 SEC (2010)
	Années potentielles de vie perdues en raison du suicide	314,8 par 100 000 SEC (2010)
	Probabilité de mourir (%) entre 30 et 69 ans de maladies chroniques importantes (maladies cardiovasculaires, cancer, maladies respiratoires chroniques, diabète)	11,0 % SEC (2010)
	Probabilité de mourir (%) entre 30 et 69 ans d'une maladie cardiovasculaire	3,4 % SEC (2010)
	Probabilité de mourir (%) entre 30 et 69 ans d'un cancer	6,9 % SEC (2010)
	Probabilité de mourir (%) entre 30 et 69 ans d'une maladie respiratoire chronique	0,7 % SEC (2010)
	Probabilité de mourir (%) entre 30 et 69 ans du diabète	0,5 % SEC (2010)

**Abréviations :** BDMH, Base de données sur la morbidité hospitalière; cholestérol LHD, cholestérol à lipoprotéines de haute densité; CT, cholestérol total; ÉAPJC, Étude sur l'activité physique des jeunes au Canada; ECMS, Enquête canadienne sur les mesures de la santé; EDTR, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu; EPA, Enquête sur la population active; ESCC, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes; ESCCAD, Enquête de surveillance canadienne de la consommation d'alcool et de drogues; ESUTC, Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada; RCC, Registre canadien du cancer; SCSMC, Système canadien de surveillance des maladies chroniques; SEC, Statistique de l'état civil.

**Remarque :** Les taux calculés par le SCSMC n'incluent pas les données de l'Alberta. Les taux calculés par le SEC n'incluent pas les données du Québec.

<sup>a</sup> Tous les taux présentés sont bruts sauf indication contraire.

<sup>b</sup> Des données de l'ESCC de 2011-2012 existent pour cet indicateur et peuvent être ventilées selon des variables démographiques et sociales.

<sup>c</sup> Multimorbidité : Les maladies chroniques incluses sont les maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers, l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, le diabète, l'arthrite, la maladie d'Alzheimer et autres démences, les troubles anxieux et de l'humeur (dépression).

<sup>d</sup> Les taux ont été normalisés en fonction de l'âge de la population au Canada en 1991.

**Citation suggérée :** Centre de prévention des maladies chroniques, Agence de la santé publique du Canada (2014). Cadre d'indicateurs des maladies chroniques, édition automne 2014.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : [Chronic.Publications.Chronique@phac-aspc.gc.ca](mailto:Chronic.Publications.Chronique@phac-aspc.gc.ca)

Utilisez l'outil en ligne du cadre d'indicateurs des maladies chroniques afin de voir la répartition de données additionnelles : <http://infobase.phac-aspc.gc.ca/cdif/?l=fra>