

## Tableaux de données - l'Enquête sur l'expérience de la maternité (EEM) 2006-2007

Les tableaux ci-joints accompagnent le rapport *Ce que disent les mères : l'Enquête sur l'expérience de la maternité*<sup>1</sup>. Ils comprennent des statistiques descriptives (p. ex., proportions et moyennes) établies à partir d'un échantillon pondéré de 76 508 femmes et des données supplémentaires qui ne sont pas incluses dans le rapport.

Les tableaux fournissent les intervalles de confiance de 95 % et les coefficients de variation associés aux statistiques. Ces variances ont été calculées à l'aide d'une série de poids « bootstrap »<sup>2,3</sup> visant à saisir la variabilité introduite par les ajustements au plan de sondage et à la pondération.

Statistique Canada considère que les estimations dont le coefficient de variation s'établit entre 16,6 % et 33,3 % sont de qualité marginale et faible lorsque supérieur à 33,3 %. Conformément aux recommandations de Statistique Canada<sup>4</sup>, des notes de bas de page y ont été associées. Les estimations fondées sur des tailles de case de moins de cinq (c.-à-d., numérateur non pondéré de moins de cinq femmes) ont été supprimées, conformément aux règles de contrôle de la divulgation de Statistique Canada. Des notes de bas de page y ont également été associées.

Les données manquantes (p. ex., refus, « ne sais pas » et sauts valides) ont été généralement exclues des analyses. En raison du faible taux de non-réponse aux questions de l'EEM, l'exclusion des enregistrements contenant des données incomplètes a eu une incidence minimale sur les résultats. L'exclusion de certains enregistrements explique les variations observées dans la taille réelle de l'échantillon pour certaines questions. Dans certains cas, le total des pourcentages des tableaux ne correspond pas à 100 % car les données ont été arrondies.

Les données ont été analysées à l'aide des variables secondaires suivantes : parité (c.-à-d., primipares – femmes dont le bébé correspond à une première naissance ou multipares – femmes ayant donné naissance auparavant); âge de la mère; niveau de scolarité de la mère; seuil de faible revenu (c.-à-d. revenu familial égal ou inférieur au seuil de faible revenu ou supérieur à celui-ci); et type d'accouchement (par voie vaginale ou césarienne). Le tableau 3 de la page 28 du rapport<sup>1</sup> fait état des variables secondaires et des variables de l'EEM utilisées pour les déterminer.

Dans les tableaux autres que ceux présentant des données provinciales ou territoriales, la catégorie « toutes les femmes » exclut les femmes pour lesquelles il manque des données sur la première variable analysée, mais comprend celles pour lesquelles il manque des données sur la variable secondaire analysée. Par exemple, la catégorie « toutes les femmes », pour la « proportion de femmes qui ont

amorcé les soins prénataux après le premier trimestre (à 14 semaines de gestation ou plus), selon l'âge de la mère » (page 19 du document) exclut les femmes pour lesquelles la date de leur première visite est inconnue (c.-à-d., la variable primaire), mais inclut les femmes dont on ignore l'âge (c.-à-d., la variable secondaire).

Un article comprenant une description détaillée de la méthodologie utilisée dans le cadre de l'EEM a été publié<sup>5</sup>. Un résumé de la méthodologie est aussi présenté aux pages 23 à 30 du rapport<sup>1</sup>.

1. Agence de la santé publique du Canada. Ce que disent les mères : l'Enquête canadienne sur l'expérience de la maternité. Ottawa, 2009.
2. Rao JNK, Wu CFJ. Resampling inference with complex survey data. *J Am Stat Assoc.* 1988;83(401):231–41.
3. Rao JNK, Wu CFJ, Yue K. Some recent work on resampling methods for complex surveys. *Survey Methodology.* 1992;18:209–17.
4. Statistique Canada. *Guide de l'utilisateur de microdonnées, Enquête sur les expériences de la maternité, 2006* [Internet]. Novembre 2007 [cité le 22 juin 2008]. Accessible à : [http://www.statcan.ca/francais/sdds/document/5019\\_D1\\_T1\\_V1\\_F.pdf](http://www.statcan.ca/francais/sdds/document/5019_D1_T1_V1_F.pdf).
5. Dzakpasu S, Kaczorowski J, Chalmers B, Heaman M, Duggan J, Neusy E; pour le Groupe d'étude sur l'expérience de la maternité du Système canadien de surveillance périnatale, Agence de la santé publique du Canada. The Canadian Maternity Experiences Survey: design and methods. *J Obstet Gynaecol Can.* 2008;30(3):207–16.

# Tableaux de données - l'Enquête sur l'expérience de la maternité 2006–2007

## Table des matières

### Caractéristiques démographiques

- Répartition des caractéristiques démographiques, selon la province ou le territoire, Enquête sur l'expérience de la maternité, Canada, 2006–2007 (Partie 1 de 3) 1
- Répartition des caractéristiques démographiques, selon la province ou le territoire, Enquête sur l'expérience de la maternité, Canada, 2006–2007 (Partie 2 de 3) 2
- Répartition des caractéristiques démographiques, selon la province ou le territoire, Enquête sur l'expérience de la maternité, Canada, 2006–2007 (Partie 3 de 3) 3

### 1 Réaction à la grossesse

- Répartition de la réaction des femmes relativement à l'opportunité de la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 1.1] 4
- Répartition de la réaction des femmes relativement à l'opportunité de la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 1.2, Figure 1.3 et Figure 1.4] 5
- Répartition de la réaction des femmes à la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 1.5] 6
- Répartition de la réaction des femmes à la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 1.6] 7

### 2 Professionnels de la santé ayant dispensé les soins prénataux

- Répartition du type de professionnel de la santé ayant dispensé les soins prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 2.1 et Figure 2.2] 8
- Répartition du type de professionnel de la santé ayant dispensé les soins prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 2.3] 9

<b>3 Soins prénataux</b>	10
◦ Nombre de consultations pour les soins prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	10
◦ Nombre de consultations pour les soins prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	11
◦ Nombre moyen de consultations pour les soins prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	12
◦ Nombre moyen de consultations pour les soins prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	13
◦ Nombre moyen de semaines de gestation à la première consultation pour les soins prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	14
◦ Nombre moyen de semaines de gestation à la première consultation pour les soins prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	15
◦ Proportion de femmes ayant obtenu une consultation pour les soins prénataux avant dix semaines de gestation, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	16
◦ Proportion de femmes ayant obtenu une consultation pour les soins prénataux avant dix semaines de gestation, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	17
◦ Proportion de femmes qui ont amorcé les soins prénataux avant ou après le premier trimestre (à 14 semaines de gestation ou plus), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 3.1]	18
◦ Proportion de femmes qui ont amorcé les soins prénataux avant ou après le premier trimestre (à 14 semaines de gestation ou plus), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 3.2]	19
◦ Proportion de femmes n'ayant pas obtenu les soins prénataux aussi rapidement qu'elles le voulaient, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 3.3]	20
◦ Proportion de femmes n'ayant pas obtenu les soins prénataux aussi rapidement qu'elles le voulaient, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 3.4]	21
◦ Répartition des raisons pour ne pas avoir obtenu les soins prénataux aussi rapidement qu'elles le voulaient, pour les femmes n'ayant pas obtenu les soins prénataux aussi rapidement qu'elles le voulaient, Canada, 2006–2007	22
<b>4 Cours prénataux</b>	23
◦ Proportion de femmes ayant suivi des cours prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 4.1]	23

◦ Proportion de femmes ayant suivi des cours prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 4.2]	24
◦ Répartition du lieu où les femmes ont suivi les cours prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 4.3]	25
◦ Répartition du lieu où les femmes ont suivi les cours prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	26

## 5 Information prénatale

◦ Répartition des sources d'information prénatale considérées par les femmes comme étant les plus utiles pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 (Partie 1 de 2) [Contient les données pour Figure 5.1]	27
◦ Répartition des sources d'information prénatale considérées par les femmes comme étant les plus utiles pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 (Partie 2 de 2) [Contient les données pour Figure 5.1]	28
◦ Répartition des sources d'information prénatale considérées par les femmes comme étant les plus utiles pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 (Partie 1 de 2) [Contient les données pour Figure 5.2 et Figure 5.3]	29
◦ Répartition des sources d'information prénatale considérées par les femmes comme étant les plus utiles pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 (Partie 2 de 2) [Contient les données pour Figure 5.2 et Figure 5.3]	30
◦ Répartition des sources d'information prénatale considérées par les femmes comme étant les plus utiles pendant la grossesse, chez les femmes qui ont suivi des cours prénataux, Canada, 2006–2007	31
◦ Proportion de femmes qui ont déclaré avoir reçu assez d'information sur des sujets liés à la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	32
◦ Proportion de femmes qui ont déclaré avoir reçu assez d'information sur des sujets liés à la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	33
◦ Proportion de femmes qui ont déclaré ne pas avoir reçu assez d'information sur des sujets liés à la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	34

Proportion de femmes qui ont déclaré ne pas avoir reçu assez d'information sur des sujets liés à la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	35
--	----

## 6 Suppléments d'acide folique 36

Proportion de femmes ayant pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse et au cours des trois premiers mois de la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 6.1]	36
---	----

Proportion de femmes ayant pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse et au cours des trois premiers mois de la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	37
---	----

Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse et au cours des trois premiers mois de la grossesse, chez les femmes ayant déclaré avoir pris des suppléments, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	38
---	----

Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse et au cours des trois premiers mois de la grossesse, chez les femmes ayant déclaré avoir pris des suppléments, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	39
---	----

Proportion de femmes qui savaient avant d'être enceintes que la prise d'acide folique avant la grossesse pouvait aider à prévenir certaines anomalies congénitales chez le nouveau-né, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 6.2]	40
--	----

Proportion de femmes qui savaient avant d'être enceintes que la prise d'acide folique avant la grossesse pouvait aider à prévenir certaines anomalies congénitales chez le nouveau-né, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 6.3]	41
--	----

Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse, selon leur connaissance à ce chapitre avant d'être enceintes, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 6.4]	42
---	----

Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse, selon leur connaissance à ce chapitre avant d'être enceintes, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	43
---	----

Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois premiers mois de la grossesse, selon leur connaissance à ce chapitre avant d'être enceintes, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 6.4]	44
---	----

Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois premiers mois de la grossesse, selon leur connaissance à ce chapitre avant d'être enceintes, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	45
---	----

<b>7 Échographie prénatale</b>	46
◦ Nombre moyen d'échographies prénatales, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	46
◦ Nombre moyen d'échographies prénatales, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	47
◦ Répartition du nombre d'échographies prénatales, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 7.1]	48
◦ Répartition du nombre d'échographies prénatales, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	49
◦ Moment de la première échographie prénatale, selon le nombre moyen de semaines de grossesse, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007	50
◦ Répartition du moment de la première échographie prénatale, selon le nombre de semaines de grossesse, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 7.2]	51
◦ Proportion de femmes ayant eu la première échographie prénatale avant 18 semaines, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	52
◦ Proportion de femmes ayant eu la première échographie prénatale avant 18 semaines, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	53
◦ Répartition du moment de la première échographie prénatale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 7.3]	54
◦ Répartition du moment de la première échographie prénatale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	55
<b>8 Test de dépistage du VIH</b>	56
◦ Proportion de femmes qui ont indiqué avoir subi un test de dépistage du VIH, selon la province ou le territoire et en fonction de l'approche de dépistage optionnel ou systématique, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 8.1]	56
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient subi un test de dépistage du VIH, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 8.3]	57
◦ Répartition du niveau de participation des femmes à la prise de décision concernant le test de dépistage du VIH, selon la province ou le territoire et en fonction de l'approche de dépistage optionnel ou systématique, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 8.2]	58
◦ Répartition du niveau de participation des femmes à la prise de décision concernant le test de dépistage du VIH, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 8.4]	59

<b>9 Indice de masse corporelle de la mère et gain de poids pendant la grossesse</b>	60
◦ IMC moyen (kg/m <sup>2</sup> ) avant la grossesse et au cours de la période postnatale, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007	60
◦ [Contient les données pour Figure 9.1]	
◦ IMC moyen (kg/m <sup>2</sup> ) avant la grossesse et au cours de la période postnatale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	61
◦ Gain de poids moyen pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007	62
◦ [Contient les données pour Figure 9.1]	
◦ Gain de poids moyen pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	63
◦ Répartition des catégories d'IMC (kg/m <sup>2</sup> ) avant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007	64
◦ Répartition des catégories d'IMC (kg/m <sup>2</sup> ) avant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	65
◦ [Contient les données pour Figure 9.2]	
◦ Répartition des catégories d'IMC (kg/m <sup>2</sup> ) au cours de la période postnatale, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007	66
◦ [Contient les données pour Figure 9.2]	
◦ Répartition des catégories d'IMC (kg/m <sup>2</sup> ) au cours de la période postnatale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	67
◦ [Contient les données pour Figure 9.2]	
◦ Répartition des catégories de gain de poids (kg) pendant la grossesse, en fonction des catégories d'IMC (kg/m <sup>2</sup> ) avant la grossesse, Canada, 2006–2007	68
◦ [Contient les données pour Figure 9.3]	
<b>10 Usage du tabac</b>	69
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les trois mois précédant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	69
◦ [Contient les données pour Figure 10.1]	
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les trois mois précédant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	70
◦ [Contient les données pour Figure 10.2]	
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les trois derniers mois de la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	71
◦ [Contient les données pour Figure 10.1]	
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les trois derniers mois de la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	72
◦ [Contient les données pour Figure 10.2]	



◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 10.1]	73
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 10.2]	74
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les trois mois précédant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	75
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les trois mois précédant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	76
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les trois derniers mois de la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	77
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les trois derniers mois de la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	78
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	79
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	80
◦ Proportion de femmes qui ont recommencé à fumer tous les jours ou à l'occasion, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, chez les femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion avant la grossesse et jamais dans les trois derniers mois de la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	81
◦ Proportion de femmes qui ont recommencé à fumer tous les jours ou à l'occasion, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, chez les femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion avant la grossesse et jamais dans les trois derniers mois de la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	82
◦ Répartition du nombre de cigarettes fumées par jour, chez les femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, selon la période, Canada, 2006–2007	83
◦ Proportion de femmes qui ont déclaré avoir vécu avec un fumeur pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	84
◦ Proportion de femmes qui ont déclaré avoir vécu avec un fumeur pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	85

<b>11 Consommation d'alcool</b>	86
◦ Répartition de la consommation d'alcool dans les trois mois précédant la grossesse, selon la fréquence de la consommation d'alcool, Canada, 2006–2007	86
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient consommé de l'alcool dans les trois mois précédant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	87
Répartition de la consommation d'alcool dans les trois mois précédant la grossesse, selon la province ou le territoire,	
◦ Canada, 2006–2007	88
[Contient les données pour Figure 11.1]	
◦ Répartition de la consommation d'alcool dans les trois mois précédant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	89
[Contient les données pour Figure 11.2 et Figure 11.3]	
Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient consommé de l'alcool pendant la grossesse, selon la province ou le	
◦ territoire, Canada, 2006–2007	90
◦ Répartition de la consommation d'alcool pendant la grossesse, selon la province ou le territoire Canada, 2006–2007	91
[Contient les données pour Figure 11.1]	
◦ Répartition de la consommation d'alcool pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	92
[Contient les données pour Figure 11.2 et Figure 11.3]	
Proportion de femmes ayant bu moins de deux verres d'alcool et ayant bu au moins deux verres d'alcool les jours où elles en	
◦ buvaient, chez les femmes ayant indiqué avoir bu fréquemment (au moins une fois par semaine) dans les trois mois avant la grossesse et pendant la grossesse, Canada, 2006–2007	93
<b>12 Consommation de drogues</b>	94
◦ Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient consommé des drogues de la rue, trois mois avant la grossesse et pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	94
Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient consommé des drogues de la rue, trois mois avant la grossesse et	
◦ pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	95
[Contient les données pour Figure 12.1 et Figure 12.2]	
<b>13 Violence physique</b>	96
◦ Proportion de femmes ayant subi un ou plusieurs actes de violence au cours des deux dernières années, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	96
[Contient les données pour Figure 13.1]	
Proportion de femmes ayant subi un ou plusieurs actes de violence au cours des deux dernières années, selon l'âge de la	
◦ mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	97
[Contient les données pour Figure 13.3 et Figure 13.4]	

◦ Proportion de femmes ayant subi différentes formes de violence au cours des deux dernières années, parmi les femmes qui ont fait état de violence, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 13.2]	98
◦ Répartition du nombre d'actes de violence, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence, Canada, 2006–2007	99
◦ Relation des femmes avec la personne qui a exercé de la violence à leur endroit, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence, Canada, 2006–2007	100
◦ Proportion de femmes ayant subi des actes de violence pendant la grossesse, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence, selon la province ou le territoire Canada, 2006–2007	101
◦ Niveau de violence pendant la grossesse comparativement à avant la grossesse, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence, Canada, 2006–2007	102
◦ Variation du niveau de violence depuis la naissance du bébé, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence avant ou pendant la grossesse et après la naissance du bébé, Canada, 2006–2007	103
◦ Proportion de femmes ayant indiqué avoir discuté du problème ou avoir reçu de l'information sur la conduite à tenir si elles subissaient des actes de violence, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	104

## **14 Stress et soutien social** 105

◦ Répartition des niveaux de stress indiqués par les femmes dans les 12 mois précédant la naissance du bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 14.1]	105
◦ Répartition des niveaux de stress indiqués par les femmes dans les 12 mois précédant la naissance du bébé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	106
◦ Répartition du nombre d'événements stressants dans les 12 mois précédant la naissance du bébé, selon la province ou le territoire Canada, 2006–2007	107
◦ Répartition du nombre d'événements stressants dans les 12 mois précédant la naissance du bébé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 14.2]	108
◦ Proportion de femmes ayant vécu différents événements stressants dans les 12 mois précédant la naissance du bébé, Canada, 2006–2007	109
◦ Répartition de la fréquence du soutien dont ont bénéficié les femmes pendant la grossesse, selon la province ou le territoire Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 14.3]	110
◦ Répartition de la fréquence du soutien dont ont bénéficié les femmes pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	111

<b>15 Lieu de l'accouchement</b>	112
◦ Répartition du lieu de l'accouchement, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 15.1]	112
◦ Proportion de femmes ayant accouché ailleurs qu'à l'hôpital, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	113
◦ Proportion de femmes ayant accouché ailleurs qu'à l'hôpital, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	114
<b>16 Déplacement jusqu'au lieu de l'accouchement</b>	115
◦ Proportion de femmes qui se sont déplacées dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007 [Contient les données pour Figure 16.1]	115
Proportion de femmes qui se sont déplacées dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, selon	
◦ l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	116
◦ Proportion de femmes qui se sont déplacées une distance quelconque dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007	117
Proportion de femmes qui se sont déplacées une distance quelconque dans une autre ville, un autre village ou une autre	
◦ localité pour accoucher, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	118
◦ Répartition du nombre de nuits passées à l'extérieur de leur communauté avant d'accoucher, chez les femmes qui se sont déplacées dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, Canada, 2006–2007	119
◦ Répartition des opinions des femmes qui se sont déplacées dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, selon la distance parcourue, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 16.2]	120
<b>17 Accoucheur</b>	121
◦ Répartition du type d'accoucheur ayant assisté à l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 17.1]	121
◦ Proportion de femmes ayant été suivies par le même professionnel de la santé pendant la grossesse et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 17.2]	122
Proportion de femmes ayant été suivies par le même professionnel de la santé pendant la grossesse et l'accouchement,	
◦ selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	123
Proportion de femmes qui estimaient qu'il était important d'être suivi par le même professionnel de la santé pendant leur	
◦ grossesse et pendant le travail et l'accouchement, selon qu'elles aient ou non été suivies par le même professionnel, Canada, 2006–2007	124

<b>18 Type d'accouchement</b>	125
◦ Répartition du type d'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 18.1]	125
◦ Répartition du type d'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 18.1, Figure 18.2 et Figure 18.3]	126
◦ Proportion de femmes ayant donné naissance par voie vaginale ou par césarienne, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	127
◦ Proportion de femmes ayant donné naissance par voie vaginale ou par césarienne, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	128
◦ Répartition des types d'accouchement assisté par voie vaginale, Canada, 2006–2007	129
◦ Proportion de femmes qui ont demandé une césarienne et proportion des femmes dont le professionnel de la santé a recommandé une césarienne à un moment donné pendant la grossesse, avant le travail et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	130
◦ Proportion de femmes dont l'accouchement par césarienne planifié était dû à des raisons médicales chez les femmes dont l'accouchement par césarienne était planifié, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	131
<b>19 Position pour accoucher</b>	132
◦ Répartition des positions pour accoucher adoptées par les femmes ayant accouché par voie vaginale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 19.1]	132
◦ Répartition des positions pour accoucher adoptées par les femmes ayant accouché par voie vaginale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	133
◦ Proportion de femmes ayant accouché par voie vaginale et ne se trouvant pas en décubitus latéral au moment de la naissance qui ont utilisé des étrières, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 19.2]	134
◦ Proportion de femmes ayant accouché par voie vaginale et ne se trouvant pas en décubitus latéral au moment de la naissance qui ont utilisé des étrières, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	135
<b>20 Déclenchement ou accélération du travail</b>	136
◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale dont le professionnel de la santé a essayé de déclencher ou d'accélérer le travail, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 20.1]	136

<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale dont le professionnel de la santé a essayé de déclencher ou d'accélérer le travail, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007</li> </ul>	137
<b>21 Monitoring foetal électronique</b>	138
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Répartition de l'utilisation du monitoring foetal électronique (MFE) pendant le travail chez les femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 21.1]</li> </ul>	138
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Répartition de l'utilisation de toute forme de monitoring foetal électronique (MFE) pendant le travail chez les femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007</li> </ul>	139
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Répartition de l'utilisation de toute forme de monitoring foetal électronique (MFE) pendant le travail chez les femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007</li> </ul>	140
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Proportion de l'utilisation du stéthoscope, de l'appareil Doppler ou du fœtoscope pour surveiller le rythme cardiaque du bébé pendant le travail chez les femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 21.2]</li> </ul>	141
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Proportion de l'utilisation du stéthoscope, de l'appareil Doppler ou du fœtoscope pour surveiller le rythme cardiaque du bébé pendant le travail chez les femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 21.3]</li> </ul>	142
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Proportion de femmes chez lesquelles l'auscultation du rythme cardiaque du fœtus pendant le travail a été effectuée exclusivement au moyen d'un stéthoscope, d'un appareil Doppler ou d'un fœtoscope, chez les femmes qui ont accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007</li> </ul>	143
<b>22 Rasage du pubis, lavement et poussée sur l'abdomen</b>	144
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale dont le pubis ou le périnée a été rasé, auxquelles on a administré un lavement ou chez lesquelles on a poussé sur le dessus de l'abdomen, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 22.1]</li> </ul>	144
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale dont le pubis ou le périnée a été rasé, auxquelles on a administré un lavement ou chez lesquelles on a poussé sur le dessus de l'abdomen, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 22.2 et Figure 22.3]</li> </ul>	145
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Proportion de femmes qui ont subi une poussée sur l'abdomen chez les femmes ayant accouché par voie vaginale, selon le type d'accoucheur, Canada, 2006–2007</li> </ul>	146

<b>23 Épisiotomie et points de suture dans la région du périnée</b>	147
◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont eu une épisiotomie ou des points de suture dans la région du périnée, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 23.1]	147
◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont eu une épisiotomie ou des points de suture dans la région du périnée, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 23.2 et Figure 23.3]	148
◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui n'ont pas eu une épisiotomie ou des points de suture dans la région du périnée, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	149
<b>24 Gestion de la douleur</b>	150
◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont utilisé des techniques particulières pour calmer la douleur, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 24.1]	150
◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont eu une anesthésie épidurale ou spinale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 24.2]	151
◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont eu une anesthésie épidurale ou spinale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	152
◦ Répartition des opinions des femmes sur l'efficacité des techniques pour calmer la douleur utilisées pendant le travail et l'accouchement, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 24.3]	153
◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont utilisé des techniques avec médicaments, sans médicaments ou les deux pour calmer la douleur pendant le travail et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 24.4]	154
◦ Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont utilisé des techniques avec médicaments, sans médicaments ou les deux pour calmer la douleur pendant le travail et l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	155
◦ Répartition des types d'anesthésie que les femmes ont reçu pendant l'accouchement par césarienne, que l'accouchement par césarienne soit planifié ou non, Canada, 2006–2007	156
◦ Proportion de femmes ayant subi une anesthésie générale pendant l'accouchement par césarienne, que l'accouchement par césarienne soit planifié ou non, Canada, 2006–2007	156

Proportion de femmes ayant reçu suffisamment d'information sur l'utilisation de techniques sans médicaments pour calmer la douleur et sur les effets secondaires éventuels des analgésiques et de l'anesthésie, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	157
[Contient les données pour Figure 24.5]	
Proportion de femmes ayant reçu suffisamment d'information sur l'utilisation de techniques sans médicaments pour calmer la douleur et sur les effets secondaires éventuels des analgésiques et de l'anesthésie, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	158

## 25 Soutien pendant le travail et l'accouchement

Proportion de femmes qui avaient à leurs côtés leur mari ou conjoint ou encore une compagne ou un compagnon pendant le travail et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	159
[Contient les données pour Figure 25.1]	
Proportion de femmes qui avaient à leurs côtés leur mari ou conjoint ou encore une compagne ou un compagnon pendant le travail et l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	160
[Contient les données pour Figure 25.2]	
Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du soutien qu'elles ont reçu de leur mari ou conjoint ou encore de leur compagne ou compagnon pendant le travail et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	161
Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du soutien qu'elles ont reçu de leur mari ou conjoint ou encore de leur compagne ou compagnon pendant le travail et l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	162
[Contient les données pour Figure 25.3]	
Proportion de femmes qui avaient reçu suffisamment d'information sur ce que leur mari ou conjoint pouvait faire pour les aider pendant le travail et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007	163

## 26 Contact entre la mère et le nourrisson à la naissance

Répartition des types de contact entre la mère et le nourrisson après la naissance, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	164
[Contient les données pour Figure 26.1]	
Répartition des types de contact entre la mère et le nourrisson après la naissance, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	165
Répartition des évaluations des femmes du moment de leur premier contact avec leur bébé, Canada, 2006–2007	166
Répartition des endroits où le bébé a passé la plus grande partie de la première heure après la naissance, Canada, 2006–2007	167
Répartition du nombre d'heures que le nourrisson a passé en dehors de la chambre de sa mère pendant les 24 premières heures suivant la naissance, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	168
[Contient les données pour Figure 26.2]	



◦ Répartition du nombre d'heures que le nourrisson a passé en dehors de la chambre de sa mère pendant les 24 premières heures suivant la naissance, selon le type d'accouchement, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 26.3]	169
<b>27 Expérience de l'accouchement et satisfaction à l'égard des soins</b>	<b>170</b>
◦ Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard de leur expérience globale du travail et de l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 27.1]	170
◦ Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard de leur expérience globale du travail et de l'accouchement, selon le type d'accoucheur, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 27.2]	171
◦ Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard de leur expérience globale du travail et de l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	172
◦ Proportion de femmes ayant reçu de l'information par leur professionnel de la santé, sur la progression du travail, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	173
◦ Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard de certains aspects de l'interaction avec les professionnels de la santé pendant toute la grossesse, le travail, l'accouchement et le post-partum immédiat, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 27.3]	174
◦ Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de l'information fournie par les professionnels de la santé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	175
◦ Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de l'information fournie par les professionnels de la santé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	176
◦ Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de la compassion et de la compréhension dont ont fait preuve les professionnels de la santé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	177
◦ Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de la compassion et de la compréhension dont ont fait preuve les professionnels de la santé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	178
◦ Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de la compétence dont ont fait preuve les professionnels de la santé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	179
◦ Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de la compétence dont ont fait preuve les professionnels de la santé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	180
◦ Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du respect de leur intimité et de leur dignité démontré par les professionnels de la santé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	181

Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du respect de leur intimité et de leur dignité démontré par les professionnels de la santé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	182
Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du respect dont les professionnels de la santé ont fait preuve à leur endroit, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	183
Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du respect dont les professionnels de la santé ont fait preuve à leur endroit, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	184
Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de leur participation personnelle à la prise de décisions, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	185
Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de leur participation personnelle à la prise de décisions, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	186
<b>28 Durée du séjour de la mère à l'hôpital</b>	187
◦ Durée moyenne du séjour à l'hôpital de la mère après l'accouchement, Canada, 2006–2007	187
◦ Proportion de femmes qui ont passé un court séjour à l'hôpital après l'accouchement, selon le type d'accouchement et la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 28.1]	188
◦ Proportion de femmes qui ont passé un court séjour à l'hôpital après l'accouchement, selon le type d'accouchement, l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 28.2]	189
◦ Répartition des opinions des femmes sur la durée de leur séjour à l'hôpital après l'accouchement, selon la durée du séjour et le type d'accouchement, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 28.3]	190
<b>29 Taux d'allaitement</b>	191
◦ Proportion de femmes qui avaient l'intention d'allaiter, proportion ayant commencé à allaiter et durée de l'allaitement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 29.1]	191
◦ Proportion de femmes qui avaient l'intention d'allaiter, proportion ayant commencé à allaiter et durée de l'allaitement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 29.2, Figure 29.3 et Figure 29.4]	192
◦ Proportion de femmes qui ont introduit d'autres liquides que le lait maternel dans l'alimentation du bébé dans la première semaine après l'accouchement, chez les femmes qui ont allaité ou tenté d'allaiter le bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	193

Proportion de femmes qui ont introduit d'autres liquides que le lait maternel dans l'alimentation du bébé dans les 14 premiers jours après l'accouchement, chez les femmes qui ont allaité ou tenté d'allaiter le bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	194
---	-----

### **30 Initiative Hôpitaux amis des bébés** 195

Proportion de femmes qui ont vécu des expériences correspondant aux étapes 3 à 10 de l'Initiative Hôpitaux amis des bébés, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 30.1]	195
---	-----

Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur l'allaitement (étape 3 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	196
---	-----

Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur l'allaitement (étape 3 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	197
---	-----

Proportion de femmes qui ont commencé l'allaitement entre 30 minutes et deux heures après la naissance (étape 4 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	198
---	-----

Proportion de femmes qui ont commencé l'allaitement entre 30 minutes et deux heures après la naissance (étape 4 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	199
---	-----

Proportion de femmes ayant reçu l'aide d'un professionnel de la santé pour commencer l'allaitement (étape 5 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	200
---	-----

Proportion de femmes ayant reçu l'aide d'un professionnel de la santé pour commencer l'allaitement (étape 5 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	201
---	-----

Proportion de femmes qui n'ont pas reçu ou ne se sont pas vu offrir des échantillons gratuits de lait maternisé par les professionnels de la santé (étape 6 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 30.3]	202
--	-----

Proportion de femmes qui n'ont pas reçu ou ne se sont pas vu offrir des échantillons gratuits de lait maternisé par les professionnels de la santé (étape 6 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	203
---	-----

Proportion de femmes qui ont gardé le bébé dans leur chambre pendant au moins 23 heures la première journée suivant la naissance (étape 7 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 30.4]	204
--	-----

Proportion de femmes qui ont gardé le bébé dans leur chambre pendant au moins 23 heures la première journée suivant la naissance (étape 7 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	205
---	-----

Proportion de femmes qui ont allaité le bébé à la demande au cours de la première semaine suivant la naissance (étape 8 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	206
---	-----

Proportion de femmes qui ont allaité le bébé à la demande au cours de la première semaine suivant la naissance (étape 8 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	207
Proportion de bébés qui ont reçu ni tétine artificielle ni sucette au cours de la première semaine suivant la naissance (étape 9 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	208
Proportion de bébés qui ont reçu ni tétine artificielle ni sucette au cours de la première semaine suivant la naissance (étape 9 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	209
Proportion de femmes qui ont reçu de l'information sur les services communautaires de soutien à l'allaitement (étape 10 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	210
Proportion de femmes qui ont reçu de l'information sur les services communautaires de soutien à l'allaitement (étape 10 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	211
Répartition du moment où la mère a allaité son bébé pour la première fois, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 30.2]	212
Répartition des méthodes d'allaitement pendant la première semaine après la naissance, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 30.5]	213
<b>31 Contact à domicile et satisfaction à l'égard des soins postnataux</b>	214
Proportion de femmes qui ont été contactées à leur domicile par un professionnel de la santé après la naissance, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 31.1]	214
Proportion de femmes qui ont été contactées à leur domicile par un professionnel de la santé après la naissance, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	215
Nombre moyen de jours qui se sont écoulés avant le premier contact à domicile par un professionnel de la santé, parmi les femmes qui ont été contactées, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 31.2]	216
Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard des soins maternels postnataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 31.3]	217
Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard des soins postnataux reçus par le bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 31.4]	218
<b>32 Information postnatale</b>	219
Répartition des sources d'information postnatale jugées les plus utiles par les femmes, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	219

(Partie 1 de 2) [Contient les données pour Figure 32.1]	
◦ Répartition des sources d'information postnatale jugées les plus utiles par les femmes, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	220
(Partie 2 de 2) [Contient les données pour Figure 32.1]	
◦ Répartition des sources d'information postnatale jugées les plus utiles par les femmes, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	221
(Partie 1 de 2) [Contient les données pour Figure 32.2]	
◦ Répartition des sources d'information postnatale jugées les plus utiles par les femmes, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	222
(Partie 2 de 2) [Contient les données pour Figure 32.2]	
Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur des questions postnatales, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	223
(Partie 1 de 2) [Contient les données pour Figure 32.3]	
Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur des questions postnatales, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	224
(Partie 2 de 2) [Contient les données pour Figure 32.3]	
Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur des questions postnatales, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	225
(Partie 1 de 2)	
Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur des questions postnatales, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	226
(Partie 2 de 2)	

### 33 Congé de maternité

◦ Répartition du statut d'emploi des femmes pendant la grossesse et de la réception de prestations de maternité ou parentales, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	227
[Contient les données pour Figure 33.1]	
◦ Répartition du statut d'emploi des femmes pendant la grossesse et de la réception de prestations de maternité ou parentales, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	228
[Contient les données pour Figure 33.2 et Figure 33.3]	

◦ Proportion de femmes qui ont occupé un emploi rémunéré ou travaillé à leur propre compte à un moment donné pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	229
◦ Proportion de femmes qui ont occupé un emploi rémunéré ou travaillé à leur propre compte à un moment donné pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	230
◦ Pourcentage cumulatif de femmes qui ont arrêté de travailler pendant la grossesse, selon le nombre de semaines de grossesse, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 33.4]	231
◦ Proportion de femmes qui sont retournées travailler dans les six mois suivant la naissance, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007 [Contient les données pour Figure 33.5]	232

## **34 Santé postnatale de la mère** 233

◦ Proportion de femmes qui ont fait état d'au moins « un gros problème » de santé postnatale dans les trois premiers mois après l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	233
◦ Proportion de femmes qui ont fait état d'au moins « un gros problème » de santé postnatale dans les trois premiers mois après l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	234
◦ Répartition des problèmes de santé jugés « un gros problème » par les femmes pendant les trois premiers mois qui ont suivi la naissance, selon le type d'accouchement, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 34.1]	235
◦ Répartition des problèmes de santé jugés « un gros problème » par les femmes pendant les trois premiers mois qui ont suivi la naissance, selon la parité, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 34.2]	236
◦ Proportion de femmes réadmissées à l'hôpital dans les trois premiers mois après l'accouchement, selon le type d'accouchement, Canada, 2006–2007	237
◦ Proportion de femmes ayant consulté un professionnel de la santé en dehors des consultations postnatales prévues après l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	238
◦ Proportion de femmes indiquant qu'il était quelque peu ou très difficile de consulter un professionnel de la santé en dehors des consultations postnatales prévues après l'accouchement chez les femmes qui ont obtenu une telle consultation, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	239
◦ Proportion de femmes indiquant qu'il était quelque peu ou très difficile de consulter un professionnel de la santé en dehors des consultations postnatales prévues après l'accouchement chez les femmes qui ont obtenu une telle consultation, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	240
◦ Raisons pour lesquelles des femmes estimaient qu'il était quelque peu ou très difficile d'obtenir une consultation d'un professionnel de la santé en dehors des consultations postnatales prévues après l'accouchement, Canada, 2006–2007	241
◦ Répartition des opinions des femmes sur leur santé postnatale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	242

[Contient les données pour Figure 34.3]	
◦ Répartition des opinions des femmes sur leur santé postnatale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	243
[Contient les données pour Figure 34.4 et Figure 34.5]	
<b>35 Dépression post-partum, dépression antérieure et soutien</b>	244
◦ Répartition du score obtenu sur l'Échelle de dépression post-partum d'Édimbourg (EDPE), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	244
[Contient les données pour Figure 35.1]	
◦ Répartition du score obtenu sur l'Échelle de dépression post-partum d'Édimbourg (EDPE), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	245
[Contient les données pour Figure 35.2 et Figure 35.3]	
◦ Proportion de femmes auxquelles on a prescrit des antidépresseurs ou chez lesquelles on avait diagnostiqué une dépression avant leur grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	246
[Contient les données pour Figure 35.4]	
◦ Proportion de femmes auxquelles on a prescrit des antidépresseurs ou chez lesquelles on avait diagnostiqué une dépression avant leur grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	247
◦ Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information pendant leur grossesse sur la dépression postpartum, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	248
◦ Répartition de la disponibilité d'un soutien postnatal, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	249
[Contient les données pour Figure 35.5]	
<b>36 Santé du nourrisson</b>	250
◦ Répartition de l'âge de gestation (en semaines) à la naissance, Canada, 2006–2007	250
◦ Proportion de nourrissons nés à moins de 37 semaines révolues de gestation (naissance prématurée), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	251
◦ Proportion de nourrissons nés à moins de 37 semaines révolues de gestation (naissance prématurée), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	252
◦ Proportion de femmes dont le bébé a été admis à l'unité des soins intensifs ou des soins spéciaux après la naissance et durée du séjour du bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	253
[Contient les données pour Figure 36.1]	
◦ Proportion de femmes dont le bébé a été admis à l'unité des soins intensifs ou des soins spéciaux après la naissance, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	254

Proportion de femmes dont le bébé a été admis à l'unité des soins intensifs ou des soins spéciaux après la naissance, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	255
Proportion de nourrissons réadmis à l'hôpital dans le mois et dans les cinq mois suivant la naissance, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007	256
Proportion de femmes dont le bébé a reçu des soins de santé autres que de routine, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 36.2]	257
Proportion de femmes dont le bébé a reçu des soins de santé autres que de routine, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	258
Répartition de l'évaluation du degré de difficulté à voir un professionnel de la santé pour recevoir des soins de santé autres que de routine par les femmes dont le bébé a reçu de tels soins, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 36.3]	259
Raisons pour lesquelles des femmes estimaient qu'il était quelque peu ou très difficile de consulter un professionnel de la santé pour des soins autres que de routine pour le nourrisson, Canada, 2006–2007	260
Répartition des opinions des femmes sur la santé du bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 36.4]	261
Répartition des opinions des femmes sur la santé du bébé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	262

## 37 Position du nourrisson pour dormir

Répartition de la position du nourrisson pour dormir, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 37.1]	263
Répartition de la position du nourrisson pour dormir, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 37.2 et Figure 37.3]	264
Proportion de femmes ayant reçu suffisamment d'information sur le syndrome de la mort subite du nourrisson, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 [Contient les données pour Figure 37.4]	265
Proportion de femmes ayant reçu suffisamment d'information sur le syndrome de la mort subite du nourrisson, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007	266



## 38 Circoncision

- |   |     |
|---|-----|
|   | 267 |
| ◦ Proportion de bébés de sexe masculin qui ont été circoncis, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007<br>[Contient les données pour Figure 38.1]  | 267 |
| ◦ Répartition des principales raisons à l'origine de la décision de circoncire, Canada, 2006–2007   | 268 |
| ◦ Proportion de femmes ayant un bébé de sexe masculin qui ont reçu suffisamment d'information sur la circoncision, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007<br>[Contient les données pour Figure 38.2] | 269 |

# Caractéristiques démographiques

## Répartition des caractéristiques démographiques, selon la province ou le territoire, Enquête sur l'expérience de la maternité, Canada, 2006–2007

(Partie 1 de 3)

	Terre-Neuve-et-Labrador		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick		Québec	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>										
15–19	5,0	4,7–5,4	3,7 †	2,2–5,2	4,5	3,7–5,3	5,1	4,2–6,0	1,9	1,6–2,1
20–24	13,5	10,4–16,6	17,6	14,6–20,6	14,1	11,0–17,3	17,9	14,5–21,4	11,9	10,3–13,6
25–29	37,4	34,2–40,6	34,8	31,6–37,9	32,6	29,4–35,8	36,8	33,1–40,5	39,8	38,2–41,5
30–34	28,3	25,0–31,5	27,4	24,6–30,1	31,5	28,3–34,7	28,2	25,0–31,3	32,8	31,1–34,6
35–39	14,0	11,0–17,1	15,0	12,4–17,6	13,6	10,7–16,5	9,3	6,7–12,0	11,1	9,5–12,7
≥40	*		*		3,4 †	1,8–4,9	2,0 ‡	0,6–3,4	2,1 †	1,3–2,9
Manquante	*		*		*		*		0,4 ‡	0,1–0,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>										
Études secondaires non terminées	7,9	5,3–10,4	7,6	5,4–9,8	6,4 †	4,3–8,5	6,8	4,7–8,9	8,2	6,7–9,8
Diplôme d'études secondaires	22,5	18,3–26,6	27,2	23,6–30,9	27,8	23,6–32,1	24,9	20,7–29,1	13,6	11,8–15,4
Diplôme d'études postsecondaires	37,5	32,6–42,4	33,7	29,7–37,7	32,5	28,0–37,0	38,1	33,3–42,9	41,0	38,3–43,7
Diplôme universitaire	31,8	27,4–36,2	31,5	27,7–35,2	33,3	29,1–37,4	29,9	25,3–34,6	35,2	32,7–37,8
Manquante	*		*		*		*		1,9 †	1,1–2,6
<b>Parité</b>										
Primipares	50,0	45,4–54,7	43,1	39,0–47,2	46,4	41,5–51,3	44,9	40,0–49,7	45,8	44,6–47,0
Multipares	49,6	44,9–54,2	56,9	52,8–61,0	53,6	48,7–58,5	55,1	50,3–60,0	53,9	52,7–55,1
Manquante	*		*		*		*		*	
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	22,2	18,5–25,9	17,9	14,7–21,1	23,1	19,4–26,9	23,7	19,6–27,8	18,8	16,6–20,9
Au-dessus du SFR	73,2	69,2–77,1	77,7	74,3–81,1	71,2	67,3–75,1	71,5	67,0–75,9	72,8	70,4–75,2
Manquante	4,6 †	2,7–6,5	4,4 †	2,6–6,1	5,7 †	3,6–7,8	4,8 †	2,7–7,0	8,5	6,9–10,0
<b>Type d'accouchement</b>										
Voie vaginale	70,1	65,5–74,7	67,4	63,7–71,2	69,2	65,1–73,3	76,2	71,8–80,6	77,3	74,9–79,6
Césarienne	29,9	25,3–34,5	32,6	28,8–36,4	30,8	26,7–34,9	23,8	19,4–28,2	22,7	20,4–25,1

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition des caractéristiques démographiques, selon la province ou le territoire, Enquête sur l'expérience de la maternité, Canada, 2006–2007**

(Partie 2 de 3)

	Ontario		Manitoba		Saskatchewan		Alberta		Colombie-Britannique	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>										
15–19	2,7	2,3–3,0	5,7	4,5–7,0	7,1	6,5–7,7	3,8	3,3–4,3	2,1	1,6–2,5
20–24	11,7	10,4–13,0	16,5	13,1–19,8	17,8	14,5–21,2	15,2	12,8–17,6	13,4	11,0–15,8
25–29	29,4	28,0–30,8	34,3	30,7–37,9	35,6	32,1–39,1	34,1	31,6–36,6	28,4	25,8–30,9
30–34	34,3	32,7–35,9	31,1	28,0–34,3	28,8	26,0–31,7	30,6	28,2–32,9	34,7	31,8–37,5
35–39	17,6	16,1–19,1	9,9	7,2–12,6	8,4	5,8–11,0	13,0	10,8–15,3	17,1	14,4–19,7
≥40	3,7	2,9–4,5	1,7 ‡	0,4–2,9	2,3 †	0,8–3,7	2,6 †	1,4–3,7	3,5 †	2,2–4,8
Manquante	0,6 †	0,2–0,9	*		*		0,8 ‡	0,1–1,4	1,0 ‡	0,2–1,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>										
Études secondaires non terminées	7,0	5,9–8,1	11,9	8,8–15,1	10,2	7,7–12,8	7,3	5,6–9,1	5,5	4,0–7,0
Diplôme d'études secondaires	18,0	16,3–19,7	28,9	24,4–33,5	27,2	23,0–31,3	22,8	19,7–25,9	22,1	19,0–25,2
Diplôme d'études postsecondaires	35,4	33,3–37,4	30,1	25,5–34,6	34,6	30,1–39,2	39,4	35,7–43,1	35,7	32,0–39,4
Diplôme universitaire	38,5	36,4–40,6	28,1	23,9–32,4	27,4	23,4–31,5	30,1	26,9–33,2	35,7	32,2–39,2
Manquante	1,2 †	0,7–1,6	*		*		*		1,1 ‡	0,2–1,9
<b>Parité</b>										
Primipares	43,5	42,5–44,6	41,8	37,3–46,4	41,9	37,5–46,4	46,0	42,4–49,7	46,4	44,6–48,1
Multipares	55,9	54,8–57,0	57,9	53,3–62,4	57,5	53,0–62,0	53,8	50,2–57,4	53,3	51,6–55,0
Manquante	0,6 †	0,3–0,9	*		*		*		*	
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	18,1	16,4–19,8	24,6	20,3–28,8	20,9	17,1–24,8	13,4	10,9–15,8	18,9	16,0–21,8
Au-dessus du SFR	71,7	69,7–73,6	68,2	63,5–73,0	70,8	66,7–75,0	77,8	74,7–80,8	72,8	69,4–76,2
Manquante	10,3	9,0–11,6	7,2 †	4,7–9,8	8,3 †	5,5–11,0	8,9	6,7–11,0	8,3	6,1–10,5
<b>Type d'accouchement</b>										
Voie vaginale	72,7	70,7–74,6	76,8	72,7–80,8	75,4	71,2–79,6	72,7	69,4–75,9	69,9	66,5–73,3
Césarienne	27,3	25,4–29,3	23,2	19,2–27,3	24,6	20,4–28,8	27,3	24,1–30,6	30,1	26,7–33,6

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition des caractéristiques démographiques, selon la province ou le territoire, Enquête sur l'expérience de la maternité, Canada, 2006–2007**

(Partie 3 de 3)

	Yukon		Territoires du Nord-Ouest		Nunavut		Canada	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	*		6,3 †	3,9–8,8	22,6	17,9–27,3	3,0	2,8–3,2
20–24	13,5	9,4–17,6	18,8	14,2–23,4	30,8	24,3–37,4	13,0	12,3–13,8
25–29	29,3	23,8–34,8	33,6	28,1–39,0	30,0	23,5–36,6	33,1	32,2–33,9
30–34	28,6	23,3–34,0	27,5	22,5–32,6	12,8 †	8,2–17,5	32,9	32,0–33,8
35–39	25,0	19,9–30,2	9,1 †	5,7–12,4	*		14,5	13,7–15,3
≥40	*		*		*		3,0	2,5–3,4
Manquante	*		*		*		0,6 †	0,4–0,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	*		21,3	16,5–26,1	54,7	47,9–61,5	7,6	6,9–8,2
Diplôme d'études secondaires	24,4	19,3–29,5	23,6	18,8–28,5	19,7	14,1–25,4	19,2	18,2–20,1
Diplôme d'études postsecondaires	29,3	23,7–34,9	32,7	27,5–37,9	14,7 †	9,7–19,8	37,0	35,8–38,2
Diplôme universitaire	39,5	33,6–45,3	20,1	15,7–24,5	6,1 †	3,0–9,3	35,1	33,9–36,3
Manquante	*		*		*		1,2	0,9–1,4
<b>Parité</b>								
Primipares	42,8	36,9–48,7	32,7	27,4–38,0	28,2	21,9–34,4	44,7	44,0–45,5
Multipares	57,2	51,3–63,2	67,3	62,0–72,6	71,8	65,6–78,1	54,9	54,1–55,6
Manquante	*		*		*		0,4 †	0,2–0,6
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	10,0 †	6,5–13,5	25,9	20,6–31,1	32,0	25,0–39,0	18,4	17,4–19,4
Au-dessus du SFR	86,5	82,4–90,5	65,2	59,5–70,9	27,0	20,7–33,2	72,6	71,5–73,7
Manquante	*		9,0 †	5,7–12,2	41,1	33,9–48,3	9,0	8,3–9,7
<b>Type d'accouchement</b>								
Voie vaginale	76,7	71,9–81,6	79,5	74,7–84,2	90,7	86,4–95,1	73,7	72,5–74,8
Césarienne	23,3	18,5–28,1	20,6	15,8–25,3	9,3 †	4,9–13,6	26,3	25,2–27,5

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

# 1 Réaction à la grossesse

## Répartition de la réaction des femmes relativement à l'opportunité de la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 1.1]

Province/territoire	Désiraient être enceintes plus tôt		Désiraient être enceintes à ce moment précis		Désiraient être enceintes plus tard		Ne désiraient pas être enceintes ni à ce moment-là ni à aucun autre	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	25,6	21,2–29,9	46,9	41,8–52,0	19,6	15,7–23,4	7,9 †	5,3–10,6
Île-du-Prince-Édouard	22,9	19,4–26,5	42,7	38,4–46,9	21,9	18,5–25,4	12,5	9,6–15,4
Nouvelle-Écosse	21,3	17,4–25,1	44,3	39,5–49,0	24,1	20,4–27,7	10,4	7,6–13,2
Nouveau-Brunswick	18,6	14,8–22,4	45,7	41,0–50,4	27,0	22,8–31,2	8,7 †	5,8–11,5
Québec	18,5	16,5–20,5	56,6	54,0–59,1	18,3	16,3–20,3	6,6	5,2–8,0
Ontario	26,5	24,6–28,4	46,6	44,4–48,8	20,7	19,0–22,5	6,1	5,1–7,2
Manitoba	24,2	20,0–28,5	43,9	39,1–48,7	25,0	20,7–29,3	6,9 †	4,5–9,2
Saskatchewan	19,1	15,4–22,8	45,8	40,8–50,8	24,8	20,7–28,9	10,2	7,4–13,1
Alberta	23,0	19,8–26,1	50,9	47,1–54,7	16,9	14,3–19,5	9,3	7,1–11,5
Colombie-Britannique	25,4	22,1–28,8	48,7	45,0–52,4	19,2	16,2–22,1	6,7	4,8–8,6
Yukon	31,5	25,6–37,3	49,2	43,1–55,3	16,0	11,6–20,4	*	
Territoires du Nord-Ouest	25,4	20,4–30,5	37,1	31,6–42,7	24,2	19,3–29,1	13,2	9,2–17,2
Nunavut	16,6	11,3–21,9	45,9	38,6–53,2	23,2	17,0–29,5	14,3 †	9,3–19,3
<b>Canada</b>	<b>23,4</b>	<b>22,3–24,5</b>	<b>49,5</b>	<b>48,3–50,8</b>	<b>20,0</b>	<b>19,0–21,0</b>	<b>7,1</b>	<b>6,4–7,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

## Répartition de la réaction des femmes relativement à l'opportunité de la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 1.2, Figure 1.3 et Figure 1.4]

	Désiraient être enceintes plus tôt		Désiraient être enceintes à ce moment précis		Désiraient être enceintes plus tard		Ne désiraient pas être enceintes ni à ce moment-là ni à aucun autre	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	2,7 ‡	0,9–4,5	24,8	19,4–30,1	61,2	55,2–67,2	11,3 †	7,5–15,1
20–24	13,2	10,8–15,5	43,5	40,0–47,0	37,2	33,8–40,6	6,1	4,4–7,7
25–29	20,6	18,8–22,4	54,9	52,6–57,3	19,0	17,1–20,8	5,5	4,4–6,5
30–34	27,8	25,9–29,7	50,5	48,3–52,7	15,2	13,6–16,8	6,5	5,4–7,6
35–39	30,5	27,4–33,6	48,0	44,8–51,3	12,9	10,6–15,1	8,6	6,7–10,6
≥40	35,9	28,8–42,9	38,0	30,7–45,2	3,6 ‡	0,9–6,4	22,5	16,4–28,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	18,7	15,0–22,4	37,6	33,2–42,0	31,3	27,3–35,3	12,4	9,5–15,3
Diplôme d'études secondaires	17,2	15,0–19,4	44,3	41,4–47,3	29,0	26,4–31,6	9,5	7,9–11,1
Diplôme d'études postsecondaires	23,9	22,1–25,8	50,8	48,7–53,0	17,8	16,2–19,5	7,4	6,2–8,5
Diplôme universitaire	27,6	25,7–29,6	53,5	51,3–55,7	14,8	13,2–16,3	4,1	3,2–4,9
<b>Parité</b>								
Primipares	26,6	24,9–28,2	46,9	45,0–48,8	22,8	21,3–24,3	3,7	3,0–4,4
Multipares	20,8	19,4–22,3	51,7	49,9–53,4	17,6	16,3–19,0	9,8	8,8–10,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	17,7	15,3–20,0	37,9	35,1–40,7	31,3	28,6–33,9	13,2	11,1–15,3
Au-dessus du SFR	25,4	24,1–26,7	52,9	51,4–54,4	16,6	15,5–17,8	5,1	4,4–5,7
<b>Toutes les femmes</b>	<b>23,4</b>	<b>22,3–24,5</b>	<b>49,5</b>	<b>48,3–50,8</b>	<b>20,0</b>	<b>19,0–21,0</b>	<b>7,1</b>	<b>6,4–7,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

## Répartition de la réaction des femmes à la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 1.5]

Province/territoire	Très heureuses		Quelque peu heureuses		Ni heureuses ni malheureuses		Quelque peu malheureuses		Très malheureuses	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	79,3	75,3–83,3	11,9	8,5–15,3	4,9 †	2,8–7,0	2,8 †	1,1–4,5	*	
Île-du-Prince-Édouard	75,0	71,3–78,8	15,8	12,6–18,9	3,3 †	1,8–4,9	3,2 †	1,8–4,6	2,7 †	1,3–4,0
Nouvelle-Écosse	71,0	67,0–75,0	17,2	13,7–20,6	7,2 †	4,8–9,7	3,4 †	1,8–5,1	*	
Nouveau-Brunswick	75,8	71,6–80,0	15,2	11,6–18,8	5,6 †	3,3–7,8	2,8 †	1,3–4,4	*	
Québec	86,2	84,4–88,1	7,7	6,3–9,1	3,8	2,8–4,9	1,9 †	1,2–2,6	0,4 ‡	0,1–0,7
Ontario	80,2	78,4–82,0	13,5	12,0–15,1	3,6	2,8–4,4	2,3	1,6–2,9	0,4 ‡	0,1–0,7
Manitoba	76,2	72,1–80,4	13,9	10,5–17,4	7,2 †	4,6–9,8	*		1,5 ‡	0,3–2,7
Saskatchewan	74,5	70,3–78,7	14,6	11,1–18,0	6,5 †	4,2–8,7	3,6 †	1,8–5,4	*	
Alberta	78,7	75,8–81,7	12,1	9,6–14,5	5,1	3,6–6,7	3,1 †	1,9–4,4	0,9 ‡	0,2–1,6
Colombie-Britannique	81,0	78,0–84,0	13,6	10,9–16,2	3,4 †	2,0–4,7	1,6 †	0,7–2,5	*	
Yukon	86,9	83,0–90,8	9,8 †	6,3–13,2	*		*		*	
Territoires du Nord-Ouest	72,0	66,9–77,1	20,0	15,5–24,5	5,9 †	3,2–8,6	*		*	
Nunavut	64,5	57,6–71,4	20,6	14,6–26,6	9,9 †	5,6–14,2	*		*	
<b>Canada</b>	<b>80,9</b>	<b>79,9–81,8</b>	<b>12,1</b>	<b>11,3–13,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7–4,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9–2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4–0,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

## Répartition de la réaction des femmes à la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 1.6]

	Très heureuses		Quelque peu heureuses		Ni heureuses ni malheureuses		Quelque peu malheureuses		Très malheureuses	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>										
15–19	36,4	30,7–42,1	38,4	32,5–44,2	19,1	14,3–23,9	4,3 †	2,1–6,5	1,8 ‡	0,5–3,2
20–24	70,0	66,8–73,3	20,4	17,6–23,3	6,4	4,7–8,1	2,6 †	1,5–3,7	0,5 ‡	0,1–1,0
25–29	84,5	82,9–86,2	9,9	8,5–11,4	3,1	2,4–3,9	1,9 †	1,3–2,6	0,5 †	0,2–0,7
30–34	85,1	83,5–86,6	9,6	8,3–10,9	3,1	2,3–3,8	1,9	1,3–2,5	0,4 ‡	0,1–0,7
35–39	83,3	80,8–85,9	10,0	7,9–12,1	3,4 †	2,3–4,6	2,7 †	1,5–3,9	0,5 ‡	0,1–1,0
≥40	72,9	66,2–79,5	14,1 †	8,8–19,4	6,7 †	3,2–10,2	4,7 †	1,7–7,7	*	
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>										
Études secondaires non terminées	65,1	61,0–69,2	20,3	16,9–23,7	8,0	5,8–10,2	4,5 †	2,7–6,4	2,0 †	0,9–3,2
Diplôme d'études secondaires	72,9	70,4–75,3	17,4	15,3–19,6	6,0	4,7–7,3	3,1	2,2–4,1	0,6 ‡	0,2–1,0
Diplôme d'études postsecondaires	82,9	81,3–84,5	10,9	9,6–12,2	3,6	2,8–4,4	2,0	1,5–2,6	0,6 †	0,3–0,9
Diplôme universitaire	86,7	85,2–88,3	8,6	7,4–9,8	2,8	2,1–3,5	1,6 †	1,0–2,1	0,3 ‡	0,0–0,5
<b>Parité</b>										
Primipares	81,8	80,4–83,2	12,1	10,9–13,3	4,4	3,6–5,1	1,4	1,0–1,8	0,3 †	0,1–0,5
Multipares	80,1	78,7–81,5	12,2	11,1–13,3	4,0	3,3–4,7	3,0	2,4–3,6	0,8 †	0,5–1,1
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	67,4	64,6–70,1	20,6	18,2–23,0	7,0	5,5–8,5	4,1	2,9–5,3	1,0 †	0,5–1,5
Au-dessus du SFR	85,1	84,0–86,1	9,7	8,8–10,6	3,2	2,7–3,7	1,7	1,3–2,0	0,4 †	0,2–0,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>80,9</b>	<b>79,9–81,8</b>	<b>12,1</b>	<b>11,3–13,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7–4,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9–2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4–0,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.



## 2 Professionnels de la santé ayant dispensé les soins prénataux

### Répartition du type de professionnel de la santé ayant dispensé les soins prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 2.1 et Figure 2.2]

Province/territoire	Obstétricien/gynécologue		Médecin de famille		Sage-femme §		Infirmière/infirmière praticienne		Autre **	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	37,4	32,7–42,0	57,6	52,9–62,3	*		3,7 †	1,9–5,5	*	
Île-du-Prince-Édouard	89,1	86,5–91,6	9,3	6,8–11,7	*		*		*	
Nouvelle-Écosse	53,0	48,2–57,7	44,2	39,5–49,0	*		1,6 ‡	0,3–2,8	*	
Nouveau-Brunswick	45,8	41,0–50,6	49,8	44,8–54,7	*		*		4,1 †	2,0–6,3
Québec	67,2	64,7–69,7	28,0	25,7–30,3	2,6 †	1,8–3,5	*		2,0 †	1,3–2,8
Ontario	66,0	64,0–68,1	24,0	22,1–25,8	9,2	8,0–10,5	0,4 ‡	0,1–0,6	0,4 ‡	0,1–0,7
Manitoba	50,7	46,1–55,3	38,0	33,6–42,4	9,4	6,5–12,3	*		*	
Saskatchewan	35,0	30,5–39,5	64,4	59,9–68,9	*		*		*	
Alberta	49,5	46,0–52,9	46,8	43,3–50,2	2,5 †	1,2–3,7	*		0,9 ‡	0,2–1,6
Colombie-Britannique	37,8	34,0–41,6	51,2	47,5–55,0	9,8	7,7–11,9	*		1,0 ‡	0,2–1,9
Yukon	9,9 †	6,3–13,6	83,1	78,4–87,7	*		*		*	
Territoires du Nord-Ouest	9,8 †	6,5–13,2	48,1	42,2–54,1	8,8 †	5,7–11,9	30,8	25,4–36,2	*	
Nunavut	6,0 †	2,5–9,4	22,4	16,2–28,5	7,1 †	3,5–10,6	58,5	51,4–65,7	6,1 †	2,8–9,3
<b>Canada</b>	<b>58,1</b>	<b>56,9–59,3</b>	<b>34,2</b>	<b>33,1–35,3</b>	<b>6,1</b>	<b>5,4–6,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4–0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8–1,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Les soins des sages-femmes sont actuellement autorisés en vertu de la loi dans sept provinces (Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Québec, Manitoba, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse) et dans les Territoires du Nord-Ouest<sup>1</sup> et financée par les fonds publics dans quatre provinces (Ontario, Colombie-Britannique, Québec, Manitoba) et dans les Territoires du Nord-Ouest<sup>2,3</sup>. Au Nunavut, les sages-femmes autorisées d'une province quelconque peuvent exercer et être rémunérées à la maison des naissances de Rankin Inlet<sup>2</sup>. Voir références 1-3 Section 2: Professionnels de la santé ayant dispensé les soins prénataux.

\*\* La catégorie « Autre » inclut les professionnels de la santé dont le type n'a pas été précisé par les mères, notamment les médecins dont la spécialisation n'a pas été précisée.

## Répartition du type de professionnel de la santé ayant dispensé les soins prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 2.3]

	Obstétricien/gynécologue		Médecin de famille		Sage-femme §		Infirmière/infirmière praticienne		Autre **	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>										
15–19	50,9	45,1–56,6	41,3	35,8–46,9	5,3 †	2,6–7,9	1,3	0,9–1,7	1,2 ‡	0,2–2,2
20–24	50,8	47,4–54,2	42,6	39,1–46,1	3,9 †	2,5–5,3	1,0 †	0,5–1,5	1,7 †	0,8–2,5
25–29	56,9	54,7–59,2	36,0	33,9–38,1	5,1	4,1–6,0	0,7 †	0,4–1,0	1,3 †	0,8–1,8
30–34	60,6	58,5–62,6	32,1	30,2–34,1	6,4	5,2–7,5	0,2 ‡	0,1–0,4	0,7 †	0,4–1,1
35–39	62,5	59,1–65,9	26,7	23,6–29,7	9,5	7,4–11,6	0,5 ‡	0,1–1,0	0,8 ‡	0,2–1,4
≥40	60,9	53,5–68,2	32,3	25,4–39,3	6,7 †	2,9–10,4	*		*	
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>										
Études secondaires non terminées	54,0	49,6–58,5	39,2	34,8–43,6	3,1 †	1,6–4,6	2,2 †	1,4–3,1	1,5 ‡	0,5–2,5
Diplôme d'études secondaires	53,2	50,4–56,0	40,9	38,2–43,7	3,9	2,7–5,0	0,8 †	0,4–1,2	1,2 †	0,6–1,8
Diplôme d'études postsecondaires	60,6	58,6–62,6	32,6	30,7–34,5	5,2	4,2–6,2	0,4 †	0,2–0,6	1,2 †	0,8–1,7
Diplôme universitaire	58,6	56,5–60,7	31,5	29,6–33,5	8,9	7,6–10,2	0,3 ‡	0,1–0,4	0,7 †	0,4–1,1
<b>Parité</b>										
Primipares	57,7	55,9–59,4	34,0	32,3–35,7	6,3	5,4–7,2	0,5 †	0,3–0,7	1,5	1,0–2,0
Multipares	58,4	56,7–60,0	34,4	32,9–35,9	5,9	5,0–6,7	0,6	0,4–0,8	0,7 †	0,4–1,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	58,1	55,3–61,0	33,9	31,2–36,5	5,6	4,2–7,0	1,6 †	0,9–2,2	0,9 †	0,3–1,4
Au-dessus du SFR	57,9	56,5–59,4	34,5	33,2–35,9	6,2	5,5–7,0	0,3 †	0,2–0,3	1,0	0,8–1,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>58,1</b>	<b>56,9–59,3</b>	<b>34,2</b>	<b>33,1–35,3</b>	<b>6,1</b>	<b>5,4–6,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4–0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8–1,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Les soins des sages-femmes sont actuellement autorisés en vertu de la loi dans sept provinces (Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Québec, Manitoba, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse) et dans les Territoires du Nord-Ouest<sup>1</sup> et financée par les fonds publics dans quatre provinces (Ontario, Colombie-Britannique, Québec, Manitoba) et dans les Territoires du Nord-Ouest<sup>2,3</sup>. Au Nunavut, les sages-femmes autorisées d'une province quelconque peuvent exercer et être rémunérées à la maison des naissances de Rankin Inlet<sup>2</sup>.

Voir références 1-3 Section 2: Professionnels de la santé ayant dispensé les soins prénataux.

\*\* La catégorie « Autre » inclut les professionnels de la santé dont le type n'a pas été précisé par les mères, notamment les médecins dont la spécialisation n'a pas été précisée.

### 3 Soins prénataux

Nombre de consultations pour les soins prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

Province/territoire	1–4		5–10		11–15		16–20		≥21	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	1,5 ‡	0,4–2,6	23,3	18,7–27,9	49,0	43,9–54,1	15,6	12,0–19,3	10,5	7,3–13,7
Île-du-Prince-Édouard	*		25,7	22,2–29,2	53,1	48,9–57,3	15,8	12,7–18,8	4,9 †	3,1–6,8
Nouvelle-Écosse	*		19,4	15,5–23,3	48,6	43,8–53,4	22,5	18,3–26,6	8,3	5,6–11,0
Nouveau-Brunswick	*		28,1	23,5–32,7	49,8	44,5–55,0	15,6	11,9–19,2	5,7 †	3,4–8,0
Québec	0,9 †	0,3–1,4	42,6	39,8–45,5	46,4	43,5–49,3	7,8	6,2–9,4	2,3 †	1,4–3,1
Ontario	1,0 †	0,6–1,5	27,3	25,2–29,4	52,0	49,7–54,3	15,2	13,5–16,8	4,5	3,6–5,5
Manitoba	2,4 †	0,9–4,0	32,1	27,4–36,9	51,6	46,5–56,6	10,4	7,4–13,4	3,5 †	1,6–5,3
Saskatchewan	*		32,9	28,2–37,7	53,4	48,3–58,5	9,4	6,5–12,4	3,0 †	1,3–4,7
Alberta	1,1 ‡	0,3–2,0	31,2	27,7–34,7	49,9	46,0–53,7	13,5	10,8–16,2	4,3 †	2,8–5,8
Colombie-Britannique	*		27,8	24,2–31,4	54,0	49,9–58,1	14,2	11,3–17,0	3,3 †	2,0–4,6
Yukon	*		32,3	26,5–38,0	60,8	54,9–66,8	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	*		34,7	29,1–40,3	55,4	49,5–61,3	*		*	
Nunavut	7,7 †	3,4–12,0	44,3	36,3–52,4	40,6	32,6–48,6	*		*	
<b>Canada</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8–1,3</b>	<b>31,7</b>	<b>30,4–32,9</b>	<b>50,5</b>	<b>49,2–51,8</b>	<b>12,9</b>	<b>12,0–13,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4–4,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Nombre de consultations pour les soins prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	1–4		5–10		11–15		16–20		≥21	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<i>Âge de la mère (années)</i>										
15–19	3,8 †	1,5–6,1	25,1	19,9–30,2	45,7	39,3–52,1	17,0	12,2–21,8	8,5 †	4,9–12,0
20–24	1,3 †	0,5–2,1	32,1	28,7–35,5	47,3	43,6–50,9	13,7	11,1–16,3	5,7	4,2–7,2
25–29	1,0 †	0,5–1,4	31,9	29,8–34,1	51,4	49,1–53,6	12,6	11,1–14,1	3,1	2,3–3,9
30–34	0,8 †	0,4–1,2	32,8	30,6–34,9	50,4	48,1–52,7	12,3	10,7–13,9	3,7	2,8–4,5
35–39	0,6 ‡	0,0–1,1	29,8	26,7–33,0	52,9	49,4–56,5	12,9	10,7–15,1	3,8 †	2,5–5,1
≥40	3,2 ‡	0,4–6,0	25,9	19,4–32,3	50,6	42,8–58,4	15,4 †	9,7–21,1	4,9 ‡	1,4–8,5
<i>Niveau de scolarité de la mère</i>										
Études secondaires non terminées	2,9 †	1,4–4,3	33,5	29,0–38,0	46,0	41,1–50,8	12,4	9,4–15,5	5,2 †	3,2–7,3
Diplôme d'études secondaires	1,5 †	0,9–2,2	28,0	25,5–30,6	51,0	48,1–53,9	14,3	12,3–16,3	5,1	3,9–6,3
Diplôme d'études postsecondaires	0,9 †	0,5–1,3	33,1	31,0–35,2	48,1	45,9–50,2	14,0	12,4–15,5	4,0	3,2–4,8
Diplôme universitaire	0,6 †	0,2–0,9	31,4	29,3–33,4	53,8	51,6–56,0	11,3	9,8–12,7	3,0	2,3–3,8
<i>Parité</i>										
Primipares	1,0 †	0,6–1,3	31,4	29,6–33,3	49,8	47,8–51,7	14,0	12,6–15,4	3,9	3,1–4,6
Multipares	1,1 †	0,8–1,5	31,7	30,0–33,4	51,3	49,4–53,1	12,0	10,8–13,1	4,0	3,3–4,6
<i>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</i>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	1,7 †	0,9–2,4	32,8	30,1–35,5	47,7	44,8–50,7	12,9	11,0–14,9	4,9	3,6–6,1
Au-dessus du SFR	0,8 †	0,5–1,1	31,6	30,1–33,1	51,2	49,6–52,7	12,6	11,6–13,6	3,8	3,3–4,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8–1,3</b>	<b>31,7</b>	<b>30,4–32,9</b>	<b>50,5</b>	<b>49,2–51,8</b>	<b>12,9</b>	<b>12,0–13,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4–4,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

## Nombre moyen de consultations pour les soins prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

Province/territoire	Moyenne	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	14,6	13,9–15,2
Île-du-Prince-Édouard	13,5	13,1–13,9
Nouvelle-Écosse	14,8	14,2–15,4
Nouveau-Brunswick	13,5	13,0–14,0
Québec	11,9	11,7–12,1
Ontario	13,4	13,2–13,6
Manitoba	12,3	11,9–12,8
Saskatchewan	12,4	12,0–12,9
Alberta	13,0	12,6–13,3
Colombie-Britannique	13,1	12,7–13,5
Yukon	12,1	11,7–12,5
Territoires du Nord-Ouest	11,3	10,9–11,7
Nunavut	10,6	9,9–11,3
<b>Canada</b>	<b>12,9</b>	<b>12,8–13,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Nombre moyen de consultations pour les soins prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Moyenne	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	13,9	13,0–14,7
20–24	13,0	12,7–13,4
25–29	12,9	12,7–13,1
30–34	12,8	12,6–13,0
35–39	13,0	12,7–13,3
≥40	13,2	12,4–13,9
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	12,8	12,3–13,3
Diplôme d'études secondaires	13,2	12,9–13,5
Diplôme d'études postsecondaires	13,0	12,7–13,2
Diplôme universitaire	12,8	12,6–13,0
<b>Parité</b>		
Primipares	13,0	12,8–13,2
Multipares	12,8	12,7–13,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	12,9	12,6–13,2
Au-dessus du SFR	12,9	12,8–13,1
<b>Toutes les femmes</b>	<b>12,9</b>	<b>12,8–13,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Nombre moyen de semaines de gestation à la première consultation pour les soins prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

<b>Province/territoire</b>	<b>Moyenne</b>	<b>IC 95 %</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	6,6	6,3–7,0
Île-du-Prince-Édouard	8,9	8,6–9,2
Nouvelle-Écosse	7,2	6,8–7,5
Nouveau-Brunswick	8,2	7,8–8,6
Québec	9,2	9,0–9,4
Ontario	7,0	6,8–7,2
Manitoba	7,8	7,4–8,2
Saskatchewan	6,6	6,3–6,9
Alberta	7,2	6,9–7,4
Colombie-Britannique	6,4	6,2–6,7
Yukon	6,6	6,2–7,1
Territoires du Nord-Ouest	7,8	7,3–8,2
Nunavut	8,5	7,8–9,2
<b>Canada</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4–7,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Nombre moyen de semaines de gestation à la première consultation pour les soins prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Moyenne	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	9,2	8,6–9,8
20–24	7,8	7,5–8,1
25–29	7,5	7,3–7,7
30–34	7,4	7,2–7,6
35–39	7,4	7,1–7,6
≥40	7,1	6,6–7,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	8,8	8,3–9,2
Diplôme d'études secondaires	7,6	7,4–7,9
Diplôme d'études postsecondaires	7,5	7,3–7,6
Diplôme universitaire	7,2	7,1–7,4
<b>Parité</b>		
Primipares	7,3	7,1–7,4
Multipares	7,7	7,6–7,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	8,1	7,8–8,4
Au-dessus du SFR	7,3	7,2–7,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4–7,6</b>

IC – Intervalle de confiance.



**Proportion de femmes ayant obtenu une consultation pour les soins prénataux avant dix semaines de gestation, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	85,5	82,0–89,0
Île-du-Prince-Édouard	57,9	53,9–62,0
Nouvelle-Écosse	81,2	77,5–85,0
Nouveau-Brunswick	66,3	61,3–71,2
Québec	53,6	50,9–56,4
Ontario	80,8	79,1–82,5
Manitoba	70,9	66,5–75,4
Saskatchewan	82,9	79,1–86,6
Alberta	78,4	75,3–81,5
Colombie-Britannique	87,4	84,9–89,8
Yukon	74,4	68,8–79,9
Territoires du Nord-Ouest	71,9	66,8–77,1
Nunavut	65,0	57,7–72,2
<b>Canada</b>	<b>74,1</b>	<b>73,1–75,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant obtenu une consultation pour les soins prénataux avant dix semaines de gestation, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	63,6	57,7–69,6
20–24	72,6	69,4–75,8
25–29	74,0	72,0–76,0
30–34	75,2	73,3–77,1
35–39	75,4	72,5–78,4
≥40	75,9	69,7–82,2
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	66,5	62,3–70,7
Diplôme d'études secondaires	73,8	71,3–76,2
Diplôme d'études postsecondaires	73,7	71,8–75,5
Diplôme universitaire	76,4	74,5–78,3
<b>Parité</b>		
Primipares	77,3	75,8–78,9
Multipares	71,6	70,1–73,1
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	71,3	68,7–73,9
Au-dessus du SFR	75,2	73,9–76,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>74,1</b>	<b>73,1–75,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont amorcé les soins prénataux avant ou après le premier trimestre (à 14 semaines de gestation ou plus), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 3.1]

Province/territoire	À moins de 14 semaines de gestation		À 14 semaines de gestation ou plus	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	96,7	95,0–98,4	3,3 †	1,6–5,0
Île-du-Prince-Édouard	91,3	88,9–93,8	8,7	6,2–11,1
Nouvelle-Écosse	94,4	92,2–96,7	5,6 †	3,3–7,8
Nouveau-Brunswick	93,5	91,1–96,0	6,5 †	4,0–8,9
Québec	93,2	91,9–94,6	6,8	5,4–8,1
Ontario	95,4	94,5–96,4	4,6	3,6–5,5
Manitoba	92,2	89,5–94,8	7,8 †	5,2–10,5
Saskatchewan	97,0	95,3–98,7	3,0 †	1,3–4,7
Alberta	94,9	93,2–96,5	5,1	3,5–6,8
Colombie-Britannique	96,9	95,6–98,2	3,1 †	1,8–4,4
Yukon	98,4	96,8–99,9	*	
Territoires du Nord-Ouest	92,9	89,9–95,8	7,1 †	4,2–10,1
Nunavut	82,7	77,0–88,4	17,3 †	11,7–23,0
<b>Canada</b>	<b>94,9</b>	<b>94,3–95,4</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6–5,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes qui ont amorcé les soins prénataux avant ou après le premier trimestre (à 14 semaines de gestation ou plus), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 3.2]

	À moins de 14 semaines de gestation		À 14 semaines de gestation ou plus	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>				
15–19	84,7	80,5–88,9	15,3	11,1–19,5
20–24	92,3	90,5–94,1	7,7	5,9–9,5
25–29	95,3	94,3–96,3	4,7	3,7–5,7
30–34	95,9	95,0–96,8	4,1	3,2–5,0
35–39	95,8	94,4–97,2	4,2 †	2,8–5,6
≥40	95,2	92,2–98,2	4,8 †	1,8–7,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>				
Études secondaires non terminées	87,2	84,4–90,1	12,8	9,9–15,6
Diplôme d'études secondaires	93,0	91,6–94,4	7,0	5,6–8,4
Diplôme d'études postsecondaires	95,7	94,8–96,6	4,3	3,4–5,2
Diplôme universitaire	96,6	95,8–97,5	3,4	2,5–4,2
<b>Parité</b>				
Primipares	95,3	94,5–96,1	4,7	3,9–5,5
Multipares	94,5	93,7–95,3	5,5	4,7–6,3
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	90,7	89,0–92,4	9,3	7,6–11,0
Au-dessus du SFR	96,2	95,6–96,7	3,8	3,3–4,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>94,9</b>	<b>94,3–95,4</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6–5,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes n'ayant pas obtenu les soins prénataux aussi rapidement qu'elles le voulaient, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 3.3]

Province/territoire	Aussi rapidement qu'elles le voulaient		Pas aussi rapidement qu'elles le voulaient	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	95,3	93,2–97,5	4,7 †	2,5–6,8
Île-du-Prince-Édouard	85,8	83,1–88,6	14,2	11,4–16,9
Nouvelle-Écosse	93,0	90,6–95,4	7,0 †	4,6–9,4
Nouveau-Brunswick	89,8	86,8–92,7	10,2	7,3–13,2
Québec	86,5	84,7–88,4	13,5	11,6–15,3
Ontario	88,9	87,4–90,3	11,1	9,7–12,6
Manitoba	81,4	77,6–85,2	18,6	14,8–22,4
Saskatchewan	92,7	90,2–95,2	7,3 †	4,8–9,8
Alberta	88,3	86,0–90,7	11,7	9,3–14,0
Colombie-Britannique	92,7	90,7–94,7	7,3	5,3–9,3
Yukon	93,6	90,7–96,5	*	
Territoires du Nord-Ouest	73,6	68,6–78,6	26,4	21,4–31,4
Nunavut	90,8	86,4–95,2	9,2 †	4,8–13,6
<b>Canada</b>	<b>88,7</b>	<b>87,9–89,5</b>	<b>11,3</b>	<b>10,5–12,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes n'ayant pas obtenu les soins prénataux aussi rapidement qu'elles le voulaient, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 3.4]

	Aussi rapidement qu'elles le voulaient		Pas aussi rapidement qu'elles le voulaient	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>				
15–19	82,4	77,7–87,1	17,6	12,9–22,3
20–24	87,2	84,9–89,5	12,8	10,5–15,1
25–29	89,0	87,6–90,4	11,0	9,6–12,4
30–34	89,0	87,6–90,5	11,0	9,5–12,4
35–39	90,2	88,1–92,3	9,8	7,7–11,9
≥40	89,0	84,4–93,6	11,0 †	6,4–15,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>				
Études secondaires non terminées	87,1	84,3–89,9	12,9	10,1–15,7
Diplôme d'études secondaires	88,4	86,5–90,2	11,6	9,8–13,5
Diplôme d'études postsecondaires	89,4	88,0–90,7	10,6	9,3–12,0
Diplôme universitaire	88,6	87,1–90,0	11,4	10,0–12,9
<b>Parité</b>				
Primipares	87,1	85,7–88,4	12,9	11,6–14,3
Multipares	90,1	89,1–91,1	9,9	8,9–10,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	86,5	84,5–88,5	13,5	11,5–15,5
Au-dessus du SFR	89,6	88,7–90,5	10,4	9,5–11,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>88,7</b>	<b>87,9–89,5</b>	<b>11,3</b>	<b>10,5–12,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Répartition des raisons pour ne pas avoir obtenu les soins prénataux aussi rapidement qu'elles le voulaient, pour les femmes n'ayant pas obtenu les soins prénataux aussi rapidement qu'elles le voulaient, Canada, 2006–2007 §**

Quelles sont les raisons qui vous ont empêchée de recevoir des soins prénataux aussi rapidement que vous le vouliez?	%	IC 95 %
Le médecin/professionnel de la santé n'était pas disponible	53,0	49,0–56,9
Le médecin/professionnel de la santé n'a pas voulu commencer à leur dispenser des soins plus tôt	30,2	26,7–33,7
La répondante ne savait pas qu'elle était enceinte	7,6	5,6–9,6
La répondante n'avait personne pour prendre soin des enfants	*	
La répondante était trop occupée	1,7 †	0,7–2,7
La répondante n'avait pas de moyen de transport	1,1 ‡	0,4–1,9
La répondante ne pouvait pas prendre congé de son emploi	*	
Autre	9,7	7,3–12,0

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Les femmes pouvaient choisir plus d'une réponse.

## 4 Cours prénataux

### Proportion de femmes ayant suivi des cours prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 4.1]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	46,7	41,8–51,6
Île-du-Prince-Édouard	32,2	28,2–36,1
Nouvelle-Écosse	33,7	29,2–38,2
Nouveau-Brunswick	38,7	33,8–43,7
Québec	36,1	34,1–38,2
Ontario	28,4	26,8–30,1
Manitoba	32,1	27,4–36,7
Saskatchewan	36,4	31,9–41,0
Alberta	33,4	29,8–37,0
Colombie-Britannique	35,5	32,9–38,1
Yukon	39,0	33,1–45,0
Territoires du Nord-Ouest	37,4	31,9–43,0
Nunavut	34,5	27,6–41,5
<b>Canada</b>	<b>32,7</b>	<b>31,7–33,7</b>

IC – Intervalle de confiance.



**Proportion de femmes ayant suivi des cours prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 4.2]

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	49,5	43,1–55,8
20–24	34,1	30,8–37,3
25–29	37,6	35,7–39,6
30–34	30,2	28,6–31,9
35–39	24,6	22,0–27,2
≥40	25,5	19,2–31,9
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	22,8	19,5–26,2
Diplôme d'études secondaires	24,9	22,5–27,4
Diplôme d'études postsecondaires	32,6	30,8–34,5
Diplôme universitaire	39,3	37,3–41,2
<b>Parité</b>		
Primipares	65,6	63,8–67,4
Multipares	6,0	5,2–6,8
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	24,1	21,6–26,7
Au-dessus du SFR	34,7	33,5–35,9
<b>Toutes les femmes</b>	<b>32,7</b>	<b>31,7–33,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

## Répartition du lieu où les femmes ont suivi les cours prénataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 4.3]

Province/territoire	Hôpital		Clinique médicale		Centre communautaire		À titre privé		Autre	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	53,6	47,7–59,5	12,7 †	7,9–17,5	30,3	24,3–36,3	*		*	
Île-du-Prince-Édouard	25,6	19,3–31,9	38,7	31,7–45,6	28,8	22,2–35,3	*		*	
Nouvelle-Écosse	29,5	22,2–36,7	19,7 †	13,2–26,2	47,5	39,7–55,2	*		*	
Nouveau-Brunswick	70,6	63,4–77,8	*		19,5 †	13,1–25,9	5,0 ‡	1,6–8,4	*	
Québec	9,3	6,6–12,0	44,5	40,1–49,0	20,0	16,4–23,6	13,4	10,5–16,4	12,8	9,8–15,8
Ontario	39,6	35,4–43,7	15,7	12,7–18,7	28,2	24,5–32,0	12,0	9,3–14,6	4,6 †	2,8–6,3
Manitoba	23,0	15,6–30,3	35,2	26,7–43,6	28,8	21,0–36,5	10,5 †	5,1–16,0	*	
Saskatchewan	20,8 †	13,9–27,7	35,5	27,9–43,1	39,5	31,6–47,5	*		*	
Alberta	53,5	47,0–60,1	25,9	20,1–31,6	14,8	10,2–19,4	5,5 †	2,6–8,4	*	
Colombie-Britannique	34,8	28,8–40,9	25,2	19,8–30,5	21,6	16,3–26,9	13,0 †	8,8–17,2	5,4 †	2,7–8,1
Yukon	*		91,5	86,3–96,7	*		*		*	
Territoires du Nord-Ouest	20,4 †	13,2–27,6	*		63,3	54,4–72,3	*		*	
Nunavut	*		30,2 †	17,7–42,7	46,6	33,6–59,6	*		*	
<b>Canada</b>	<b>32,0</b>	<b>29,9–34,1</b>	<b>27,1</b>	<b>25,1–29,0</b>	<b>24,3</b>	<b>22,4–26,2</b>	<b>10,6</b>	<b>9,2–12,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0–7,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition du lieu où les femmes ont suivi les cours prénataux, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Hôpital		Clinique médicale		Centre communautaire		À titre privé		Autre	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>										
15–19	17,7 †	11,3–24,1	30,1	22,5–37,7	32,6	24,9–40,3	7,0 †	2,5–11,5	12,7 †	6,9–18,4
20–24	24,8	19,5–30,1	32,8	27,2–38,4	33,2	27,6–38,8	4,9 †	2,2–7,7	4,2 †	1,7–6,7
25–29	33,0	29,6–36,4	29,4	26,1–32,7	21,8	18,8–24,8	9,0	6,9–11,1	6,8	5,0–8,7
30–34	33,4	29,7–37,1	24,0	20,6–27,3	22,8	19,5–26,1	14,2	11,2–17,1	5,6 †	3,7–7,6
35–39	39,1	32,5–45,8	20,2	15,1–25,2	22,8	17,4–28,2	12,9 †	8,2–17,5	5,1 †	2,1–8,0
≥40	32,6 †	18,2–46,9	23,1 †	10,6–35,7	27,2 †	13,9–40,4	16,3 ‡	4,5–28,2	*	
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>										
Études secondaires non terminées	21,1 †	14,1–28,0	25,5	17,9–33,0	41,3	33,0–49,5	3,0 ‡	0,2–5,7	9,2 †	4,0–14,4
Diplôme d'études secondaires	25,6	21,0–30,3	32,5	27,4–37,7	31,0	25,8–36,2	4,9 †	2,5–7,3	5,9 †	3,2–8,7
Diplôme d'études postsecondaires	30,9	27,5–34,3	31,5	28,3–34,8	21,9	18,9–24,9	10,0	7,8–12,2	5,7	3,9–7,4
Diplôme universitaire	36,6	33,3–39,9	21,6	18,8–24,4	21,8	19,0–24,6	14,3	11,7–16,8	5,7	4,1–7,3
<b>Parité</b>										
Primipares	32,8	30,6–35,1	27,6	25,5–29,6	23,2	21,2–25,2	10,6	9,1–12,1	5,8	4,7–6,9
Multipares	24,1	18,1–30,0	22,7	17,2–28,1	34,8	28,6–41,1	10,8 †	6,8–14,9	7,6 †	3,9–11,3
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	25,6	20,4–30,8	25,2	20,0–30,4	35,9	30,3–41,5	6,9 †	3,8–9,9	6,4 †	3,4–9,4
Au-dessus du SFR	33,7	31,3–36,2	27,6	25,3–29,8	21,3	19,2–23,3	11,7	10,1–13,4	5,7	4,6–6,9
<b>Toutes les femmes</b>	<b>32,0</b>	<b>29,9–34,1</b>	<b>27,1</b>	<b>25,1–29,0</b>	<b>24,3</b>	<b>22,4–26,2</b>	<b>10,6</b>	<b>9,2–12,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0–7,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

## 5 Information prénatale

### Répartition des sources d'information prénatale considérées par les femmes comme étant les plus utiles pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

(Partie 1 de 2)

[Contient les données pour Figure 5.1]

Province/territoire	Professionnel de la santé §		Livres		Grossesse précédente		Famille/amis	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	31,9	27,2–36,6	21,8	17,6–26,0	10,6	7,5–13,8	10,1	7,0–13,2
Île-du-Prince-Édouard	33,9	30,0–37,7	20,7	17,4–24,1	11,4	8,8–14,0	12,1	9,3–14,9
Nouvelle-Écosse	35,3	30,9–39,7	23,7	19,7–27,7	12,1	8,9–15,3	13,1	9,9–16,3
Nouveau-Brunswick	30,9	26,2–35,6	21,8	17,5–26,0	15,2	11,5–18,9	8,5 †	5,7–11,3
Québec	24,3	22,0–26,5	22,1	19,9–24,3	24,9	22,9–26,9	9,2	7,7–10,7
Ontario	39,1	37,0–41,2	20,9	19,2–22,6	12,7	11,3–14,1	9,5	8,2–10,7
Manitoba	29,7	25,1–34,3	24,0	19,9–28,2	17,2	13,6–20,8	13,0	9,8–16,3
Saskatchewan	29,1	24,6–33,7	21,0	17,1–25,0	18,8	14,8–22,8	11,9	8,7–15,1
Alberta	26,2	22,9–29,5	25,0	21,9–28,2	19,1	16,2–22,0	9,7	7,5–12,0
Colombie-Britannique	32,5	28,8–36,2	24,5	21,2–27,8	14,9	12,4–17,5	11,6	9,1–14,0
Yukon	31,9	26,3–37,5	17,7	13,1–22,4	27,5	22,3–32,7	*	
Territoires du Nord-Ouest	34,7	29,3–40,1	13,2	9,4–17,1	23,2	18,2–28,2	19,9	15,3–24,6
Nunavut	35,0	28,1–41,9	7,8 †	4,1–11,6	18,6	13,1–24,1	32,4	25,6–39,2
<b>Canada</b>	<b>32,2</b>	<b>31,0–33,4</b>	<b>22,3</b>	<b>21,3–23,3</b>	<b>17,1</b>	<b>16,1–18,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,3–10,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Obstétricien/gynécologue, médecin de famille/médecin généraliste, sage-femme et infirmière/infirmière praticienne.

\*\* Inclut les doulas.

## Répartition des sources d'information prénatale considérées par les femmes comme étant les plus utiles pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

(Partie 2 de 2)

[Contient les données pour Figure 5.1]

Province/territoire	Internet		Cours prénataux		Autre **	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	7,5 †	4,9–10,2	10,3	7,3–13,4	7,7 †	5,2–10,2
Île-du-Prince-Édouard	6,6	4,5–8,7	9,3	6,8–11,7	6,1 †	4,1–8,1
Nouvelle-Écosse	6,9 †	4,6–9,2	5,8 †	3,7–8,0	3,0 †	1,4–4,7
Nouveau-Brunswick	10,5	7,5–13,5	10,8	7,5–14,1	2,3 ‡	0,8–3,8
Québec	5,6	4,3–6,9	9,0	7,5–10,5	5,0	3,8–6,1
Ontario	9,4	8,1–10,7	5,1	4,1–6,0	3,3	2,5–4,0
Manitoba	9,5	6,6–12,4	4,4 †	2,4–6,5	2,2 ‡	0,7–3,6
Saskatchewan	6,4 †	4,1–8,7	9,1	6,4–11,9	3,6 †	1,7–5,4
Alberta	7,0	5,1–8,9	8,3	6,2–10,3	4,7 †	3,0–6,4
Colombie-Britannique	6,9	4,9–8,9	5,8	4,1–7,5	3,8 †	2,3–5,2
Yukon	9,8 †	6,4–13,1	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	5,4 †	2,9–7,9	*		*	
Nunavut	*		*		*	
<b>Canada</b>	<b>7,7</b>	<b>7,0–8,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2–7,4</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4–4,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Obstétricien/gynécologue, médecin de famille/médecin généraliste, sage-femme et infirmière/infirmière praticienne.

\*\* Inclut les doulas.

**Répartition des sources d'information prénatale considérées par les femmes comme étant les plus utiles pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

(Partie 1 de 2)

[Contient les données pour Figure 5.2 et Figure 5.3]

	Professionnel de la santé §		Livres		Grossesse précédente		Famille/amis	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	30,0	24,3–35,6	17,4	12,9–21,9	2,2 ‡	0,7–3,7	31,0	25,4–36,7
20–24	27,6	24,3–30,9	23,1	20,2–26,0	8,6	6,8–10,5	19,1	16,2–21,9
25–29	30,6	28,5–32,7	23,2	21,3–25,1	16,1	14,5–17,7	9,9	8,6–11,3
30–34	32,6	30,5–34,6	23,0	21,2–24,8	20,1	18,5–21,8	7,2	6,0–8,3
35–39	38,3	34,9–41,7	18,8	16,0–21,5	21,7	18,8–24,5	5,6	4,1–7,1
≥40	38,0	30,6–45,4	22,7	16,4–29,1	20,2	13,8–26,7	5,2 †	1,9–8,5
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	35,1	30,5–39,6	13,2	10,2–16,3	19,0	15,3–22,8	18,4	14,9–22,0
Diplôme d'études secondaires	33,5	30,8–36,2	21,4	19,0–23,8	17,2	15,0–19,3	11,6	9,7–13,4
Diplôme d'études postsecondaires	32,7	30,7–34,7	22,1	20,4–23,8	17,4	15,9–19,0	9,3	8,1–10,5
Diplôme universitaire	30,7	28,6–32,7	24,8	22,9–26,7	16,1	14,6–17,6	7,9	6,8–9,1
<b>Parité</b>								
Primipares	26,7	25,0–28,3	29,3	27,6–30,9	0,3 ‡	0,1–0,5	16,4	15,0–17,7
Multipares	36,7	35,1–38,4	16,5	15,2–17,7	30,7	29,2–32,3	4,8	4,1–5,6
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	33,7	30,9–36,5	16,3	14,1–18,5	20,4	18,0–22,8	12,6	10,6–14,5
Au-dessus du SFR	32,2	30,8–33,5	24,1	22,8–25,3	16,4	15,4–17,5	8,2	7,4–9,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>32,2</b>	<b>31,0–33,4</b>	<b>22,3</b>	<b>21,3–23,3</b>	<b>17,1</b>	<b>16,1–18,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,3–10,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Obstétricien/gynécologue, médecin de famille/médecin généraliste, sage-femme et infirmière/infirmière praticienne.

\*\* Inclut les doulas.

**Répartition des sources d'information prénatale considérées par les femmes comme étant les plus utiles pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

(Partie 2 de 2)

[Contient les données pour Figure 5.2 et Figure 5.3]

	Internet		Cours prénataux		Autre **	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	3,8 ‡	1,2–6,4	8,3 †	5,1–11,5	7,3 †	4,3–10,3
20–24	5,9	4,2–7,6	9,9	7,9–11,9	5,8	4,0–7,5
25–29	8,7	7,4–10,1	8,2	7,0–9,4	3,3	2,5–4,1
30–34	7,8	6,6–9,0	5,5	4,5–6,6	3,7	2,9–4,6
35–39	7,7	5,8–9,5	4,6	3,2–5,9	3,5 †	2,2–4,7
≥40	8,3 †	4,3–12,2	*		3,2 ‡	0,6–5,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	2,7 †	1,3–4,2	6,5 †	4,3–8,7	5,0 †	3,0–7,0
Diplôme d'études secondaires	7,9	6,3–9,5	5,2	4,0–6,5	3,2	2,2–4,2
Diplôme d'études postsecondaires	6,9	5,9–8,0	7,8	6,7–8,9	3,8	3,0–4,6
Diplôme universitaire	9,6	8,3–10,9	6,8	5,7–7,9	4,1	3,2–5,0
<b>Parité</b>						
Primipares	9,6	8,4–10,8	13,2	12,0–14,5	4,6	3,8–5,4
Multipares	6,3	5,5–7,1	1,6	1,1–2,0	3,4	2,7–4,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	6,0	4,5–7,4	6,1	4,7–7,5	4,9	3,7–6,2
Au-dessus du SFR	8,4	7,6–9,2	7,1	6,3–7,8	3,6	3,1–4,2
<b>Toutes les femmes</b>	<b>7,7</b>	<b>7,0–8,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2–7,4</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4–4,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Obstétricien/gynécologue, médecin de famille/médecin généraliste, sage-femme et infirmière/infirmière praticienne.

\*\* Inclut les doulas.

**Répartition des sources d'information prénatale considérées par les femmes comme étant les plus utiles pendant la grossesse, chez les femmes qui ont suivi des cours prénataux, Canada, 2006–2007**

Sources d'information	%	IC 95 %
Professionnel de la santé §	26,1	24,2–28,0
Livres	27,2	25,3–29,1
Grossesse précédente	2,2	1,5–2,8
Famille/amis	12,3	10,8–13,7
Internet	8,4	7,1–9,6
Cours prénataux	19,4	17,7–21,1
Autre **	4,6	3,7–5,4

IC – Intervalle de confiance.

§ Obstétricien/gynécologue, médecin de famille/médecin généraliste, sage-femme et infirmière/infirmière praticienne.

\*\* Inclut les doulas.



**Proportion de femmes qui ont déclaré avoir reçu assez d'information sur des sujets liés à la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	Changements physiques		Changements émotifs		Signes pouvant indiquer des complications pendant la grossesse		L'effet de l'usage de médicaments sur le bébé		Tests médicaux et les interventions prénatales qui peuvent être requis	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	93,2	90,7–95,8	88,0	84,7–91,3	87,6	84,1–91,0	96,2	94,3–98,2	94,4	92,0–96,8
Île-du-Prince-Édouard	95,7	94,1–97,3	91,9	89,8–94,1	85,9	83,0–88,8	95,6	93,9–97,4	92,4	90,2–94,6
Nouvelle-Écosse	92,9	90,5–95,3	89,6	86,7–92,5	84,0	80,5–87,5	95,0	92,9–97,0	95,9	94,0–97,8
Nouveau-Brunswick	92,9	90,4–95,5	87,9	84,7–91,2	84,6	80,9–88,4	94,4	92,1–96,7	93,2	90,8–95,6
Québec	92,0	90,4–93,5	87,8	86,0–89,6	81,0	78,9–83,1	91,9	90,3–93,4	89,0	87,4–90,7
Ontario	92,6	91,4–93,8	89,9	88,6–91,2	84,6	82,9–86,2	95,1	94,1–96,0	93,0	91,9–94,2
Manitoba	94,0	91,6–96,4	90,0	87,1–92,9	86,4	83,1–89,6	94,9	92,8–97,1	94,0	91,7–96,3
Saskatchewan	94,4	92,1–96,8	90,1	87,2–93,1	84,3	80,8–87,8	95,6	93,6–97,6	90,2	87,3–93,1
Alberta	93,7	92,0–95,4	91,2	89,1–93,3	86,1	83,6–88,6	93,7	92,0–95,5	91,9	89,9–93,9
Colombie-Britannique	93,5	91,6–95,5	89,6	87,3–92,0	82,9	80,1–85,8	93,4	91,5–95,3	92,6	90,7–94,5
Yukon	96,5	94,1–98,8	96,7	94,5–98,8	88,5	84,8–92,2	94,7	92,0–97,4	91,4	87,7–95,0
Territoires du Nord-Ouest	90,3	86,9–93,6	87,3	83,5–91,1	79,0	74,4–83,6	92,8	89,9–95,8	83,4	79,0–87,7
Nunavut	74,6	68,4–80,8	71,1	64,6–77,6	65,2	58,2–72,1	73,3	67,2–79,4	72,3	65,7–78,9
<b>Canada</b>	<b>92,8</b>	<b>92,1–93,5</b>	<b>89,4</b>	<b>88,7–90,2</b>	<b>83,7</b>	<b>82,8–84,7</b>	<b>93,9</b>	<b>93,3–94,5</b>	<b>91,8</b>	<b>91,2–92,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont déclaré avoir reçu assez d'information sur des sujets liés à la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Changements physiques		Changements émotifs		Signes pouvant indiquer des complications pendant la grossesse		L'effet de l'usage de médicaments sur le bébé		Tests médicaux et les interventions prénatales qui peuvent être requis	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>										
15–19	85,8	81,3–90,3	83,2	78,5–87,8	79,8	74,8–84,7	91,1	87,9–94,3	85,3	81,0–89,5
20–24	89,2	86,9–91,5	86,5	84,1–89,0	80,1	77,2–83,0	91,9	89,9–93,9	87,1	84,7–89,5
25–29	93,9	92,8–95,0	90,3	89,0–91,5	84,2	82,6–85,8	94,2	93,1–95,2	91,6	90,3–92,8
30–34	93,0	91,9–94,1	89,8	88,4–91,2	83,8	82,1–85,5	94,7	93,6–95,7	93,3	92,1–94,4
35–39	93,9	92,2–95,6	90,7	88,7–92,7	85,6	83,2–88,1	93,6	91,9–95,4	94,2	92,5–95,8
≥40	96,5	93,5–99,5	89,8	85,1–94,4	89,5	84,5–94,5	96,6	93,6–99,5	96,7	94,1–99,4
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>										
Études secondaires non terminées	86,9	83,7–90,1	86,0	83,0–89,1	79,5	75,8–83,1	91,1	88,6–93,6	86,9	83,9–89,9
Diplôme d'études secondaires	91,9	90,4–93,5	87,8	85,9–89,8	79,8	77,5–82,2	93,5	92,0–94,9	89,7	87,9–91,5
Diplôme d'études postsecondaires	93,8	92,7–94,8	90,7	89,5–91,9	85,1	83,6–86,7	94,2	93,2–95,2	92,8	91,7–93,9
Diplôme universitaire	93,7	92,7–94,8	90,4	89,1–91,8	85,6	84,1–87,2	94,7	93,7–95,7	93,4	92,3–94,5
<b>Parité</b>										
Primipares	91,3	90,1–92,4	87,6	86,3–88,8	81,8	80,3–83,3	93,7	92,8–94,6	90,9	89,8–92,1
Multipares	94,1	93,2–94,9	91,0	90,1–92,0	85,4	84,2–86,6	94,1	93,2–94,9	92,6	91,7–93,5
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	88,9	86,9–90,8	85,1	82,9–87,3	79,0	76,5–81,5	91,5	89,9–93,2	88,7	86,7–90,6
Au-dessus du SFR	94,6	94,0–95,3	91,6	90,8–92,4	85,5	84,5–86,6	94,9	94,2–95,6	93,3	92,5–94,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>92,8</b>	<b>92,1–93,5</b>	<b>89,4</b>	<b>88,7–90,2</b>	<b>83,7</b>	<b>82,8–84,7</b>	<b>93,9</b>	<b>93,3–94,5</b>	<b>91,8</b>	<b>91,2–92,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont déclaré ne pas avoir reçu assez d'information sur des sujets liés à la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	Changements physiques		Changements émotifs		Signes pouvant indiquer des complications pendant la grossesse		L'effet de l'usage de médicaments sur le bébé		Tests médicaux et les interventions prénatales qui peuvent être requis	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	6,8 †	4,2–9,3	12,0	8,8–15,3	12,4	9,0–15,9	3,8 †	1,8–5,7	5,6 †	3,2–8,0
Île-du-Prince-Édouard	4,3 †	2,7–5,9	8,1	5,9–10,2	14,1	11,2–17,0	4,4 †	2,6–6,1	7,6	5,4–9,8
Nouvelle-Écosse	7,1 †	4,7–9,5	10,4	7,5–13,3	16,0	12,5–19,6	5,0 †	3,0–7,1	4,1 †	2,2–6,0
Nouveau-Brunswick	7,1 †	4,5–9,6	12,1	8,8–15,3	15,4	11,6–19,1	5,6 †	3,3–7,9	6,8 †	4,4–9,2
Québec	8,0	6,5–9,6	12,2	10,4–14,0	19,0	16,9–21,1	8,1	6,6–9,7	11,0	9,3–12,7
Ontario	7,4	6,2–8,6	10,1	8,8–11,4	15,4	13,8–17,1	5,0	4,0–5,9	7,0	5,8–8,1
Manitoba	6,0 †	3,6–8,4	10,0	7,1–12,9	13,6	10,4–16,9	5,1 †	2,9–7,2	6,0 †	3,7–8,3
Saskatchewan	5,6 †	3,2–7,9	9,9	7,0–12,8	15,7	12,2–19,2	4,4 †	2,4–6,4	9,8	7,0–12,7
Alberta	6,3	4,6–8,0	8,8	6,7–10,9	13,9	11,4–16,4	6,3	4,6–8,0	8,1	6,1–10,1
Colombie-Britannique	6,5	4,5–8,4	10,4	8,0–12,7	17,1	14,2–19,9	6,6	4,8–8,5	7,4	5,5–9,3
Yukon	*		*		11,5 †	7,8–15,2	*		8,6 †	5,0–12,3
Territoires du Nord-Ouest	9,7 †	6,4–13,1	12,7	8,9–16,5	21,0	16,4–25,7	7,2 †	4,2–10,1	16,6	12,3–21,0
Nunavut	25,4	19,2–31,6	28,9	22,5–35,4	34,8	27,9–41,8	26,7	20,6–32,8	27,7	21,1–34,3
<b>Canada</b>	<b>7,2</b>	<b>6,5–7,9</b>	<b>10,6</b>	<b>9,8–11,3</b>	<b>16,3</b>	<b>15,3–17,2</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5–6,7</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5–8,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes qui ont déclaré ne pas avoir reçu assez d'information sur des sujets liés à la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Changements physiques		Changements émotifs		Signes pouvant indiquer des complications pendant la grossesse		L'effet de l'usage de médicaments sur le bébé		Tests médicaux et les interventions prénatales qui peuvent être requis	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>										
15–19	14,2	9,7–18,7	16,8	12,2–21,5	20,2	15,3–25,2	8,9 †	5,7–12,1	14,7	10,5–19,0
20–24	10,8	8,5–13,1	13,5	11,0–15,9	19,9	17,0–22,8	8,1	6,1–10,1	12,9	10,5–15,3
25–29	6,1	5,0–7,2	9,8	8,5–11,0	15,8	14,2–17,4	5,8	4,8–6,9	8,4	7,2–9,7
30–34	7,0	5,9–8,1	10,2	8,8–11,6	16,2	14,5–17,9	5,3	4,3–6,4	6,7	5,6–7,9
35–39	6,1	4,4–7,8	9,3	7,3–11,3	14,4	11,9–16,8	6,4	4,6–8,1	5,8	4,2–7,5
≥40	3,5 ‡	0,5–6,5	10,2 †	5,6–14,9	10,5 †	5,5–15,5	3,4 ‡	0,5–6,4	3,3 ‡	0,6–5,9
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>										
Études secondaires non terminées	13,1	9,9–16,3	14,0	10,9–17,0	20,5	16,9–24,2	8,9	6,4–11,4	13,1	10,1–16,1
Diplôme d'études secondaires	8,1	6,5–9,6	12,2	10,2–14,1	20,2	17,8–22,5	6,6	5,1–8,0	10,3	8,5–12,1
Diplôme d'études postsecondaires	6,2	5,2–7,3	9,3	8,1–10,5	14,9	13,3–16,4	5,8	4,8–6,8	7,2	6,1–8,3
Diplôme universitaire	6,3	5,2–7,3	9,6	8,2–10,9	14,4	12,8–15,9	5,3	4,3–6,3	6,6	5,5–7,7
<b>Parité</b>										
Primipares	8,7	7,6–9,9	12,4	11,2–13,7	18,2	16,7–19,7	6,3	5,4–7,2	9,1	7,9–10,2
Multipares	5,9	5,1–6,8	9,0	8,0–9,9	14,6	13,4–15,8	5,9	5,1–6,8	7,4	6,5–8,3
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	11,1	9,2–13,1	14,9	12,7–17,1	21,0	18,5–23,5	8,5	6,8–10,1	11,3	9,4–13,3
Au-dessus du SFR	5,4	4,7–6,0	8,4	7,6–9,2	14,5	13,4–15,6	5,1	4,4–5,8	6,7	6,0–7,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>7,2</b>	<b>6,5–7,9</b>	<b>10,6</b>	<b>9,8–11,3</b>	<b>16,3</b>	<b>15,3–17,2</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5–6,7</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5–8,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

## 6 Suppléments d'acide folique

**Proportion de femmes ayant pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse et au cours des trois premiers mois de la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 6.1]

Province/territoire	La prise d'acide folique avant la grossesse		La prise d'acide folique durant la grossesse	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	60,2	55,6–64,9	91,9	89,1–94,7
Île-du-Prince-Édouard	47,9	43,8–52,1	87,5	84,8–90,1
Nouvelle-Écosse	59,8	55,3–64,3	91,3	88,6–94,0
Nouveau-Brunswick	58,0	53,3–62,6	92,3	89,6–94,9
Québec	55,7	53,0–58,4	86,9	85,1–88,8
Ontario	58,5	56,4–60,6	90,6	89,2–91,9
Manitoba	49,4	44,7–54,1	90,5	87,5–93,5
Saskatchewan	55,9	51,1–60,7	90,1	87,1–93,1
Alberta	59,0	55,3–62,6	87,9	85,5–90,4
Colombie-Britannique	61,3	57,5–65,1	93,8	92,0–95,6
Yukon	67,9	62,2–73,5	98,4	97,0–99,9
Territoires du Nord-Ouest	47,1	41,4–52,9	81,6	77,2–86,0
Nunavut	13,6 †	8,5–18,8	52,7	44,8–60,6
<b>Canada</b>	<b>57,7</b>	<b>56,4–59,0</b>	<b>89,7</b>	<b>88,9–90,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse et au cours des trois premiers mois de la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	La prise d'acide folique avant la grossesse		La prise d'acide folique durant la grossesse	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<i>Âge de la mère (années)</i>				
15–19	19,3	14,4–24,2	72,8	67,4–78,3
20–24	33,9	30,5–37,3	83,2	80,5–85,8
25–29	57,6	55,4–59,8	90,4	89,1–91,7
30–34	66,3	64,2–68,4	92,0	90,8–93,2
35–39	67,0	63,8–70,3	92,5	90,7–94,3
≥40	61,2	54,3–68,2	88,4	83,7–93,1
<i>Niveau de scolarité de la mère</i>				
Études secondaires non terminées	29,2	25,0–33,5	73,1	69,1–77,0
Diplôme d'études secondaires	40,4	37,5–43,2	86,0	84,0–88,0
Diplôme d'études postsecondaires	60,0	57,8–62,2	91,0	89,7–92,2
Diplôme universitaire	71,8	69,9–73,7	94,3	93,3–95,3
<i>Parité</i>				
Primipares	59,2	57,3–61,0	91,6	90,5–92,6
Multipares	56,6	54,9–58,4	88,2	87,1–89,4
<i>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</i>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	34,5	31,6–37,5	81,0	78,6–83,3
Au-dessus du SFR	65,2	63,8–66,6	92,5	91,7–93,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>57,7</b>	<b>56,4–59,0</b>	<b>89,7</b>	<b>88,9–90,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse et au cours des trois premiers mois de la grossesse, chez les femmes ayant déclaré avoir pris des suppléments, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	La prise d'acide folique quotidiennement avant la grossesse		La prise d'acide folique quotidiennement durant la grossesse	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	94,7	91,8–97,5	94,6	92,3–97,0
Île-du-Prince-Édouard	88,6	84,8–92,4	92,5	90,2–94,9
Nouvelle-Écosse	91,2	87,7–94,7	92,0	89,3–94,7
Nouveau-Brunswick	89,9	86,2–93,6	91,6	88,7–94,4
Québec	89,0	86,7–91,2	89,5	87,7–91,3
Ontario	91,4	89,8–93,0	93,6	92,4–94,7
Manitoba	85,2	80,3–90,1	92,5	89,7–95,3
Saskatchewan	91,8	88,2–95,3	93,8	91,4–96,3
Alberta	90,4	87,6–93,2	92,2	90,1–94,4
Colombie-Britannique	87,6	84,5–90,6	92,4	90,3–94,5
Yukon	87,1	82,1–92,1	93,4	90,3–96,4
Territoires du Nord-Ouest	89,9	85,0–94,8	92,7	89,5–96,0
Nunavut	81,1	65,5–96,6	75,1	65,8–84,3
<b>Canada</b>	<b>90,0</b>	<b>89,1–91,0</b>	<b>92,2</b>	<b>91,5–92,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse et au cours des trois premiers mois de la grossesse, chez les femmes ayant déclaré avoir pris des suppléments, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	La prise d'acide folique quotidiennement avant la grossesse		La prise d'acide folique quotidiennement durant la grossesse	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>				
15–19	76,6	64,5–88,7	88,0	83,4–92,5
20–24	86,5	82,3–90,7	90,6	88,3–93,0
25–29	89,9	88,2–91,7	91,7	90,4–93,0
30–34	91,5	90,0–93,0	93,2	92,0–94,3
35–39	89,2	86,7–91,8	92,2	90,4–94,1
≥40	89,3	83,5–95,2	95,1	91,8–98,5
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>				
Études secondaires non terminées	84,8	78,7–90,9	87,7	84,3–91,1
Diplôme d'études secondaires	87,5	84,6–90,4	90,8	89,1–92,6
Diplôme d'études postsecondaires	91,2	89,6–92,8	92,0	90,8–93,3
Diplôme universitaire	90,3	88,9–91,8	93,7	92,6–94,8
<b>Parité</b>				
Primipares	93,1	91,9–94,3	94,7	93,7–95,6
Multipares	87,5	86,0–89,0	90,1	89,0–91,1
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	83,5	79,6–87,3	90,0	88,0–92,0
Au-dessus du SFR	91,0	90,0–92,1	92,8	92,0–93,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>90,0</b>	<b>89,1–91,0</b>	<b>92,2</b>	<b>91,5–92,9</b>

IC – Intervalle de confiance.



**Proportion de femmes qui savaient avant d'être enceintes que la prise d'acide folique avant la grossesse pouvait aider à prévenir certaines anomalies congénitales chez le nouveau-né, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 6.2]

<b>Province/territoire</b>	<b>%</b>	<b>IC 95 %</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	83,7	80,1–87,4
Île-du-Prince-Édouard	78,2	74,9–81,5
Nouvelle-Écosse	84,0	80,7–87,3
Nouveau-Brunswick	77,1	73,1–81,1
Québec	77,0	74,7–79,2
Ontario	77,9	76,1–79,7
Manitoba	70,9	66,6–75,2
Saskatchewan	77,5	73,7–81,3
Alberta	76,8	73,8–79,8
Colombie-Britannique	80,3	77,4–83,2
Yukon	82,9	78,2–87,7
Territoires du Nord-Ouest	56,6	50,9–62,2
Nunavut	33,6	26,8–40,4
<b>Canada</b>	<b>77,6</b>	<b>76,6–78,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui savaient avant d'être enceintes que la prise d'acide folique avant la grossesse pouvait aider à prévenir certaines anomalies congénitales chez le nouveau-né, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 6.3]

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	36,0	30,2–41,7
20–24	55,3	51,8–58,9
25–29	79,3	77,5–81,1
30–34	85,9	84,3–87,5
35–39	83,3	80,7–85,9
≥40	81,0	75,1–87,0
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	47,5	43,0–52,0
Diplôme d'études secondaires	65,3	62,6–68,0
Diplôme d'études postsecondaires	81,0	79,3–82,7
Diplôme universitaire	88,5	87,1–89,9
<b>Parité</b>		
Primipares	73,0	71,4–74,7
Multipares	81,6	80,1–83,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	59,7	56,9–62,6
Au-dessus du SFR	84,5	83,4–85,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>77,6</b>	<b>76,6–78,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse, selon leur connaissance à ce chapitre avant d'être enceintes, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 6.4]

Province/territoire	Savaient avant d'être enceintes que l'acide folique peut aider à prévenir certaines anomalies congénitales		Ne savaient pas avant d'être enceintes que l'acide folique peut aider à prévenir certaines anomalies congénitales	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	68,9	64,1–73,7	14,1 †	5,1–23,2
Île-du-Prince-Édouard	61,0	56,3–65,6	*	
Nouvelle-Écosse	68,9	64,2–73,6	10,9 ‡	3,5–18,2
Nouveau-Brunswick	68,7	63,6–73,7	20,1 †	11,6–28,6
Québec	67,7	64,9–70,6	14,4	10,4–18,4
Ontario	68,5	66,2–70,8	22,5	18,5–26,6
Manitoba	66,4	60,8–71,9	7,4 ‡	2,4–12,4
Saskatchewan	69,4	64,3–74,5	7,9 ‡	2,4–13,5
Alberta	70,2	66,4–74,1	18,1	12,3–24,0
Colombie-Britannique	71,3	67,3–75,3	17,8 †	10,9–24,7
Yukon	72,7	66,8–78,6	*	
Territoires du Nord-Ouest	62,5	55,1–69,9	19,4 †	12,4–26,4
Nunavut	35,2 †	23,5–46,9	*	
<b>Canada</b>	<b>68,8</b>	<b>67,5–70,1</b>	<b>17,8</b>	<b>15,6–19,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois mois précédant la grossesse, selon leur connaissance à ce chapitre avant d'être enceintes, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Savaient avant d'être enceintes que l'acide folique peut aider à prévenir certaines anomalies congénitales		Ne savaient pas avant d'être enceintes que l'acide folique peut aider à prévenir certaines anomalies congénitales	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<i>Âge de la mère (années)</i>				
15–19	33,1	23,5–42,7	11,2 †	6,1–16,2
20–24	49,0	44,2–53,8	14,9	11,0–18,8
25–29	67,4	65,1–69,8	17,1	13,4–20,9
30–34	73,6	71,5–75,6	20,9	15,9–25,9
35–39	75,6	72,4–78,8	23,0	15,7–30,3
≥40	69,5	61,7–77,3	28,3 †	12,8–43,8
<i>Niveau de scolarité de la mère</i>				
Études secondaires non terminées	43,9	37,0–50,8	15,5	10,5–20,4
Diplôme d'études secondaires	53,3	49,8–56,7	15,3	11,7–18,8
Diplôme d'études postsecondaires	69,7	67,5–72,0	17,0	13,2–20,8
Diplôme universitaire	77,4	75,5–79,3	25,7	19,7–31,7
<i>Parité</i>				
Primipares	74,9	73,0–76,7	15,8	13,0–18,6
Multipares	64,5	62,6–66,4	19,8	16,6–23,0
<i>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</i>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	46,7	42,8–50,7	16,0	12,4–19,5
Au-dessus du SFR	73,3	71,9–74,8	19,5	16,4–22,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>68,8</b>	<b>67,5–70,1</b>	<b>17,8</b>	<b>15,6–19,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois premiers mois de la grossesse, selon leur connaissance à ce chapitre avant d'être enceintes, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 6.4]

Province/territoire	Savaient avant d'être enceintes que l'acide folique peut aider à prévenir certaines anomalies congénitales		Ne savaient pas avant d'être enceintes que l'acide folique peut aider à prévenir certaines anomalies congénitales	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	93,1	90,2–96,0	85,8	77,4–94,2
Île-du-Prince-Édouard	90,9	88,3–93,6	75,0	67,5–82,5
Nouvelle-Écosse	93,4	90,8–95,9	80,3	70,6–90,0
Nouveau-Brunswick	94,6	92,1–97,2	77,7	68,9–86,4
Québec	90,7	88,9–92,5	70,8	65,8–75,9
Ontario	93,2	92,0–94,4	79,5	75,7–83,3
Manitoba	93,1	90,1–96,0	80,7	73,2–88,2
Saskatchewan	92,9	90,1–95,8	70,5	61,1–80,0
Alberta	90,2	87,7–92,7	75,9	69,4–82,4
Colombie-Britannique	95,4	93,7–97,0	85,4	79,2–91,6
Yukon	96,3	93,9–98,6	100,0	100,0–100,0
Territoires du Nord-Ouest	86,6	81,7–91,6	68,0	59,7–76,2
Nunavut	74,9	63,9–85,9	31,6	23,5–39,8
<b>Canada</b>	<b>92,5</b>	<b>91,7–93,2</b>	<b>77,0</b>	<b>74,7–79,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont pris des suppléments d'acide folique au cours des trois premiers mois de la grossesse, selon leur connaissance à ce chapitre avant d'être enceintes, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Savaient avant d'être enceintes que l'acide folique peut aider à prévenir certaines anomalies congénitales		Ne savaient pas avant d'être enceintes que l'acide folique peut aider à prévenir certaines anomalies congénitales	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>				
15–19	80,1	72,2–87,9	64,9	57,7–72,1
20–24	87,2	84,0–90,4	76,3	71,9–80,8
25–29	92,5	91,1–93,8	80,5	76,6–84,4
30–34	93,7	92,5–94,8	77,5	72,5–82,6
35–39	94,3	92,6–96,0	78,9	71,8–86,0
≥40	92,9	88,9–97,0	68,5	51,5–85,4
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>				
Études secondaires non terminées	83,4	78,7–88,2	60,9	55,1–66,7
Diplôme d'études secondaires	90,1	88,0–92,1	75,5	71,2–79,7
Diplôme d'études postsecondaires	91,6	90,3–92,9	84,2	80,6–87,8
Diplôme universitaire	95,5	94,5–96,4	83,4	78,3–88,5
<b>Parité</b>				
Primipares	94,8	93,8–95,7	80,2	77,3–83,0
Multipares	90,8	89,7–91,9	73,3	69,6–77,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	86,3	83,6–88,9	69,9	65,6–74,2
Au-dessus du SFR	93,6	92,8–94,3	83,7	80,9–86,6
<b>Canada</b>	<b>92,5</b>	<b>91,7–93,2</b>	<b>77,0</b>	<b>74,7–79,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

## 7 Échographie prénatale

Nombre moyen d'échographies prénatales, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

Province/territoire	Moyenne	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	3,6	3,2–4,0
Île-du-Prince-Édouard	2,4	2,2–2,6
Nouvelle-Écosse	3,5	3,2–3,8
Nouveau-Brunswick	3,2	3,0–3,5
Québec	3,1	3,0–3,2
Ontario	3,4	3,3–3,5
Manitoba	2,2	2,1–2,4
Saskatchewan	2,8	2,6–2,9
Alberta	3,1	2,9–3,2
Colombie-Britannique	2,7	2,6–2,8
Yukon	2,4	2,2–2,5
Territoires du Nord-Ouest	2,4	2,2–2,6
Nunavut	2,0	1,7–2,2
<b>Canada</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1–3,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Nombre moyen d'échographies prénatales, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Moyenne	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	3,1	2,8–3,4
20–24	3,1	2,9–3,3
25–29	3,0	2,9–3,1
30–34	3,2	3,1–3,3
35–39	3,3	3,1–3,4
≥40	3,9	3,4–4,3
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	3,1	2,8–3,3
Diplôme d'études secondaires	3,0	2,9–3,1
Diplôme d'études postsecondaires	3,2	3,1–3,3
Diplôme universitaire	3,2	3,1–3,3
<b>Parité</b>		
Primipares	3,3	3,2–3,3
Multipares	3,0	3,0–3,1
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	3,2	3,0–3,3
Au-dessus du SFR	3,1	3,1–3,2
<b>Toutes les femmes</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1–3,2</b>

IC – Intervalle de confiance.



## Répartition du nombre d'échographies prénatales, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 7.1]

Province/territoire	Aucun		Un		Deux		Trois		Quatre		Cinq ou plus	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	*		22,5	18,5–26,6	26,8	22,4–31,3	16,1	12,4–19,9	14,0	10,6–17,4	20,5	16,3–24,7
Île-du-Prince-Édouard	*		39,1	35,0–43,3	33,8	29,8–37,8	11,4	8,7–14,2	5,3 †	3,5–7,2	10,3	7,9–12,7
Nouvelle-Écosse	*		22,1	18,3–25,9	24,5	20,5–28,5	21,0	17,2–24,7	12,6	9,4–15,8	19,8	16,2–23,5
Nouveau-Brunswick	*		23,4	19,2–27,6	31,7	27,0–36,4	14,8	11,3–18,4	10,5	7,4–13,6	19,2	15,3–23,1
Québec	*		14,7	12,7–16,6	33,0	30,4–35,6	23,8	21,4–26,2	14,0	12,1–15,8	14,4	12,5–16,3
Ontario	0,3 ‡	0,1–0,5	10,4	9,0–11,7	29,6	27,6–31,6	25,5	23,6–27,3	15,9	14,1–17,6	18,4	16,6–20,1
Manitoba	1,8 ‡	0,5–3,1	36,2	31,4–40,9	29,3	24,9–33,6	16,4	12,8–20,0	10,0	6,9–13,0	6,5 †	4,0–8,9
Saskatchewan	*		15,7	12,0–19,3	37,3	32,5–42,2	25,0	20,8–29,1	11,0	7,8–14,1	10,8	7,9–13,6
Alberta	*		19,5	16,6–22,3	31,3	27,7–34,8	21,2	18,1–24,3	11,7	9,2–14,2	16,3	13,5–19,0
Colombie-Britannique	*		21,4	18,3–24,5	32,4	28,9–35,9	23,6	20,5–26,7	12,7	10,1–15,3	9,9	7,6–12,2
Yukon	*		23,1	17,9–28,2	38,3	32,6–44,1	16,0	11,7–20,3	13,1	9,2–16,9	7,8 †	4,7–10,9
Territoires du Nord-Ouest	*		37,7	32,3–43,1	37,2	31,9–42,5	9,7 †	6,5–12,9	*		10,9	7,5–14,4
Nunavut	*		50,6	43,1–58,2	30,9	23,9–37,9	8,5 †	4,5–12,6	*		*	
<b>Canada</b>	<b>0,2 †</b>	<b>0,1–0,4</b>	<b>15,8</b>	<b>15,0–16,7</b>	<b>31,1</b>	<b>29,9–32,3</b>	<b>23,4</b>	<b>22,3–24,5</b>	<b>13,9</b>	<b>13,0–14,8</b>	<b>15,5</b>	<b>14,6–16,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition du nombre d'échographies prénatales, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Aucun		Un		Deux		Trois		Quatre		Cinq ou plus	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>												
15–19	*		20,6	16,1–25,1	29,5	23,8–35,3	17,9	13,4–22,5	14,5	10,2–18,8	16,5	12,0–21,0
20–24	*		20,6	17,8–23,3	31,1	27,9–34,3	19,5	16,6–22,4	14,0	11,5–16,5	14,8	12,3–17,3
25–29	0,3 ‡	0,0–0,5	17,5	15,8–19,2	32,9	30,8–35,0	22,4	20,5–24,3	13,5	12,0–15,1	13,4	11,9–14,9
30–34	0,2 ‡	0,0–0,3	14,6	13,1–16,1	30,7	28,7–32,8	24,5	22,6–26,5	13,1	11,6–14,6	16,8	15,1–18,5
35–39	*		10,8	8,7–12,9	31,1	27,9–34,3	26,3	23,2–29,4	15,4	12,8–18,0	16,1	13,6–18,6
≥40	*		10,0 †	5,3–14,8	18,8	13,1–24,6	30,8	24,0–37,6	15,1 †	9,6–20,6	24,5	17,9–31,1
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>												
Études secondaires non terminées	*		20,9	17,3–24,5	29,0	24,9–33,0	21,7	18,1–25,4	13,8	10,8–16,8	14,1	10,9–17,2
Diplôme d'études secondaires	*		19,2	17,0–21,4	31,5	28,8–34,2	22,8	20,3–25,2	11,6	9,7–13,4	14,8	12,8–16,9
Diplôme d'études postsecondaires	*		15,8	14,3–17,2	32,4	30,3–34,5	22,4	20,7–24,2	13,1	11,7–14,6	16,1	14,6–17,7
Diplôme universitaire	0,4 ‡	0,1–0,7	12,9	11,6–14,3	30,0	28,0–32,0	24,9	23,1–26,8	16,1	14,5–17,7	15,5	13,9–17,2
<b>Parité</b>												
Primipares	*		13,9	12,7–15,1	28,9	27,1–30,6	24,2	22,5–25,9	15,4	14,0–16,7	17,5	16,0–18,9
Multipares	0,3 †	0,1–0,5	17,5	16,2–18,7	32,9	31,3–34,5	22,8	21,4–24,2	12,7	11,5–13,9	13,8	12,6–15,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>												
Au niveau ou au-dessous du SFR	0,4 ‡	0,0–0,8	17,4	15,2–19,6	28,5	25,7–31,3	26,0	23,4–28,5	12,9	11,0–14,8	14,8	12,7–16,9
Au-dessus du SFR	0,2 ‡	0,0–0,3	15,5	14,4–16,5	32,2	30,8–33,6	22,7	21,5–24,0	13,8	12,7–14,8	15,7	14,6–16,7
<b>Toutes les femmes</b>	<b>0,2 †</b>	<b>0,1–0,4</b>	<b>15,8</b>	<b>15,0–16,7</b>	<b>31,1</b>	<b>29,9–32,3</b>	<b>23,4</b>	<b>22,3–24,5</b>	<b>13,9</b>	<b>13,0–14,8</b>	<b>15,5</b>	<b>14,6–16,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Moment de la première échographie prénatale, selon le nombre moyen de semaines de grossesse, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007**

Province/territoire	Moyenne	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	14,7	14,2–15,3
Île-du-Prince-Édouard	16,4	15,9–16,8
Nouvelle-Écosse	14,5	14,0–15,0
Nouveau-Brunswick	15,3	14,8–15,9
Québec	15,0	14,7–15,3
Ontario	13,0	12,7–13,2
Manitoba	17,1	16,5–17,7
Saskatchewan	13,9	13,3–14,4
Alberta	14,2	13,8–14,7
Colombie-Britannique	14,2	13,8–14,7
Yukon	16,1	15,4–16,9
Territoires du Nord-Ouest	16,9	16,2–17,5
Nunavut	16,9	16,1–17,8
<b>Canada</b>	<b>14,1</b>	<b>13,9–14,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

## Répartition du moment de la première échographie prénatale, selon le nombre de semaines de grossesse, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 7.2]

Semaine	%	IC 95 %
1–4	1,9	1,6–2,3
5	1,9	1,5–2,2
6	4,2	3,7–4,8
7	3,1	2,7–3,6
8	8,2	7,5–9,0
9	3,4	3,0–3,9
10	4,6	4,1–5,2
11	3,4	2,9–3,9
12	17,1	16,1–18,1
13	4,7	4,1–5,2
14	2,3	1,9–2,6
15	1,8	1,5–2,2
16	8,1	7,4–8,8
17	2,0	1,7–2,4
18	9,3	8,5–10,0
19	4,5	4,0–5,0
20	12,0	11,1–12,8
21	1,6	1,3–1,9
22	1,6	1,3–1,9
23	0,5 †	0,3–0,6
24	1,6	1,3–1,9
25	0,3 †	0,2–0,5
26	0,5 †	0,3–0,6
27	0,2 †	0,1–0,3
28–42	1,3	1,0–1,6

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant eu la première échographie prénatale avant 18 semaines, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

<b>Province/territoire</b>	<b>%</b>	<b>IC 95 %</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	57,5	52,3–62,7
Île-du-Prince-Édouard	46,7	42,3–51,0
Nouvelle-Écosse	61,5	57,0–65,9
Nouveau-Brunswick	53,3	48,2–58,4
Québec	61,3	58,6–63,9
Ontario	77,0	75,1–78,9
Manitoba	46,2	41,1–51,3
Saskatchewan	70,2	65,6–74,8
Alberta	63,4	59,8–67,0
Colombie-Britannique	58,7	54,8–62,5
Yukon	53,3	47,1–59,5
Territoires du Nord-Ouest	39,8	34,2–45,4
Nunavut	52,5	44,6–60,4
<b>Canada</b>	<b>66,8</b>	<b>65,6–68,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant eu la première échographie prénatale avant 18 semaines, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	64,3	58,6–69,9
20–24	63,9	60,6–67,2
25–29	63,4	61,1–65,6
30–34	66,9	64,9–69,0
35–39	74,7	71,8–77,6
≥40	80,5	74,5–86,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	64,6	60,1–69,0
Diplôme d'études secondaires	63,0	60,3–65,7
Diplôme d'études postsecondaires	65,4	63,4–67,5
Diplôme universitaire	70,7	68,7–72,7
<b>Parité</b>		
Primipares	70,3	68,7–72,0
Multipares	63,9	62,2–65,6
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	66,5	63,8–69,3
Au-dessus du SFR	66,4	65,0–67,7
<b>Toutes les femmes</b>	<b>66,8</b>	<b>65,6–68,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

## Répartition du moment de la première échographie prénatale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 7.3]

Province/territoire	<10 semaines		10–17 semaines		18–20 semaines		>20 semaines	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	22,0	17,7–26,2	35,5	30,7–40,4	37,4	32,4–42,4	5,1 †	2,9–7,4
Île-du-Prince-Édouard	13,7	10,7–16,6	33,0	28,9–37,1	43,7	39,3–48,1	9,6	7,2–12,0
Nouvelle-Écosse	22,7	18,9–26,5	38,7	34,1–43,4	30,3	26,0–34,7	8,2	5,6–10,8
Nouveau-Brunswick	17,1	13,3–21,0	36,1	31,3–41,0	38,3	33,2–43,4	8,4 †	5,6–11,2
Québec	15,2	13,2–17,1	46,1	43,3–48,8	30,4	27,9–32,9	8,3	6,8–9,9
Ontario	27,9	25,9–30,0	49,1	46,7–51,4	17,9	16,2–19,7	5,1	4,1–6,0
Manitoba	11,4	8,2–14,6	34,8	30,0–39,6	33,4	28,8–38,0	20,4	16,3–24,5
Saskatchewan	22,1	18,0–26,3	48,1	43,2–53,0	22,7	18,4–27,0	7,1 †	4,5–9,7
Alberta	23,2	20,1–26,3	40,2	36,5–43,9	26,9	23,5–30,2	9,8	7,5–12,0
Colombie-Britannique	26,0	22,6–29,4	32,7	29,0–36,3	33,9	30,3–37,6	7,4	5,3–9,5
Yukon	16,0	11,4–20,6	37,3	31,3–43,3	28,8	23,2–34,4	17,9	13,2–22,7
Territoires du Nord-Ouest	12,6	8,8–16,5	27,2	22,1–32,2	50,5	44,8–56,2	9,7 †	6,3–13,2
Nunavut	13,2 †	7,8–18,6	39,3	31,5–47,1	30,4	23,1–37,6	17,1 †	11,3–23,0
<b>Canada</b>	<b>22,8</b>	<b>21,7–23,9</b>	<b>44,0</b>	<b>42,7–45,3</b>	<b>25,7</b>	<b>24,6–26,8</b>	<b>7,5</b>	<b>6,8–8,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Répartition du moment de la première échographie prénatale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	<10 semaines		10–17 semaines		18–20 semaines		>20 semaines	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	20,4	15,2–25,5	43,9	38,0–49,8	20,3	15,7–24,9	15,5	10,9–20,0
20–24	24,9	21,7–28,0	39,0	35,5–42,6	26,1	23,0–29,2	10,0	7,9–12,1
25–29	20,6	18,8–22,4	42,8	40,4–45,2	28,9	26,8–31,0	7,7	6,5–9,0
30–34	23,0	21,1–25,0	43,9	41,6–46,2	26,1	24,1–28,1	7,0	5,8–8,1
35–39	23,7	20,7–26,7	51,0	47,6–54,4	20,9	18,2–23,5	4,5	3,0–5,9
≥40	33,7	26,6–40,8	46,9	39,1–54,7	13,9 †	8,5–19,2	5,6 †	2,2–8,9
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	21,1	17,3–24,9	43,5	38,8–48,1	25,5	21,5–29,5	9,9	7,2–12,6
Diplôme d'études secondaires	21,8	19,4–24,2	41,2	38,3–44,0	26,8	24,3–29,3	10,2	8,5–11,9
Diplôme d'études postsecondaires	22,3	20,6–24,1	43,1	40,9–45,2	26,5	24,6–28,4	8,1	6,9–9,2
Diplôme universitaire	24,2	22,2–26,1	46,5	44,3–48,8	24,4	22,5–26,3	4,9	4,0–5,8
<b>Parité</b>								
Primipares	26,2	24,5–27,9	44,2	42,2–46,2	23,4	21,8–24,9	6,3	5,4–7,2
Multipares	20,0	18,6–21,4	43,9	42,1–45,6	27,6	26,0–29,2	8,5	7,5–9,5
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	21,8	19,3–24,2	44,7	41,7–47,8	23,1	20,6–25,6	10,4	8,6–12,1
Au-dessus du SFR	22,5	21,2–23,8	43,9	42,4–45,3	26,9	25,6–28,2	6,8	6,0–7,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>22,8</b>	<b>21,7–23,9</b>	<b>44,0</b>	<b>42,7–45,3</b>	<b>25,7</b>	<b>24,6–26,8</b>	<b>7,5</b>	<b>6,8–8,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.



## 8 Test de dépistage du VIH

### Proportion de femmes qui ont indiqué avoir subi un test de dépistage du VIH, selon la province ou le territoire et en fonction de l'approche de dépistage optionnel ou systématique, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 8.1]

Province/territoire	Oui		Non		Ne savaient pas	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	72,7	68,2–77,2	14,8	11,3–18,2	12,5	9,2–15,9
Île-du-Prince-Édouard	74,5	71,0–78,0	9,8	7,3–12,2	15,7	12,8–18,7
Nouvelle-Écosse	71,4	67,4–75,5	13,7	10,6–16,8	14,9	11,6–18,1
Nouveau-Brunswick	67,0	62,2–71,8	16,6	12,7–20,5	16,4	12,7–20,1
Québec	69,3	66,8–71,9	21,3	19,1–23,4	9,4	7,8–11,0
Ontario	80,7	79,0–82,4	13,6	12,1–15,2	5,7	4,6–6,8
Manitoba	73,4	69,3–77,5	19,8	16,0–23,6	6,8 †	4,4–9,2
Saskatchewan	76,0	71,9–80,1	11,8	8,7–14,9	12,2	9,1–15,4
Alberta	71,4	68,0–74,7	13,7	11,2–16,2	14,9	12,2–17,7
Colombie-Britannique	68,1	64,6–71,7	16,9	14,0–19,9	14,9	12,2–17,7
Yukon	79,8	75,1–84,6	15,1	10,9–19,3	*	
Territoires du Nord-Ouest	76,9	72,1–81,6	8,2 †	5,2–11,2	14,9	10,9–18,9
Nunavut	69,1	62,5–75,7	15,2 †	10,1–20,2	15,7 †	10,3–21,1
<b>Canada</b>	<b>74,3</b>	<b>73,2–75,4</b>	<b>16,1</b>	<b>15,1–17,0</b>	<b>9,6</b>	<b>8,9–10,4</b>
Dépistage optionnel §	77,4	76,0–78,8	14,2	12,9–15,5	8,4	7,5–9,4
Dépistage systématique §	70,3	68,5–72,0	18,5	17,1–19,9	11,2	10,0–12,5

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ Dépistage optionnel : Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Colombie-Britannique et Yukon.

Dépistage systématique : Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Québec, Manitoba, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient subi un test de dépistage du VIH, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 8.3]

	Oui		Non		Ne savaient pas	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	80,8	76,2–85,4	11,1 †	7,1–15,1	8,0 †	5,0–11,1
20–24	76,0	73,0–79,1	14,2	11,6–16,7	9,8	7,7–11,9
25–29	73,3	71,3–75,3	17,1	15,4–18,8	9,6	8,3–10,9
30–34	74,6	72,7–76,5	16,3	14,7–17,9	9,1	7,8–10,4
35–39	73,0	70,0–76,1	16,4	13,9–18,8	10,6	8,5–12,7
≥40	75,3	68,8–81,9	14,8 †	9,2–20,3	9,9 †	5,5–14,3
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	77,3	73,6–81,1	15,5	12,1–18,9	7,2	4,8–9,5
Diplôme d'études secondaires	74,9	72,4–77,4	14,0	12,1–16,0	11,1	9,3–12,9
Diplôme d'études postsecondaires	74,4	72,5–76,3	16,0	14,4–17,5	9,6	8,4–10,9
Diplôme universitaire	73,5	71,6–75,5	17,3	15,6–18,9	9,2	8,0–10,5
<b>Parité</b>						
Primipares	75,9	74,3–77,5	14,0	12,7–15,4	10,1	9,0–11,2
Multipares	73,0	71,5–74,6	17,7	16,3–19,0	9,3	8,3–10,3
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	79,7	77,4–82,1	12,9	11,0–14,9	7,4	5,8–8,9
Au-dessus du SFR	73,1	71,8–74,5	16,9	15,7–18,0	10,0	9,1–10,9
<b>Toutes les femmes</b>	<b>74,3</b>	<b>73,2–75,4</b>	<b>16,1</b>	<b>15,1–17,0</b>	<b>9,6</b>	<b>8,9–10,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

## Répartition du niveau de participation des femmes à la prise de décision concernant le test de dépistage du VIH, selon la province ou le territoire et en fonction de l'approche de dépistage optionnel ou systématique, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 8.2]

Province/territoire	Très impliquées		Quelque peu impliquées		Pas impliquées	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	31,5	26,6–36,5	21,6	16,9–26,2	46,9	41,6–52,2
Île-du-Prince-Édouard	40,2	35,5–44,8	14,9	11,6–18,2	44,9	40,1–49,7
Nouvelle-Écosse	38,1	33,1–43,1	24,3	19,9–28,8	37,6	32,6–42,6
Nouveau-Brunswick	36,8	31,2–42,3	14,5	10,5–18,4	48,8	43,1–54,4
Québec	29,5	26,9–32,0	22,0	19,7–24,4	48,5	45,8–51,2
Ontario	40,0	37,8–42,2	21,9	20,0–23,8	38,0	35,9–40,2
Manitoba	43,5	38,3–48,7	22,7	18,4–27,0	33,8	28,7–38,9
Saskatchewan	36,9	32,0–41,7	22,6	18,3–27,0	40,5	35,5–45,5
Alberta	38,1	34,1–42,1	23,2	19,8–26,6	38,7	34,7–42,8
Colombie-Britannique	36,5	32,5–40,5	20,7	17,3–24,1	42,8	38,7–46,9
Yukon	63,0	57,0–69,0	17,6	12,9–22,4	19,3	14,4–24,3
Territoires du Nord-Ouest	44,7	38,4–50,9	20,2	15,3–25,0	35,1	29,1–41,2
Nunavut	32,9	25,0–40,8	27,4	20,1–34,6	39,7	31,6–47,8
<b>Canada</b>	<b>36,7</b>	<b>35,5–38,0</b>	<b>21,9</b>	<b>20,8–23,0</b>	<b>41,4</b>	<b>40,1–42,6</b>
Dépistage optionnel §	39,2	37,4–40,9	21,8	20,2–23,3	39,1	37,3–40,8
Dépistage systématique §	33,5	31,6–35,4	22,1	20,4–23,7	44,4	42,5–46,4

IC – Intervalle de confiance.

§ Dépistage optionnel : Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Colombie-Britannique et Yukon.

Dépistage systématique : Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Québec, Manitoba, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.

**Répartition du niveau de participation des femmes à la prise de décision concernant le test de dépistage du VIH, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 8.4]

	Très impliquées		Quelque peu impliquées		Pas impliquées	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	42,8	36,6–49,1	22,3	16,9–27,6	34,9	28,8–40,9
20–24	37,4	33,7–41,0	23,3	20,1–26,5	39,3	35,7–42,9
25–29	35,7	33,4–37,9	23,0	20,9–25,1	41,4	39,1–43,6
30–34	37,0	34,7–39,3	21,3	19,3–23,3	41,7	39,5–44,0
35–39	37,8	34,3–41,2	19,4	16,6–22,1	42,9	39,2–46,5
≥40	35,1	27,3–42,8	22,2	15,5–28,8	42,8	34,5–51,1
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	37,7	33,2–42,3	23,6	19,6–27,6	38,7	33,9–43,5
Diplôme d'études secondaires	36,8	33,9–39,6	23,1	20,5–25,6	40,2	37,3–43,0
Diplôme d'études postsecondaires	37,0	34,9–39,2	21,7	19,9–23,5	41,3	39,1–43,5
Diplôme universitaire	36,3	34,2–38,4	21,1	19,1–23,0	42,6	40,4–44,8
<b>Parité</b>						
Primipares	37,2	35,3–39,2	22,2	20,5–23,8	40,6	38,7–42,6
Multipares	36,4	34,7–38,1	21,7	20,1–23,2	42,0	40,2–43,7
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	38,2	35,2–41,2	21,2	18,6–23,9	40,6	37,5–43,7
Au-dessus du SFR	36,8	35,3–38,3	22,1	20,8–23,4	41,1	39,7–42,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>36,7</b>	<b>35,5–38,0</b>	<b>21,9</b>	<b>20,8–23,0</b>	<b>41,4</b>	<b>40,1–42,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

## 9 Indice de masse corporelle de la mère et gain de poids pendant la grossesse

**IMC moyen (kg/m<sup>2</sup>) avant la grossesse et au cours de la période postnatale, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 9.1]

Province/territoire	Avant la grossesse		Au cours de la période postnatale §	
	Moyenne	IC 95 %	Moyenne	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	25,9	25,3–26,4	26,8	26,2–27,4
Île-du-Prince-Édouard	25,3	24,8–25,7	26,0	25,6–26,4
Nouvelle-Écosse	26,2	25,7–26,8	27,1	26,6–27,7
Nouveau-Brunswick	25,7	25,1–26,3	26,4	25,8–27,1
Québec	24,1	23,9–24,4	25,2	24,9–25,5
Ontario	24,4	24,1–24,7	25,3	25,1–25,6
Manitoba	25,1	24,6–25,7	26,2	25,6–26,8
Saskatchewan	25,8	25,2–26,3	26,7	26,1–27,3
Alberta	24,4	24,0–24,8	25,5	25,1–25,9
Colombie-Britannique	23,7	23,4–24,1	24,7	24,3–25,1
Yukon	25,6	24,8–26,4	25,9	25,1–26,7
Territoires du Nord-Ouest	25,2	24,7–25,7	26,5	26,0–27,1
Nunavut	24,8	23,9–25,7	25,8	24,8–26,7
<b>Canada</b>	<b>24,4</b>	<b>24,3–24,6</b>	<b>25,4</b>	<b>25,2–25,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ «Au cours de la période postnatale» fait référence au moment de l’entrevue (soit de 5 à 14 mois après l’accouchement).

**IMC moyen (kg/m<sup>2</sup>) avant la grossesse et au cours de la période postnatale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Avant la grossesse		Au cours de la période postnatale §	
	Moyenne	IC 95 %	Moyenne	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>				
15–19	22,6	22,0–23,1	24,5	23,8–25,2
20–24	24,1	23,7–24,5	25,5	25,1–25,9
25–29	24,7	24,4–24,9	25,6	25,3–25,9
30–34	24,6	24,3–24,8	25,4	25,2–25,7
35–39	24,3	24,0–24,7	25,0	24,7–25,4
≥40	24,2	23,5–24,9	25,1	24,4–25,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>				
Études secondaires non terminées	24,5	23,9–25,1	26,1	25,5–26,6
Diplôme d'études secondaires	25,2	24,8–25,5	26,2	25,9–26,6
Diplôme d'études postsecondaires	24,8	24,6–25,0	25,8	25,5–26,0
Diplôme universitaire	23,7	23,5–23,9	24,4	24,3–24,6
<b>Parité</b>				
Primipares	24,0	23,8–24,2	25,1	24,9–25,3
Multipares	24,8	24,6–25,0	25,7	25,5–25,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	24,5	24,1–24,8	25,9	25,5–26,2
Au-dessus du SFR	24,5	24,3–24,6	25,3	25,1–25,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>24,4</b>	<b>24,3–24,6</b>	<b>25,4</b>	<b>25,2–25,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ «Au cours de la période postnatale» fait référence au moment de l'entrevue (soit de 5 à 14 mois après l'accouchement).

## Gain de poids moyen pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007

[Contient les données pour Figure 9.1]

Province/territoire	Moyenne		Moyenne	
	(kg)	IC 95 %	(lb)	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	16,1	15,4–16,8	35,5	33,9–37,1
Île-du-Prince-Édouard	15,9	15,4–16,3	34,9	33,9–36,0
Nouvelle-Écosse	15,7	15,0–16,4	34,7	33,2–36,2
Nouveau-Brunswick	15,9	15,2–16,7	35,0	33,4–36,7
Québec	15,2	14,8–15,6	33,4	32,6–34,2
Ontario	16,0	15,6–16,3	35,2	34,4–36,0
Manitoba	15,8	15,2–16,5	34,9	33,4–36,4
Saskatchewan	15,4	14,8–16,0	34,0	32,6–35,3
Alberta	15,4	14,8–15,9	33,8	32,7–35,0
Colombie-Britannique	16,1	15,6–16,7	35,6	34,4–36,8
Yukon	14,4	13,5–15,2	31,5	29,6–33,4
Territoires du Nord-Ouest	14,6	13,8–15,3	32,0	30,3–33,7
Nunavut	15,8	14,3–17,3	35,0	31,6–38,3
<b>Canada</b>	<b>15,7</b>	<b>15,5–15,9</b>	<b>34,6</b>	<b>34,1–35,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Gain de poids moyen pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Moyenne (kg)	IC 95 %	Moyenne (lb)	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>				
15–19	18,5	17,4–19,5	40,7	38,3–43,1
20–24	17,1	16,4–17,7	37,6	36,2–38,9
25–29	16,0	15,6–16,3	35,1	34,3–36,0
30–34	15,2	14,9–15,5	33,5	32,8–34,2
35–39	14,5	14,1–15,0	32,0	31,0–32,9
≥40	15,1	14,0–16,1	33,3	31,0–35,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>				
Études secondaires non terminées	17,2	16,4–18,0	37,9	36,1–39,7
Diplôme d'études secondaires	15,9	15,5–16,4	35,1	34,0–36,1
Diplôme d'études postsecondaires	15,5	15,2–15,9	34,2	33,5–35,0
Diplôme universitaire	15,3	15,1–15,6	33,8	33,2–34,4
<b>Parité</b>				
Primipares	16,7	16,4–17,0	36,8	36,1–37,4
Multipares	14,9	14,6–15,1	32,7	32,2–33,3
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	16,3	15,7–16,8	35,8	34,5–37,1
Au-dessus du SFR	15,5	15,3–15,7	34,0	33,6–34,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>15,7</b>	<b>15,5–15,9</b>	<b>34,6</b>	<b>34,1–35,0</b>

IC – Intervalle de confiance.



## Répartition des catégories d'IMC (kg/m<sup>2</sup>) avant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007

Province/territoire	<18,5		18,5–24,9		25,0–29,9		≥30,0	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	3,4 †	1,6–5,1	49,1	43,9–54,3	28,1	23,4–32,8	19,4	15,3–23,5
Île-du-Prince-Édouard	6,1	4,2–8,0	53,7	49,6–57,8	22,8	19,2–26,4	17,4	14,2–20,6
Nouvelle-Écosse	2,6 †	1,1–4,1	49,0	44,2–53,7	25,7	21,6–29,8	22,7	18,6–26,8
Nouveau-Brunswick	4,9 †	2,8–7,0	48,5	43,4–53,6	23,8	19,5–28,0	22,9	18,7–27,1
Québec	6,2	4,8–7,5	60,1	57,5–62,7	21,7	19,4–23,9	12,1	10,3–13,9
Ontario	6,8	5,7–7,9	60,2	58,1–62,4	18,9	17,2–20,7	14,1	12,5–15,6
Manitoba	5,3 †	3,0–7,6	53,6	48,6–58,5	23,0	18,7–27,3	18,2	14,4–22,0
Saskatchewan	3,7 †	1,8–5,6	48,8	43,9–53,8	28,9	24,5–33,3	18,6	14,8–22,4
Alberta	5,7	4,0–7,5	58,8	55,1–62,6	23,6	20,3–27,0	11,8	9,4–14,2
Colombie-Britannique	6,3	4,4–8,3	65,1	61,4–68,9	18,7	15,8–21,7	9,8	7,6–12,1
Yukon	*		62,9	57,1–68,8	17,7	13,2–22,3	19,3	14,6–24,0
Territoires du Nord-Ouest	*		58,3	52,8–63,7	26,3	21,2–31,4	15,4	11,3–19,6
Nunavut	*		56,0	48,2–63,7	21,7	15,2–28,2	16,5 †	10,6–22,4
<b>Canada</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5–6,7</b>	<b>59,3</b>	<b>58,0–60,6</b>	<b>21,0</b>	<b>19,9–22,1</b>	<b>13,6</b>	<b>12,7–14,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Répartition des catégories d'IMC (kg/m<sup>2</sup>) avant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 9.2]

	<18,5		18,5–24,9		25,0–29,9		≥30,0	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	11,8 †	7,8–15,8	67,3	61,7–72,9	14,9	10,7–19,1	6,0 †	3,2–8,8
20–24	10,7	8,4–13,0	56,6	53,1–60,2	19,0	16,1–21,9	13,7	11,3–16,1
25–29	5,2	4,2–6,3	58,3	56,0–60,6	21,4	19,5–23,3	15,1	13,5–16,7
30–34	5,5	4,5–6,6	59,1	56,9–61,2	21,7	19,8–23,6	13,8	12,3–15,2
35–39	4,5 †	3,0–6,0	63,4	59,9–66,8	19,9	17,1–22,7	12,3	10,0–14,6
≥40	3,8 ‡	0,8–6,8	58,4	51,0–65,7	29,0	22,2–35,8	8,8 †	5,1–12,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	12,5	9,5–15,5	51,0	46,3–55,7	21,5	17,7–25,2	15,1	11,8–18,4
Diplôme d'études secondaires	6,8	5,3–8,2	53,7	50,8–56,6	22,3	19,9–24,7	17,3	15,0–19,6
Diplôme d'études postsecondaires	5,0	4,1–6,0	57,0	54,9–59,2	22,2	20,3–24,0	15,8	14,2–17,3
Diplôme universitaire	5,2	4,3–6,2	66,5	64,4–68,6	19,2	17,4–21,0	9,1	7,9–10,3
<b>Parité</b>								
Primipares	7,2	6,2–8,2	62,6	60,8–64,4	18,1	16,6–19,6	12,1	10,9–13,4
Multipares	5,2	4,4–6,0	56,6	54,8–58,4	23,5	22,0–25,0	14,7	13,5–16,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	9,9	8,1–11,8	52,6	49,4–55,7	22,3	19,8–24,8	15,2	13,0–17,4
Au-dessus du SFR	4,6	4,0–5,2	61,2	59,7–62,8	20,7	19,4–22,0	13,5	12,4–14,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>6,1</b>	<b>5,5–6,7</b>	<b>59,3</b>	<b>58,0–60,6</b>	<b>21,0</b>	<b>19,9–22,1</b>	<b>13,6</b>	<b>12,7–14,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

## Répartition des catégories d'IMC (kg/m<sup>2</sup>) au cours de la période postnatale, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007 §

Province/territoire	<18,5		18,5–24,9		25,0–29,9		≥30,0	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	*		41,6	36,7–46,6	32,6	27,8–37,4	24,4	19,8–29,0
Île-du-Prince-Édouard	*		49,6	45,4–53,8	26,6	22,9–30,3	21,5	18,0–25,0
Nouvelle-Écosse	1,5 ‡	0,3–2,6	41,2	36,4–46,0	29,8	25,4–34,1	27,6	23,1–32,0
Nouveau-Brunswick	2,3 ‡	0,8–3,9	46,7	41,5–51,8	28,4	23,7–33,0	22,6	18,3–26,9
Québec	4,8	3,6–5,9	53,8	51,2–56,5	24,0	21,6–26,3	17,5	15,4–19,6
Ontario	3,5	2,7–4,4	54,6	52,3–56,9	25,2	23,3–27,2	16,7	15,0–18,3
Manitoba	2,3 ‡	0,7–3,8	46,6	41,5–51,6	27,8	23,3–32,3	23,4	19,2–27,5
Saskatchewan	3,5 †	1,6–5,3	40,7	35,7–45,8	29,7	25,1–34,2	26,2	21,9–30,5
Alberta	3,9 †	2,5–5,3	51,6	47,8–55,4	26,6	23,2–30,0	18,0	15,1–20,9
Colombie-Britannique	4,3 †	2,6–6,0	56,6	52,5–60,6	25,5	22,0–29,0	13,6	10,9–16,2
Yukon	*		59,1	53,1–65,1	20,8	15,7–25,8	20,1	15,1–25,1
Territoires du Nord-Ouest	*		47,6	41,8–53,5	25,8	20,7–30,9	26,6	21,4–31,8
Nunavut	*		49,5	40,9–58,1	21,8 †	14,7–28,9	25,5	18,0–33,0
<b>Canada</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3–4,3</b>	<b>52,9</b>	<b>51,5–54,2</b>	<b>25,6</b>	<b>24,5–26,8</b>	<b>17,7</b>	<b>16,7–18,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ «Au cours de la période postnatale» fait référence au moment de l'entrevue (soit de 5 à 14 mois après l'accouchement).

**Répartition des catégories d'IMC (kg/m<sup>2</sup>) au cours de la période postnatale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 §**

[Contient les données pour Figure 9.2]

	<18,5		18,5–24,9		25,0–29,9		≥30,0	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	8,6 †	5,1–12,0	55,1	48,8–61,5	19,6	15,0–24,3	16,7	12,0–21,3
20–24	4,6 †	3,0–6,1	52,5	48,9–56,1	23,0	20,0–25,9	20,0	17,2–22,8
25–29	3,6	2,8–4,5	51,7	49,4–54,0	25,3	23,3–27,2	19,4	17,6–21,2
30–34	3,4	2,6–4,3	52,5	50,3–54,8	26,9	24,9–28,9	17,2	15,5–18,8
35–39	3,3 †	2,0–4,5	56,5	53,0–60,0	26,0	23,1–29,0	14,2	11,8–16,7
≥40	3,1 ‡	0,3–5,8	51,1	43,2–58,9	29,8	22,6–36,9	16,1 †	10,5–21,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	5,8 †	3,7–8,0	43,9	39,1–48,8	26,8	22,7–30,9	23,4	19,4–27,4
Diplôme d'études secondaires	3,6	2,5–4,6	47,3	44,4–50,2	26,7	24,1–29,2	22,5	20,0–24,9
Diplôme d'études postsecondaires	3,5	2,6–4,3	50,3	48,2–52,5	26,1	24,2–28,0	20,1	18,4–21,8
Diplôme universitaire	3,7	2,9–4,6	60,3	58,1–62,5	24,4	22,4–26,3	11,6	10,2–13,0
<b>Parité</b>								
Primipares	4,4	3,6–5,2	55,4	53,4–57,3	24,0	22,4–25,7	16,2	14,8–17,6
Multipares	3,3	2,6–3,9	50,8	49,0–52,6	26,9	25,4–28,5	19,0	17,6–20,4
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	4,8	3,4–6,2	46,5	43,5–49,6	27,9	25,2–30,6	20,8	18,4–23,2
Au-dessus du SFR	3,4	2,9–4,0	54,4	52,9–56,0	25,2	23,9–26,6	16,9	15,8–18,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3–4,3</b>	<b>52,9</b>	<b>51,5–54,2</b>	<b>25,6</b>	<b>24,5–26,8</b>	<b>17,7</b>	<b>16,7–18,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ «Au cours de la période postnatale» fait référence au moment de l'entrevue (soit de 5 à 14 mois après l'accouchement).

**Répartition des catégories de gain de poids (kg) pendant la grossesse, en fonction des catégories d'IMC (kg/m<sup>2</sup>) avant la grossesse, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 9.3]

Gain de poids (kg)	<18,5		18,5–24,9		25,0–29,9		≥30,0		Toutes les femmes	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<7,0	2,7 †	0,9–4,4	2,1	1,6–2,6	5,7	4,4–6,9	19,8	17,1–22,6	<b>5,5</b>	<b>4,9–6,0</b>
7,0–11,4	19,1	14,7–23,4	22,0	20,6–23,4	26,8	24,3–29,3	33,0	29,7–36,3	<b>24,5</b>	<b>23,4–25,6</b>
11,5–15,9	29,5	24,6–34,3	23,8	22,3–25,2	21,3	18,9–23,7	19,8	17,0–22,7	<b>23,0</b>	<b>21,9–24,1</b>
16,0–17,9	11,6	8,0–15,2	13,6	12,4–14,7	11,4	9,7–13,1	6,8	5,1–8,4	<b>12,0</b>	<b>11,2–12,8</b>
≥18,0	37,2	32,1–42,4	38,6	37,0–40,3	34,9	32,2–37,5	20,6	17,9–23,3	<b>35,1</b>	<b>33,8–36,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

# 10 Usage du tabac

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les trois mois précédant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 10.1]

Province/territoire	Fumaient tous les jours		Fumaient à l'occasion		Ne fumaient jamais	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	23,3	19,1–27,5	7,3 †	4,6–9,9	69,5	64,9–74,1
Île-du-Prince-Édouard	28,4	24,8–32,0	5,9 †	3,9–7,9	65,7	61,9–69,6
Nouvelle-Écosse	22,7	19,0–26,4	5,7 †	3,7–7,8	71,5	67,6–75,5
Nouveau-Brunswick	19,4	15,7–23,1	7,3 †	4,6–10,0	73,3	69,1–77,5
Québec	14,6	12,7–16,5	7,7	6,2–9,2	77,7	75,4–80,0
Ontario	14,0	12,6–15,5	5,5	4,5–6,6	80,4	78,7–82,1
Manitoba	23,2	19,1–27,3	6,2 †	3,8–8,6	70,6	66,4–74,9
Saskatchewan	22,5	18,4–26,6	5,7 †	3,4–8,0	71,8	67,5–76,1
Alberta	16,4	13,6–19,1	5,6	3,9–7,3	78,0	75,0–81,1
Colombie-Britannique	15,0	12,3–17,6	6,0	4,3–7,8	79,0	76,1–81,9
Yukon	17,1	12,6–21,5	*		79,8	75,2–84,5
Territoires du Nord-Ouest	29,3	24,2–34,3	17,4	13,1–21,6	53,4	47,7–59,0
Nunavut	67,0	60,2–73,7	11,1 †	6,5–15,6	21,9	16,2–27,7
<b>Canada</b>	<b>15,8</b>	<b>14,9–16,7</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6–6,9</b>	<b>78,0</b>	<b>77,0–78,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les trois mois précédant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 10.2]

	Fumaient tous les jours		Fumaient à l'occasion		Ne fumaient jamais	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	41,4	35,6–47,2	13,3	9,3–17,3	45,3	39,1–51,4
20–24	35,2	31,6–38,7	8,1	6,2–10,1	56,7	53,1–60,3
25–29	15,7	14,1–17,3	6,3	5,2–7,4	78,0	76,2–79,7
30–34	9,6	8,4–10,9	5,6	4,6–6,6	84,7	83,2–86,3
35–39	8,8	6,9–10,8	4,5	3,1–5,9	86,7	84,4–89,0
≥40	10,0 †	5,5–14,4	5,8 †	2,2–9,3	84,3	78,8–89,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	37,5	33,3–41,8	9,3	6,9–11,8	53,1	48,8–57,5
Diplôme d'études secondaires	29,1	26,5–31,6	6,8	5,3–8,2	64,2	61,5–66,8
Diplôme d'études postsecondaires	15,9	14,4–17,4	7,4	6,2–8,6	76,7	74,9–78,4
Diplôme universitaire	3,7	2,9–4,5	4,1	3,3–5,0	92,2	91,0–93,3
<b>Parité</b>						
Primipares	17,0	15,6–18,4	7,7	6,7–8,8	75,2	73,7–76,8
Multipares	14,8	13,6–16,1	5,0	4,3–5,8	80,1	78,8–81,5
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	26,0	23,5–28,5	7,9	6,3–9,6	66,1	63,3–68,9
Au-dessus du SFR	12,6	11,6–13,6	5,8	5,1–6,5	81,6	80,5–82,7
<b>Toutes les femmes</b>	<b>15,8</b>	<b>14,9–16,7</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6–6,9</b>	<b>78,0</b>	<b>77,0–78,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les trois derniers mois de la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 10.1]

Province/territoire	Fumaient tous les jours		Fumaient à l'occasion		Ne fumaient jamais	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	7,1 †	4,5–9,7	3,8 †	1,9–5,6	89,1	86,0–92,3
Île-du-Prince-Édouard	13,1	10,3–15,8	6,5	4,4–8,7	80,4	77,1–83,7
Nouvelle-Écosse	6,7 †	4,3–9,0	6,9 †	4,6–9,2	86,5	83,4–89,5
Nouveau-Brunswick	7,1 †	4,7–9,6	6,6 †	4,2–9,0	86,3	83,1–89,4
Québec	7,8	6,3–9,2	3,1	2,2–4,0	89,1	87,5–90,8
Ontario	5,5	4,5–6,5	3,3	2,5–4,1	91,2	90,0–92,4
Manitoba	8,6	5,8–11,3	5,9 †	3,5–8,2	85,5	82,1–89,0
Saskatchewan	9,3	6,4–12,1	7,1 †	4,5–9,7	83,6	80,0–87,3
Alberta	8,7	6,6–10,7	3,2 †	1,9–4,4	88,2	85,8–90,6
Colombie-Britannique	5,4	3,7–7,1	3,1 †	1,8–4,4	91,5	89,4–93,6
Yukon	8,4 †	5,1–11,8	*		88,3	84,3–92,2
Territoires du Nord-Ouest	16,6	12,3–20,8	8,3 †	5,0–11,5	75,1	70,0–80,2
Nunavut	47,8	40,5–55,0	16,1 †	10,7–21,4	36,2	29,3–43,1
<b>Canada</b>	<b>6,9</b>	<b>6,2–7,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2–4,1</b>	<b>89,5</b>	<b>88,8–90,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.



**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les trois derniers mois de la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 10.2]

	Fumaient tous les jours		Fumaient à l'occasion		Ne fumaient jamais	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	15,2	11,0–19,4	13,7	9,5–17,9	71,1	65,6–76,6
20–24	15,2	12,5–17,8	8,4	6,5–10,3	76,4	73,3–79,5
25–29	6,8	5,7–7,9	3,0	2,3–3,8	90,2	88,8–91,5
30–34	4,2	3,4–5,1	1,9	1,3–2,5	93,8	92,8–94,9
35–39	4,0 †	2,6–5,3	2,7 †	1,6–3,7	93,4	91,7–95,1
≥40	6,5 †	2,8–10,1	3,4 ‡	0,6–6,2	90,1	85,5–94,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	21,8	18,3–25,2	10,5	7,8–13,2	67,8	63,7–71,8
Diplôme d'études secondaires	12,0	10,1–13,8	6,5	5,2–7,8	81,6	79,5–83,7
Diplôme d'études postsecondaires	6,7	5,6–7,7	3,6	2,8–4,3	89,8	88,5–91,1
Diplôme universitaire	1,1 †	0,7–1,5	0,6 †	0,3–1,0	98,3	97,7–98,8
<b>Parité</b>						
Primipares	5,3	4,5–6,1	3,8	3,2–4,5	90,9	89,8–91,9
Multipares	8,2	7,3–9,1	3,5	2,9–4,1	88,3	87,3–89,4
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	12,8	10,8–14,7	7,3	5,9–8,7	80,0	77,7–82,3
Au-dessus du SFR	5,1	4,4–5,7	2,6	2,2–3,1	92,3	91,6–93,1
<b>Toutes les femmes</b>	<b>6,9</b>	<b>6,2–7,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2–4,1</b>	<b>89,5</b>	<b>88,8–90,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 10.1]

Province/territoire	Fumaient tous les jours		Fumaient à l'occasion		Ne fumaient jamais	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	14,5	11,2–17,9	6,8 †	4,2–9,4	78,7	74,6–82,8
Île-du-Prince-Édouard	21,7	18,4–25,1	6,5	4,5–8,5	71,8	68,1–75,4
Nouvelle-Écosse	15,9	12,6–19,2	7,3 †	4,9–9,7	76,8	73,1–80,5
Nouveau-Brunswick	15,0	11,8–18,3	6,7 †	4,2–9,2	78,2	74,3–82,1
Québec	11,4	9,7–13,0	4,7	3,6–5,8	83,9	81,9–85,9
Ontario	10,3	9,0–11,6	4,4	3,5–5,3	85,3	83,8–86,8
Manitoba	14,8	11,4–18,2	6,5 †	4,0–8,9	78,7	74,9–82,5
Saskatchewan	17,5	13,7–21,3	6,6 †	4,2–9,1	75,8	71,7–80,0
Alberta	12,7	10,3–15,2	4,6	3,1–6,1	82,6	79,9–85,4
Colombie-Britannique	9,6	7,5–11,7	4,9 †	3,3–6,5	85,5	82,9–88,0
Yukon	13,5	9,4–17,7	*		86,5	82,3–90,6
Territoires du Nord-Ouest	25,9	20,9–30,9	15,1	11,0–19,3	59,0	53,3–64,6
Nunavut	70,6	64,0–77,2	9,8 †	5,5–14,1	19,6	14,2–25,0
<b>Canada</b>	<b>11,7</b>	<b>10,9–12,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4–5,4</b>	<b>83,5</b>	<b>82,6–84,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, à l'occasion ou jamais, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 10.2]

	Fumaient tous les jours		Fumaient à l'occasion		Ne fumaient jamais	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	34,5	28,6–40,3	16,4	11,8–21,0	49,1	43,0–55,2
20–24	26,0	22,9–29,1	7,9	6,2–9,7	66,1	62,7–69,4
25–29	11,6	10,2–13,0	5,1	4,1–6,1	83,3	81,7–84,9
30–34	6,7	5,6–7,7	3,3	2,6–4,1	90,0	88,7–91,3
35–39	6,3	4,6–8,0	3,5 †	2,2–4,7	90,3	88,3–92,3
≥40	8,7 †	4,4–13,0	3,0 ‡	0,4–5,6	88,3	83,3–93,3
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	33,3	29,3–37,4	8,3	6,0–10,6	58,4	54,2–62,6
Diplôme d'études secondaires	21,5	19,2–23,8	7,4	6,0–8,8	71,0	68,6–73,5
Diplôme d'études postsecondaires	11,0	9,7–12,3	6,0	5,0–6,9	83,0	81,5–84,6
Diplôme universitaire	2,0	1,4–2,6	1,8 †	1,2–2,4	96,2	95,4–97,0
<b>Parité</b>						
Primipares	11,0	9,9–12,1	5,8	4,9–6,6	83,2	81,9–84,6
Multipares	12,2	11,1–13,3	4,2	3,5–4,9	83,6	82,4–84,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	21,1	18,8–23,4	7,3	5,9–8,8	71,6	69,0–74,1
Au-dessus du SFR	8,7	7,9–9,6	4,3	3,7–4,9	87,0	86,0–87,9
<b>Toutes les femmes</b>	<b>11,7</b>	<b>10,9–12,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4–5,4</b>	<b>83,5</b>	<b>82,6–84,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les trois mois précédant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

<b>Province/territoire</b>	<b>%</b>	<b>IC 95 %</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	30,5	25,9–35,1
Île-du-Prince-Édouard	34,3	30,4–38,1
Nouvelle-Écosse	28,5	24,5–32,4
Nouveau-Brunswick	26,7	22,5–30,9
Québec	22,3	20,0–24,6
Ontario	19,6	17,9–21,3
Manitoba	29,4	25,1–33,6
Saskatchewan	28,2	23,9–32,5
Alberta	22,0	18,9–25,0
Colombie-Britannique	21,0	18,1–23,9
Yukon	20,2	15,5–24,8
Territoires du Nord-Ouest	46,6	41,0–52,3
Nunavut	78,1	72,3–83,8
<b>Canada</b>	<b>22,0</b>	<b>21,1–23,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les trois mois précédant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	54,7	48,6–60,9
20–24	43,3	39,7–46,9
25–29	22,0	20,3–23,8
30–34	15,3	13,7–16,8
35–39	13,3	11,0–15,6
≥40	15,7 †	10,2–21,2
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	46,9	42,5–51,2
Diplôme d'études secondaires	35,8	33,2–38,5
Diplôme d'études postsecondaires	23,3	21,6–25,1
Diplôme universitaire	7,8	6,7–9,0
<b>Parité</b>		
Primipares	24,8	23,2–26,3
Multipares	19,9	18,5–21,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	33,9	31,1–36,7
Au-dessus du SFR	18,4	17,3–19,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>22,0</b>	<b>21,1–23,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les trois derniers mois de la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	10,9	7,7–14,0
Île-du-Prince-Édouard	19,6	16,3–22,9
Nouvelle-Écosse	13,5	10,5–16,6
Nouveau-Brunswick	13,7	10,6–16,9
Québec	10,9	9,2–12,5
Ontario	8,8	7,6–10,0
Manitoba	14,5	11,0–17,9
Saskatchewan	16,4	12,7–20,0
Alberta	11,8	9,4–14,2
Colombie-Britannique	8,5	6,4–10,6
Yukon	11,7 †	7,8–15,7
Territoires du Nord-Ouest	24,9	19,8–30,0
Nunavut	63,8	56,9–70,7
<b>Canada</b>	<b>10,5</b>	<b>9,8–11,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les trois derniers mois de la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<i>Âge de la mère (années)</i>		
15–19	28,9	23,4–34,4
20–24	23,6	20,5–26,7
25–29	9,9	8,5–11,2
30–34	6,2	5,1–7,2
35–39	6,6	4,9–8,3
≥40	9,9 †	5,3–14,5
<i>Niveau de scolarité de la mère</i>		
Études secondaires non terminées	32,2	28,2–36,3
Diplôme d'études secondaires	18,4	16,3–20,5
Diplôme d'études postsecondaires	10,2	8,9–11,5
Diplôme universitaire	1,7 †	1,2–2,3
<i>Parité</i>		
Primipares	9,1	8,1–10,2
Multipares	11,7	10,6–12,7
<i>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</i>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	20,0	17,7–22,3
Au-dessus du SFR	7,7	6,9–8,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>10,5</b>	<b>9,8–11,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	21,3	17,2–25,4
Île-du-Prince-Édouard	28,2	24,6–31,9
Nouvelle-Écosse	23,2	19,5–26,9
Nouveau-Brunswick	21,8	17,9–25,7
Québec	16,1	14,1–18,1
Ontario	14,7	13,2–16,2
Manitoba	21,3	17,5–25,1
Saskatchewan	24,2	20,0–28,3
Alberta	17,4	14,6–20,1
Colombie-Britannique	14,5	12,0–17,1
Yukon	13,5	9,4–17,7
Territoires du Nord-Ouest	41,0	35,4–46,7
Nunavut	80,4	75,0–85,8
<b>Canada</b>	<b>16,5</b>	<b>15,7–17,4</b>

IC – Intervalle de confiance.



**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<i>Âge de la mère (années)</i>		
15–19	50,9	44,8–57,0
20–24	33,9	30,6–37,3
25–29	16,7	15,1–18,3
30–34	10,0	8,7–11,3
35–39	9,7	7,7–11,7
≥40	11,7 †	6,7–16,7
<i>Niveau de scolarité de la mère</i>		
Études secondaires non terminées	41,6	37,4–45,8
Diplôme d'études secondaires	29,0	26,5–31,4
Diplôme d'études postsecondaires	17,0	15,4–18,6
Diplôme universitaire	3,8	3,0–4,6
<i>Parité</i>		
Primipares	16,8	15,4–18,1
Multipares	16,4	15,1–17,6
<i>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</i>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	28,4	25,9–31,0
Au-dessus du SFR	13,0	12,1–14,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>16,5</b>	<b>15,7–17,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes qui ont recommencé à fumer tous les jours ou à l'occasion, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, chez les femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion avant la grossesse et jamais dans les trois derniers mois de la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	48,1	36,4–59,8
Île-du-Prince-Édouard	58,9	48,1–69,8
Nouvelle-Écosse	46,7	34,5–58,9
Nouveau-Brunswick	58,7	44,8–72,5
Québec	44,9	37,1–52,6
Ontario	48,6	42,1–55,1
Manitoba	42,6	30,0–55,2
Saskatchewan	47,1	32,9–61,2
Alberta	51,7	40,1–63,3
Colombie-Britannique	40,8	30,5–51,1
Yukon	*	
Territoires du Nord-Ouest	69,3	58,7–79,8
Nunavut	82,5	68,6–96,4
<b>Canada</b>	<b>47,0</b>	<b>43,4–50,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

**Proportion de femmes qui ont recommencé à fumer tous les jours ou à l'occasion, dans les 5 à 14 mois suivant la grossesse, chez les femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours ou à l'occasion avant la grossesse et jamais dans les trois derniers mois de la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	69,0	58,0–79,9
20–24	50,6	42,9–58,3
25–29	45,5	39,2–51,9
30–34	42,4	35,5–49,4
35–39	44,0	31,7–56,3
≥40	*	
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	58,0	47,2–68,9
Diplôme d'études secondaires	55,1	48,6–61,7
Diplôme d'études postsecondaires	45,8	40,0–51,5
Diplôme universitaire	31,4	23,2–39,6
<b>Parité</b>		
Primipares	44,9	40,2–49,6
Multipares	50,6	44,9–56,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	57,2	50,1–64,2
Au-dessus du SFR	44,9	40,4–49,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>47,0</b>	<b>43,4–50,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

**Répartition du nombre de cigarettes fumées par jour, chez les femmes ayant indiqué qu'elles avaient fumé tous les jours, selon la période, Canada, 2006–2007**

Période de la grossesse	1-9		≥10	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Trois mois avant la grossesse	31,8	28,9-34,7	68,2	65,3-71,1
Trois derniers mois de la grossesse	57,6	53,1-62,1	42,4	37,9-46,9
Cinq-14 mois après la grossesse	40,9	37,4-44,5	59,1	55,6-62,6

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont déclaré avoir vécu avec un fumeur pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	31,8	27,1–36,4
Île-du-Prince-Édouard	34,1	30,3–38,0
Nouvelle-Écosse	31,5	27,1–35,8
Nouveau-Brunswick	26,2	21,9–30,5
Québec	20,0	17,9–22,1
Ontario	24,1	22,2–25,9
Manitoba	23,9	19,8–27,9
Saskatchewan	30,5	26,2–34,8
Alberta	25,1	22,1–28,2
Colombie-Britannique	19,7	16,8–22,6
Yukon	41,0	35,2–46,9
Territoires du Nord-Ouest	34,8	29,5–40,2
Nunavut	75,4	69,2–81,6
<b>Canada</b>	<b>23,4</b>	<b>22,4–24,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont déclaré avoir vécu avec un fumeur pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	62,1	56,1–68,0
20–24	42,9	39,5–46,2
25–29	22,7	20,8–24,6
30–34	17,3	15,6–19,0
35–39	14,5	12,2–16,9
≥40	19,6	13,6–25,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	50,4	46,0–54,9
Diplôme d'études secondaires	37,2	34,4–39,9
Diplôme d'études postsecondaires	23,2	21,4–25,0
Diplôme universitaire	10,1	8,8–11,4
<b>Parité</b>		
Primipares	23,9	22,4–25,4
Multipares	23,1	21,6–24,5
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	36,9	34,1–39,7
Au-dessus du SFR	19,0	17,9–20,2
<b>Toutes les femmes</b>	<b>23,4</b>	<b>22,4–24,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

# 11 Consommation d'alcool

Répartition de la consommation d'alcool dans les trois mois précédant la grossesse, selon la fréquence de la consommation d'alcool, Canada, 2006–2007

Fréquence	%	IC 95 %
Aucune consommation	37,6	36,4–38,8
Moins d'une fois par mois	14,4	13,5–15,3
Une fois par mois	12,0	11,2–12,8
Deux à trois fois par mois	10,4	9,6–11,2
Une fois par semaine	14,5	13,5–15,5
Deux à trois fois par semaine	8,8	8,1–9,6
Quatre à six fois par semaine	1,0	0,7–1,2
Tous les jours	1,3	1,0–1,6

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient consommé de l'alcool dans les trois mois précédant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	67,7	62,9–72,5
Île-du-Prince-Édouard	71,8	68,1–75,4
Nouvelle-Écosse	67,0	62,7–71,3
Nouveau-Brunswick	65,9	61,3–70,5
Québec	67,0	64,6–69,5
Ontario	58,8	56,7–61,0
Manitoba	64,5	59,7–69,3
Saskatchewan	69,6	65,0–74,2
Alberta	59,0	55,4–62,6
Colombie-Britannique	63,6	60,1–67,1
Yukon	61,9	56,1–67,7
Territoires du Nord-Ouest	74,4	69,4–79,5
Nunavut	40,9	34,0–47,8
<b>Canada</b>	<b>62,4</b>	<b>61,2–63,6</b>

IC – Intervalle de confiance.



## Répartition de la consommation d'alcool dans les trois mois précédant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 11.1]

Province/territoire	Buvaient fréquemment §		Buvaient peu fréquemment **		Ne buvaient pas	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	21,8	17,6–25,9	45,9	40,8–51,1	32,3	27,5–37,1
Île-du-Prince-Édouard	22,3	18,9–25,8	49,4	45,3–53,6	28,2	24,6–31,9
Nouvelle-Écosse	20,3	16,6–24,0	46,7	42,1–51,3	33,0	28,7–37,3
Nouveau-Brunswick	20,0	15,9–24,1	45,9	40,8–50,9	34,1	29,5–38,7
Québec	33,1	30,7–35,5	33,9	31,4–36,4	33,0	30,5–35,4
Ontario	24,1	22,2–25,9	34,8	32,7–36,8	41,2	39,0–43,3
Manitoba	21,0	17,0–24,9	43,6	38,8–48,3	35,5	30,7–40,3
Saskatchewan	19,5	15,7–23,3	50,1	45,3–54,9	30,4	25,8–35,0
Alberta	19,1	16,2–22,0	39,9	36,2–43,5	41,0	37,4–44,6
Colombie-Britannique	28,0	24,7–31,2	35,6	32,1–39,1	36,4	32,9–39,9
Yukon	25,5	20,3–30,8	36,4	30,5–42,2	38,1	32,3–43,9
Territoires du Nord-Ouest	24,9	19,9–29,9	49,5	44,2–54,9	25,6	20,5–30,6
Nunavut	13,2 †	8,2–18,3	27,7	21,2–34,1	59,1	52,2–66,0
<b>Canada</b>	<b>25,6</b>	<b>24,5–26,7</b>	<b>36,8</b>	<b>35,5–38,1</b>	<b>37,6</b>	<b>36,4–38,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ Une fois par semaine ou plus, y compris quotidiennement.

\*\* Deux à trois fois par mois ou moins.

**Répartition de la consommation d'alcool dans les trois mois précédant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 11.2 et Figure 11.3]

	Buvaient fréquemment §		Buvaient peu fréquemment **		Ne buvaient pas	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	18,3	13,7–22,8	41,5	35,7–47,4	40,2	34,4–46,0
20–24	19,1	16,3–21,9	40,3	36,9–43,7	40,6	37,1–44,1
25–29	23,4	21,5–25,3	38,8	36,5–41,0	37,8	35,6–40,1
30–34	28,6	26,6–30,6	35,2	33,1–37,3	36,2	34,1–38,4
35–39	30,6	27,5–33,8	34,1	30,8–37,4	35,3	32,0–38,6
≥40	28,6	21,6–35,6	28,5	21,4–35,6	43,0	35,4–50,5
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	12,5	9,6–15,3	34,4	30,2–38,6	53,1	48,7–57,6
Diplôme d'études secondaires	20,8	18,4–23,2	39,1	36,2–41,9	40,1	37,3–42,9
Diplôme d'études postsecondaires	25,1	23,2–26,9	39,4	37,3–41,5	35,6	33,5–37,6
Diplôme universitaire	32,0	30,0–34,0	33,8	31,7–35,9	34,2	32,1–36,3
<b>Parité</b>						
Primipares	31,1	29,4–32,8	37,0	35,1–38,8	31,9	30,2–33,7
Multipares	21,1	19,7–22,6	36,7	35,0–38,4	42,2	40,5–43,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	14,2	12,2–16,3	35,3	32,6–37,9	50,5	47,6–53,4
Au-dessus du SFR	29,4	28,0–30,7	38,1	36,7–39,6	32,5	31,1–33,9
<b>Toutes les femmes</b>	<b>25,6</b>	<b>24,5–26,7</b>	<b>36,8</b>	<b>35,5–38,1</b>	<b>37,6</b>	<b>36,4–38,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Une fois par semaine ou plus, y compris quotidiennement.

\*\* Deux à trois fois par mois ou moins.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient consommé de l'alcool pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	3,5 †	1,8–5,3
Île-du-Prince-Édouard	2,7 †	1,3–4,1
Nouvelle-Écosse	4,8 †	2,8–6,7
Nouveau-Brunswick	4,8 †	2,7–7,0
Québec	21,3	19,1–23,4
Ontario	8,9	7,7–10,2
Manitoba	3,8 †	1,9–5,8
Saskatchewan	5,3 †	3,0–7,5
Alberta	3,4 †	2,1–4,7
Colombie-Britannique	7,7	5,6–9,7
Yukon	8,0 †	4,9–11,1
Territoires du Nord-Ouest	7,8 †	4,7–10,9
Nunavut	7,4 †	3,7–11,1
<b>Canada</b>	<b>10,5</b>	<b>9,7–11,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

## Répartition de la consommation d'alcool pendant la grossesse, selon la province ou le territoire Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 11.1]

Province/territoire	Buvaient fréquemment §		Buvaient peu fréquemment **		Ne buvaient pas	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	*		3,5 †	1,8–5,3	96,5	94,7–98,2
Île-du-Prince-Édouard	*		2,7 †	1,3–4,1	97,3	95,9–98,7
Nouvelle-Écosse	*		4,8 †	2,8–6,7	95,2	93,3–97,2
Nouveau-Brunswick	*		4,5 †	2,4–6,7	95,2	93,0–97,3
Québec	1,6 †	0,9–2,3	19,6	17,6–21,7	78,8	76,6–80,9
Ontario	0,6 †	0,3–1,0	8,3	7,1–9,5	91,1	89,8–92,3
Manitoba	*		3,8 †	1,9–5,8	96,2	94,2–98,1
Saskatchewan	*		5,3 †	3,0–7,5	94,7	92,5–97,0
Alberta	*		2,9 †	1,7–4,1	96,6	95,3–97,9
Colombie-Britannique	*		7,3	5,3–9,2	92,3	90,3–94,4
Yukon	*		*		92,0	88,9–95,1
Territoires du Nord-Ouest	*		6,7 †	3,9–9,5	92,2	89,1–95,3
Nunavut	*		7,4 †	3,7–11,1	92,6	88,9–96,3
<b>Canada</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5–1,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,0–10,5</b>	<b>89,5</b>	<b>88,8–90,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ Une fois par semaine ou plus, y compris quotidiennement.

\*\* Deux à trois fois par mois ou moins.

**Répartition de la consommation d'alcool pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 11.2 et Figure 11.3]

	Buvaient fréquemment §		Buvaient peu fréquemment **		Ne buvaient pas	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	*		4,2 †	1,9–6,5	95,6	93,3–97,9
20–24	*		6,3	4,6–8,0	93,6	91,9–95,3
25–29	0,6 †	0,2–0,9	8,8	7,5–10,1	90,6	89,3–91,9
30–34	0,9 †	0,5–1,4	10,4	9,0–11,8	88,7	87,3–90,1
35–39	1,4 †	0,6–2,3	13,6	11,2–16,0	85,0	82,5–87,4
≥40	*		13,4 †	8,0–18,7	86,6	81,3–92,0
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	*		6,7 †	4,4–9,0	93,2	90,9–95,5
Diplôme d'études secondaires	0,7 ‡	0,2–1,3	8,6	6,9–10,2	90,7	89,0–92,4
Diplôme d'études postsecondaires	0,6 †	0,3–0,9	9,4	8,1–10,6	90,0	88,7–91,3
Diplôme universitaire	1,1 †	0,6–1,5	11,4	10,0–12,8	87,5	86,0–88,9
<b>Parité</b>						
Primipares	0,5 †	0,2–0,8	8,2	7,2–9,2	91,3	90,2–92,3
Multipares	0,9 †	0,6–1,3	11,0	9,9–12,0	88,1	87,0–89,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	0,4 ‡	0,0–0,8	7,3	5,8–8,8	92,3	90,7–93,8
Au-dessus du SFR	0,9	0,6–1,2	10,9	10,0–11,8	88,2	87,3–89,1
<b>Toutes les femmes</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5–1,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,0–10,5</b>	<b>89,5</b>	<b>88,8–90,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Une fois par semaine ou plus, y compris quotidiennement.

\*\* Deux à trois fois par mois ou moins.

**Proportion de femmes ayant bu moins de deux verres d'alcool et ayant bu au moins deux verres d'alcool les jours où elles en buvaient, chez les femmes ayant indiqué avoir bu fréquemment (au moins une fois par semaine) dans les trois mois avant la grossesse et pendant la grossesse, Canada, 2006–2007**

Le nombre de verres, les jours où elle consommait de l'alcool	Trois mois avant la grossesse		Pendant la grossesse	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<2	38,7	36,2–41,1	91,7	83,5–99,9
2 ou plus	61,3	58,9–63,8	*	

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

# 12 Consommation de drogues

Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient consommé des drogues de la rue, trois mois avant la grossesse et pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

Province/territoire	Trois mois avant la grossesse		Pendant la grossesse	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	6,3 †	3,9–8,6	*	
Île-du-Prince-Édouard	5,5 †	3,6–7,4	*	
Nouvelle-Écosse	8,9	6,3–11,5	*	
Nouveau-Brunswick	7,8 †	5,2–10,5	*	
Québec	6,6	5,3–8,0	1,0 †	0,5–1,5
Ontario	5,7	4,7–6,8	0,6 †	0,3–1,0
Manitoba	8,5	5,8–11,1	*	
Saskatchewan	6,7 †	4,2–9,1	*	
Alberta	7,3	5,4–9,1	1,5 †	0,6–2,4
Colombie-Britannique	8,3	6,4–10,3	1,6 †	0,6–2,5
Yukon	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	10,5 †	7,0–14,0	*	
Nunavut	26,6	20,3–33,0	8,7 †	4,6–12,7
<b>Canada</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1–7,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7–1,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant indiqué qu'elles avaient consommé des drogues de la rue, trois mois avant la grossesse et pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 12.1 et Figure 12.2]

	Trois mois avant la grossesse		Pendant la grossesse	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>				
15–19	25,0	19,9–30,1	3,4 †	1,2–5,5
20–24	16,2	13,8–18,7	3,4 †	2,2–4,6
25–29	6,6	5,5–7,7	0,7 †	0,3–1,1
30–34	3,1	2,3–3,9	0,3 ‡	0,1–0,5
35–39	3,5 †	2,2–4,7	*	
≥40	5,7 †	2,1–9,2	*	
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>				
Études secondaires non terminées	17,0	13,8–20,2	3,8 †	2,3–5,4
Diplôme d'études secondaires	12,0	10,2–13,8	1,7 †	0,9–2,4
Diplôme d'études postsecondaires	6,1	5,1–7,1	0,8 †	0,4–1,1
Diplôme universitaire	2,4	1,7–3,2	*	
<b>Parité</b>				
Primipares	10,3	9,1–11,4	1,2 †	0,8–1,7
Multipares	3,9	3,2–4,5	0,8 †	0,5–1,1
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	13,4	11,5–15,4	2,6 †	1,7–3,5
Au-dessus du SFR	4,9	4,2–5,5	0,5 †	0,3–0,7
<b>Toutes les femmes</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1–7,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7–1,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.



# 13 Violence physique

## Proportion de femmes ayant subi un ou plusieurs actes de violence au cours des deux dernières années, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 13.1]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	10,4	7,4–13,4
Île-du-Prince-Édouard	9,2	6,8–11,5
Nouvelle-Écosse	13,1	9,8–16,4
Nouveau-Brunswick	13,6	10,2–17,0
Québec	10,4	8,8–11,9
Ontario	9,4	8,1–10,6
Manitoba	17,4	13,7–21,2
Saskatchewan	15,2	11,7–18,6
Alberta	12,3	9,9–14,7
Colombie-Britannique	11,3	9,0–13,6
Yukon	16,4	11,9–20,9
Territoires du Nord-Ouest	35,5	30,1–40,8
Nunavut	34,5	27,6–41,4
<b>Canada</b>	<b>10,9</b>	<b>10,2–11,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant subi un ou plusieurs actes de violence au cours des deux dernières années, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 13.3 et Figure 13.4]

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	41,0	34,9–47,1
20–24	21,8	19,0–24,6
25–29	9,5	8,2–10,8
30–34	7,9	6,7–9,1
35–39	6,1	4,5–7,7
≥40	7,7 †	3,8–11,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	24,0	20,2–27,8
Diplôme d'études secondaires	16,2	14,1–18,3
Diplôme d'études postsecondaires	10,0	8,7–11,2
Diplôme universitaire	6,2	5,2–7,3
<b>Parité</b>		
Primipares	11,5	10,4–12,7
Multipares	10,5	9,4–11,5
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	21,0	18,7–23,3
Au-dessus du SFR	8,3	7,5–9,1
<b>Toutes les femmes</b>	<b>10,9</b>	<b>10,2–11,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant subi différentes formes de violence au cours des deux dernières années, parmi les femmes qui ont fait état de violence, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 13.2]

<b>Au cours des deux dernières années, est-ce que quelqu'un...</b>	<b>%</b>	<b>IC 95 %</b>
a menacé de vous frapper avec son poing ou tout autre objet qui aurait pu vous blesser?	49,1	45,4–52,8
vous a lancé un objet qui aurait pu vous blesser?	41,2	37,6–44,8
vous a poussée, agrippée ou bousculée d'une façon qui aurait pu vous blesser?	63,7	60,2–67,2
vous a giflée?	23,2	20,1–26,4
vous a donné un coup de pied, mordue ou frappée avec son poing?	30,6	27,3–33,9
vous a frappé avec un objet qui aurait pu vous blesser?	17,1	14,4–19,9
vous a frappée?	6,9	5,1–8,7
a tenté de vous étrangler?	10,2	8,0–12,4
a utilisé ou a menacé d'utiliser un fusil ou un couteau pour vous blesser?	7,8	5,8–9,8
vous a forcée à vous livrer à une activité sexuelle non désirée?	6,0	4,3–7,7

IC – Intervalle de confiance.

## Répartition du nombre d'actes de violence, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence, Canada, 2006–2007

Fréquence	%	IC 95 %
Une fois	43,4	39,6–47,1
Deux fois	19,9	16,8–23,0
Trois fois	7,7	5,6–9,8
Quatre à dix fois	16,7	13,8–19,6
11 fois ou plus	12,3	9,9–14,8

IC – Intervalle de confiance.

**Relation des femmes avec la personne qui a exercé de la violence à leur endroit, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence, Canada, 2006–2007 §**

<b>Personne abusive</b>	<b>%</b>	<b>IC 95 %</b>
Conjoint, mari ou copain	52,0	48,1–56,0
Membre de la famille	16,5	13,6–19,3
Ami(e) ou connaissance	13,0	10,5–15,6
Étranger	8,6	6,5–10,7
Autre	13,0	10,5–15,6

IC – Intervalle de confiance.

§ Les femmes pouvaient identifier plus d'une personne abusive

**Proportion de femmes ayant subi des actes de violence pendant la grossesse, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence, selon la province ou le territoire Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	27,2 †	13,6–40,8
Île-du-Prince-Édouard	29,4 †	17,0–41,7
Nouvelle-Écosse	33,6 †	21,3–45,8
Nouveau-Brunswick	37,2 †	24,8–49,5
Québec	25,1	17,5–32,6
Ontario	30,2	23,4–37,0
Manitoba	31,7 †	20,9–42,6
Saskatchewan	25,5 †	14,7–36,2
Alberta	34,0	23,9–44,1
Colombie-Britannique	39,8	28,9–50,8
Yukon	*	
Territoires du Nord-Ouest	19,3 †	11,8–26,7
Nunavut	27,6 †	16,8–38,4
<b>Canada</b>	<b>30,7</b>	<b>27,2–34,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Niveau de violence pendant la grossesse comparativement à avant la grossesse, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
Augmenté	5,4 ‡	1,6–9,3
Diminué	47,0	37,8–56,2
Resté le même	47,6	38,1–57,0

IC – Intervalle de confiance.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Variation du niveau de violence depuis la naissance du bébé, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence avant ou pendant la grossesse et après la naissance du bébé, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
Augmenté	16,3 †	8,3–24,2
Diminué	51,6	41,0–62,1
Resté le même	32,2	22,4–41,9

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.



**Proportion de femmes ayant indiqué avoir discuté du problème ou avoir reçu de l'information sur la conduite à tenir si elles subissaient des actes de violence, parmi les femmes ayant indiqué avoir subi des actes de violence, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	57,1	42,1–72,2
Île-du-Prince-Édouard	76,1	64,2–88,1
Nouvelle-Écosse	65,9	53,4–78,3
Nouveau-Brunswick	49,5	35,8–63,3
Québec	54,1	46,0–62,3
Ontario	66,4	59,9–72,9
Manitoba	53,6	41,3–65,9
Saskatchewan	65,8	53,7–77,8
Alberta	71,4	61,9–80,8
Colombie-Britannique	50,4	38,8–62,0
Yukon	70,3	56,9–83,7
Territoires du Nord-Ouest	64,5	55,3–73,8
Nunavut	56,3	44,0–68,5
<b>Canada</b>	<b>61,0</b>	<b>57,4–64,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

# 14 Stress et soutien social

## Répartition des niveaux de stress indiqués par les femmes dans les 12 mois précédant la naissance du bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 14.1]

Province/territoire	Pas stressants		Assez stressants		Très stressants	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	45,8	40,7–50,9	42,3	37,3–47,2	12,0	8,7–15,2
Île-du-Prince-Édouard	47,3	43,2–51,5	40,6	36,6–44,7	12,0	9,3–14,7
Nouvelle-Écosse	37,6	33,0–42,2	48,3	43,8–52,7	14,1	11,0–17,3
Nouveau-Brunswick	44,1	39,3–49,0	46,8	42,0–51,7	9,0	6,2–11,8
Québec	52,9	50,2–55,6	37,3	34,7–39,9	9,8	8,2–11,4
Ontario	38,3	36,2–40,4	47,5	45,3–49,7	14,2	12,7–15,7
Manitoba	28,3	23,8–32,8	56,1	51,1–61,1	15,6	12,0–19,2
Saskatchewan	42,3	37,6–47,1	47,2	42,3–52,2	10,4	7,4–13,4
Alberta	41,7	38,1–45,3	44,5	40,8–48,2	13,8	11,3–16,3
Colombie-Britannique	44,4	40,6–48,3	45,0	41,1–48,9	10,6	8,2–12,9
Yukon	33,6	27,9–39,2	56,3	50,4–62,2	10,1 †	6,5–13,8
Territoires du Nord-Ouest	49,8	43,9–55,7	42,0	36,1–47,8	8,2 †	5,0–11,4
Nunavut	53,0	46,1–59,9	37,5	30,6–44,3	9,5 †	5,3–13,8
<b>Canada</b>	<b>43,0</b>	<b>41,7–44,2</b>	<b>44,6</b>	<b>43,3–45,8</b>	<b>12,5</b>	<b>11,6–13,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Répartition des niveaux de stress indiqués par les femmes dans les 12 mois précédant la naissance du bébé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Pas stressants		Assez stressants		Très stressants	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	37,5	31,9–43,1	49,5	43,6–55,4	13,0 †	8,8–17,3
20–24	45,9	42,3–49,5	42,3	38,7–45,8	11,8	9,5–14,1
25–29	46,2	43,9–48,5	43,6	41,2–45,9	10,3	8,9–11,6
30–34	41,9	39,8–44,0	44,4	42,2–46,6	13,7	12,2–15,2
35–39	38,2	34,9–41,5	47,4	44,0–50,8	14,4	12,1–16,7
≥40	35,9	28,6–43,2	51,2	43,9–58,6	12,9 †	8,0–17,9
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	45,1	40,7–49,4	41,9	37,5–46,4	13,0	10,0–16,0
Diplôme d'études secondaires	42,9	40,1–45,7	44,6	41,7–47,4	12,5	10,7–14,3
Diplôme d'études postsecondaires	43,2	41,0–45,3	44,4	42,3–46,5	12,4	11,0–13,9
Diplôme universitaire	42,4	40,3–44,6	45,5	43,4–47,7	12,1	10,6–13,5
<b>Parité</b>						
Primipares	46,4	44,6–48,3	43,3	41,4–45,3	10,2	9,0–11,4
Multipares	40,2	38,6–41,9	45,6	44,0–47,3	14,2	13,0–15,4
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	40,3	37,4–43,2	44,0	41,1–47,0	15,7	13,6–17,7
Au-dessus du SFR	43,1	41,6–44,6	45,1	43,7–46,6	11,8	10,8–12,7
<b>Toutes les femmes</b>	<b>43,0</b>	<b>41,7–44,2</b>	<b>44,6</b>	<b>43,3–45,8</b>	<b>12,5</b>	<b>11,6–13,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Répartition du nombre d'événements stressants dans les 12 mois précédant la naissance du bébé, selon la province ou le territoire  
Canada, 2006–2007**

Province/territoire	Aucun		Un		Deux		Trois ou plus	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	40,8	35,8–45,8	27,2	22,6–31,8	16,5	12,8–20,3	15,5	11,8–19,2
Île-du-Prince-Édouard	34,9	31,0–38,8	25,2	21,4–28,9	21,4	17,9–24,9	18,6	15,3–21,8
Nouvelle-Écosse	36,1	31,6–40,6	26,5	22,3–30,7	14,6	11,4–17,7	22,9	18,8–26,9
Nouveau-Brunswick	39,4	34,6–44,3	22,0	17,9–26,0	12,4	9,1–15,7	26,2	21,6–30,9
Québec	43,8	41,2–46,4	27,3	24,8–29,8	14,0	12,1–15,9	14,9	13,0–16,8
Ontario	39,1	36,9–41,3	28,6	26,6–30,5	17,0	15,3–18,6	15,4	13,9–16,9
Manitoba	29,7	25,3–34,1	27,5	23,1–32,0	23,0	18,8–27,2	19,8	15,8–23,7
Saskatchewan	34,0	29,6–38,5	27,5	23,0–32,0	16,8	13,2–20,4	21,6	17,6–25,6
Alberta	36,3	32,8–39,7	27,8	24,4–31,1	15,5	12,7–18,3	20,5	17,5–23,4
Colombie-Britannique	37,7	34,0–41,4	28,4	24,9–31,8	15,6	12,9–18,4	18,3	15,4–21,3
Yukon	33,4	27,6–39,2	28,4	23,0–33,8	16,7	12,3–21,1	21,5	16,6–26,3
Territoires du Nord-Ouest	30,4	25,3–35,6	19,7	15,2–24,3	24,3	19,5–29,2	25,5	20,4–30,6
Nunavut	20,6	14,3–26,9	26,3	19,5–33,1	16,1 †	10,4–21,9	36,9	29,5–44,4
<b>Canada</b>	<b>39,1</b>	<b>37,9–40,3</b>	<b>27,8</b>	<b>26,7–29,0</b>	<b>16,0</b>	<b>15,1–16,9</b>	<b>17,1</b>	<b>16,2–18,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Répartition du nombre d'événements stressants dans les 12 mois précédant la naissance du bébé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 14.2]

	Aucun		Un		Deux		Trois ou plus	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	10,6 †	6,9–14,4	25,1	19,6–30,5	20,4	15,5–25,2	43,9	37,9–49,9
20–24	23,3	20,2–26,4	27,6	24,4–30,8	15,5	12,8–18,1	33,7	30,4–36,9
25–29	41,1	38,9–43,3	28,0	25,9–30,0	15,8	14,2–17,4	15,2	13,6–16,7
30–34	43,2	41,0–45,4	28,5	26,5–30,6	15,8	14,1–17,5	12,5	11,0–13,9
35–39	43,7	40,4–46,9	27,2	24,1–30,2	17,1	14,6–19,6	12,0	9,9–14,1
≥40	43,5	35,6–51,4	28,2	21,3–35,2	14,0 †	8,7–19,3	14,2 †	9,0–19,4
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	26,9	22,8–31,0	24,9	20,8–28,9	14,7	11,6–17,9	33,6	29,5–37,6
Diplôme d'études secondaires	31,1	28,4–33,8	25,3	22,8–27,8	17,4	15,3–19,6	26,2	23,7–28,6
Diplôme d'études postsecondaires	38,6	36,6–40,7	28,2	26,3–30,1	16,5	14,9–18,1	16,7	15,1–18,3
Diplôme universitaire	46,5	44,4–48,6	29,8	27,8–31,8	14,9	13,3–16,4	8,8	7,6–10,0
<b>Parité</b>								
Primipares	37,4	35,5–39,3	28,6	26,9–30,3	16,1	14,7–17,5	17,9	16,5–19,4
Multipares	40,5	38,8–42,2	27,3	25,7–28,9	15,9	14,6–17,2	16,3	15,1–17,6
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	25,6	22,8–28,4	24,0	21,4–26,6	15,8	13,7–18,0	34,5	31,7–37,3
Au-dessus du SFR	42,9	41,4–44,3	29,1	27,8–30,4	15,7	14,6–16,8	12,4	11,4–13,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>39,1</b>	<b>37,9–40,3</b>	<b>27,8</b>	<b>26,7–29,0</b>	<b>16,0</b>	<b>15,1–16,9</b>	<b>17,1</b>	<b>16,2–18,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

## Proportion de femmes ayant vécu différents événements stressants dans les 12 mois précédant la naissance du bébé, Canada, 2006–2007

Pendant les douze mois précédant la naissance du bébé...	%	IC 95 %
un membre de votre famille proche était très malade et a dû aller à l'hôpital	21,9	20,8–22,9
vous vous êtes séparée ou divorcée de votre mari ou de votre conjoint	4,6	4,1–5,1
vous avez déménagé	28,3	27,1–29,4
vous n'aviez pas de domicile	1,0	0,8–1,3
votre mari ou votre conjoint a perdu son emploi	7,5	6,8–8,1
vous avez perdu votre emploi, même si vous vouliez continuer à travailler	5,7	5,2–6,3
vous vous disputiez plus que d'habitude avec votre mari ou votre conjoint	16,3	15,3–17,2
votre mari ou votre conjoint a dit qu'il ne voulait pas que vous soyez enceinte	4,0	3,6–4,5
vous aviez beaucoup de factures que vous ne pouviez pas payer	11,4	10,6–12,2
vous avez été impliquée dans une bagarre	1,6	1,3–1,9
vous ou votre mari ou votre conjoint êtes allés en prison ou dans un centre de détention	1,1	0,9–1,4
un proche était alcoolique ou prenait de la drogue	9,0	8,4–9,7
un proche est décédé	15,6	14,7–16,5

IC – Intervalle de confiance.

Note: chaque situation stressante était une question distincte.

## Répartition de la fréquence du soutien dont ont bénéficié les femmes pendant la grossesse, selon la province ou le territoire Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 14.3]

Province/territoire	Toujours		La plupart du temps		Parfois		Rarement ou jamais	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	66,4	61,5–71,2	27,1	22,5–31,6	4,4 †	2,3–6,5	2,2 ‡	0,7–3,7
Île-du-Prince-Édouard	64,6	60,6–68,6	27,8	24,1–31,5	6,0 †	4,0–8,0	*	
Nouvelle-Écosse	67,9	63,5–72,2	25,6	21,5–29,8	3,7 †	1,9–5,5	2,8 †	1,3–4,3
Nouveau-Brunswick	65,7	60,8–70,6	25,5	21,0–29,9	5,0 †	2,8–7,2	3,8 †	1,8–5,8
Québec	51,7	49,0–54,3	30,0	27,5–32,5	9,2	7,7–10,8	9,1	7,4–10,7
Ontario	55,2	53,0–57,4	31,8	29,7–33,9	8,9	7,6–10,1	4,1	3,2–5,0
Manitoba	58,2	53,4–63,1	30,9	26,2–35,5	7,4 †	4,9–9,9	3,5 †	1,7–5,3
Saskatchewan	70,1	65,5–74,6	21,6	17,5–25,7	6,0 †	3,7–8,4	2,3 †	0,8–3,8
Alberta	62,1	58,6–65,6	27,7	24,4–31,0	6,6	4,8–8,4	3,6 †	2,2–5,0
Colombie-Britannique	62,5	58,7–66,2	27,5	24,0–30,9	5,7	3,9–7,5	4,4 †	2,8–6,0
Yukon	73,8	68,6–79,1	22,6	17,7–27,6	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	59,9	54,0–65,9	20,0	15,4–24,6	16,6	12,1–21,1	*	
Nunavut	47,2	39,9–54,5	21,9	15,8–28,1	15,9 †	10,7–21,2	15,0 †	9,7–20,3
<b>Canada</b>	<b>57,3</b>	<b>56,1–58,6</b>	<b>29,6</b>	<b>28,4–30,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,2–8,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,5–5,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition de la fréquence du soutien dont ont bénéficié les femmes pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Toujours		La plupart du temps		Parfois		Rarement ou jamais	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	64,3	58,7–69,9	22,7	17,8–27,5	7,7 †	4,5–10,9	5,4 †	2,6–8,1
20–24	62,0	58,7–65,3	28,1	25,0–31,2	5,0 †	3,4–6,6	4,9 †	3,3–6,5
25–29	60,6	58,4–62,8	28,7	26,6–30,8	5,7	4,6–6,8	5,0	4,0–6,1
30–34	56,8	54,5–59,0	29,4	27,3–31,5	9,2	7,9–10,6	4,6	3,6–5,5
35–39	49,6	46,1–53,1	32,5	29,3–35,6	11,8	9,6–14,0	6,2	4,5–7,8
≥40	40,9	33,7–48,0	40,5	33,2–47,8	10,1 †	5,5–14,7	8,6 †	4,2–12,9
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	56,2	51,8–60,5	26,6	22,7–30,6	8,7	6,1–11,3	8,5	6,0–11,0
Diplôme d'études secondaires	57,0	54,2–59,8	29,3	26,7–31,8	8,5	6,8–10,2	5,2	4,0–6,5
Diplôme d'études postsecondaires	59,3	57,2–61,4	28,3	26,4–30,3	6,9	5,8–7,9	5,5	4,4–6,5
Diplôme universitaire	55,9	53,7–58,1	31,8	29,8–33,9	8,4	7,1–9,7	3,8	2,9–4,7
<b>Parité</b>								
Primipares	61,6	59,8–63,5	27,7	26,0–29,4	6,7	5,7–7,6	4,0	3,2–4,8
Multipares	53,9	52,2–55,6	31,2	29,6–32,8	8,8	7,8–9,8	6,1	5,3–6,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	51,5	48,5–54,5	29,6	26,7–32,4	9,9	8,1–11,7	9,0	7,3–10,8
Au-dessus du SFR	59,0	57,5–60,4	30,1	28,7–31,5	7,0	6,2–7,8	3,9	3,3–4,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>57,3</b>	<b>56,1–58,6</b>	<b>29,6</b>	<b>28,4–30,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,2–8,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,5–5,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.



# 15 Lieu de l'accouchement

## Répartition du lieu de l'accouchement, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 15.1]

	%	IC 95 %
Hôpital ou clinique	97,9	97,5–98,3
Maison des naissances	0,8	0,6–1,0
À domicile	1,2	0,9–1,5
Autre	0,1 ‡	0,0–0,1

IC – Intervalle de confiance.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Proportion de femmes ayant accouché ailleurs qu'à l'hôpital, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 §**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	*	
Île-du-Prince-Édouard	*	
Nouvelle-Écosse	*	
Nouveau-Brunswick	*	
Québec	2,2 †	1,4–3,0
Ontario	2,9	2,1–3,7
Manitoba	2,4 †	0,9–4,0
Saskatchewan	*	
Alberta	0,9 ‡	0,2–1,7
Colombie-Britannique	1,4 †	0,6–2,2
Yukon	*	
Territoires du Nord-Ouest	*	
Nunavut	*	
<b>Canada</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7–2,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Les accouchements ailleurs qu'à l'hôpital incluent les naissances à domicile, au maison des naissances ou autres.

**Proportion de femmes ayant accouché ailleurs qu'à l'hôpital, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 §**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–24	0,6 ‡	0,1–1,2
25–29	1,8 †	1,2–2,3
30–34	2,3	1,6–3,0
≥35	3,6 †	2,4–4,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	0,9 ‡	0,1–1,7
Diplôme d'études secondaires	1,3 †	0,6–1,9
Diplôme d'études postsecondaires	1,8 †	1,2–2,4
Diplôme universitaire	3,0	2,2–3,8
<b>Parité</b>		
Primipares	1,3 †	0,9–1,8
Multipares	2,7	2,1–3,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	2,3 †	1,4–3,2
Au-dessus du SFR	2,0	1,5–2,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7–2,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Les accouchements ailleurs qu'à l'hôpital incluent les naissances à domicile, au maison des naissances ou autres.

# 16 Déplacement jusqu'au lieu de l'accouchement

Proportion de femmes qui se sont déplacées dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007

[Contient les données pour Figure 16.1]

Province/territoire	Ont parcouru ≤100 km		Ont parcouru >100 km		Ont parcouru une distance inconnue		N'ont pas voyagé	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	31,1	26,7–35,6	8,4 †	5,7–11,2	2,1 †	0,9–3,3	58,4	53,7–63,0
Île-du-Prince-Édouard	30,8	26,9–34,7	*		*		67,1	63,2–71,0
Nouvelle-Écosse	24,2	20,2–28,3	4,8 †	2,8–6,8	2,0 ‡	0,7–3,4	68,9	64,8–73,0
Nouveau-Brunswick	29,3	24,8–33,9	2,2 ‡	0,8–3,7	*		67,2	62,6–71,8
Québec	22,9	20,7–25,1	1,3 †	0,7–1,9	1,5 †	0,9–2,2	74,3	72,0–76,6
Ontario	21,2	19,4–23,0	0,9 †	0,5–1,3	0,7 †	0,3–1,1	77,2	75,3–79,0
Manitoba	17,0	13,5–20,4	5,2 †	3,1–7,4	*		77,8	74,1–81,5
Saskatchewan	19,7	15,9–23,4	8,7	6,1–11,2	1,7 ‡	0,5–3,0	69,9	66,0–73,8
Alberta	1,2	0,9–1,4	4,4 †	2,9–5,8	*		74,6	71,4–77,7
Colombie-Britannique	23,6	20,4–26,9	2,9 †	1,7–4,1	2,1 †	1,0–3,3	71,3	67,8–74,8
Yukon	*		23,0	17,9–28,1	*		75,2	70,0–80,4
Territoires du Nord-Ouest	*		40,3	34,6–46,0	7,2 †	4,1–10,2	49,2	43,4–55,1
Nunavut	*		37,9	30,7–45,0	23,9	17,7–30,1	36,0	29,1–42,9
<b>Canada</b>	<b>21,9</b>	<b>20,9–23,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1–2,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9–1,4</b>	<b>74,4</b>	<b>73,3–75,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Proportion de femmes qui se sont déplacées dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Ont parcouru ≤100 km		Ont parcouru >100 km		Ont parcouru une distance inconnue		N'ont pas voyagé	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	14,5	10,3–18,8	3,0 †	1,3–4,7	3,9 †	2,0–5,8	78,6	73,8–83,4
20–24	19,7	16,9–22,6	4,0	2,8–5,3	2,7 †	1,6–3,8	73,5	70,5–76,6
25–29	23,9	22,0–25,8	2,5	1,9–3,2	1,1 †	0,6–1,6	72,5	70,5–74,4
30–34	22,4	20,6–24,2	1,6	1,1–2,0	0,6 †	0,2–0,9	75,4	73,6–77,3
35–39	20,8	18,1–23,5	2,7 †	1,7–3,6	0,9 ‡	0,2–1,5	75,7	72,8–78,5
≥40	18,1	12,4–23,7	3,8 ‡	1,1–6,4	*		77,3	71,3–83,4
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	17,0	13,7–20,4	4,1 †	2,6–5,6	2,7 †	1,4–3,9	76,2	72,5–79,9
Diplôme d'études secondaires	21,7	19,2–24,1	4,1	3,0–5,1	1,6 †	1,0–2,2	72,6	70,1–75,2
Diplôme d'études postsecondaires	24,2	22,4–26,0	2,3	1,7–2,8	1,1 †	0,7–1,5	72,4	70,6–74,3
Diplôme universitaire	21,2	19,4–23,0	1,4	1,0–1,9	0,7 †	0,3–1,0	76,7	74,9–78,5
<b>Parité</b>								
Primipares	20,2	18,6–21,7	2,1	1,6–2,6	1,2 †	0,8–1,6	76,6	75,0–78,2
Multipares	23,4	21,9–24,9	2,8	2,3–3,2	1,2	0,8–1,6	72,6	71,1–74,2
<b>Type d'accouchement</b>								
Voie vaginale	21,9	20,7–23,2	2,1	1,7–2,5	1,2	0,9–1,6	74,7	73,4–76,0
Césarienne	21,9	19,8–24,0	3,4	2,6–4,3	1,0 †	0,5–1,4	73,7	71,4–75,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	13,8	11,8–15,8	2,6	1,8–3,3	2,1 †	1,3–2,9	81,5	79,3–83,8
Au-dessus du SFR	25,0	23,7–26,3	2,5	2,1–2,9	0,9	0,6–1,2	71,7	70,3–73,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>21,9</b>	<b>20,9–23,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1–2,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9–1,4</b>	<b>74,4</b>	<b>73,3–75,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Proportion de femmes qui se sont déplacées une distance quelconque dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007**

<b>Province/territoire</b>	<b>%</b>	<b>IC 95 %</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	41,6	37,0–46,3
Île-du-Prince-Édouard	32,9	29,0–36,8
Nouvelle-Écosse	31,1	27,0–35,2
Nouveau-Brunswick	32,8	28,2–37,4
Québec	25,7	23,4–28,0
Ontario	22,8	21,0–24,7
Manitoba	22,2	18,5–25,9
Saskatchewan	30,1	26,2–34,0
Alberta	25,4	22,3–28,6
Colombie-Britannique	28,7	25,2–32,2
Yukon	24,8	19,6–30,0
Territoires du Nord-Ouest	50,8	44,9–56,6
Nunavut	64,5	57,6–71,3
<b>Canada</b>	<b>25,6</b>	<b>24,4–26,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui se sont déplacées une distance quelconque dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	21,4	16,6–26,2
20–24	26,5	23,5–29,5
25–29	27,5	25,6–29,5
30–34	24,6	22,7–26,4
35–39	24,3	21,5–27,2
≥40	22,7	16,6–28,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	23,8	20,1–27,5
Diplôme d'études secondaires	27,4	24,8–29,9
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	25,7–29,4
Diplôme universitaire	23,3	21,5–25,1
<b>Parité</b>		
Primipares	23,4	21,8–25,0
Multipares	27,4	25,8–28,9
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	25,3	24,0–26,6
Césarienne	26,3	24,1–28,6
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	18,5	16,3–20,7
Au-dessus du SFR	28,3	27,0–29,7
<b>Toutes les femmes</b>	<b>25,6</b>	<b>24,4–26,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Répartition du nombre de nuits passées à l'extérieur de leur communauté avant d'accoucher, chez les femmes qui se sont déplacées dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, Canada, 2006–2007**

<b>Nombre de nuits</b>	<b>%</b>	<b>IC 95 %</b>
Aucune	77,2	75,2–79,2
1 nuit	11,2	9,7–12,7
2 à 5 nuits	6,9	5,7–8,1
≥6 nuits	4,7	3,9–5,6

IC – Intervalle de confiance.



**Répartition des opinions des femmes qui se sont déplacées dans une autre ville, un autre village ou une autre localité pour accoucher, selon la distance parcourue, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 16.2]

Opinion de la mère	Femmes ayant parcouru ≤100 km §		Femmes ayant parcouru >100 km §		Toutes les femmes qui se sont déplacées	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Très négative	1,7 †	1,0–2,3	14,0 †	8,8–19,1	3,1	2,2–3,9
Assez négative	7,6	6,2–9,0	14,1 †	9,2–19,1	8,4	7,1–9,7
Ni positive ni négative	38,0	35,3–40,6	17,0 †	11,4–22,7	35,5	33,2–37,9
Assez positive	18,7	16,5–20,9	24,2	18,1–30,3	19,7	17,7–21,7
Très positive	34,0	31,5–36,6	30,7	24,2–37,2	33,3	31,0–35,5

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ 100 femmes qui se sont déplacées mais qui ignoraient la distance parcourue ont été exclues.

# 17 Accoucheur

## Répartition du type d'accoucheur ayant assisté à l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 17.1]

Province/territoire	Obstétricien/gynécologue		Médecin de famille		Sage-femme §		Infirmière/infirmière praticienne		Autre **	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	71,5	67,0–76,0	10,6	7,6–13,5	2,6 †	1,0–4,1	9,5	6,6–12,4	5,9 †	3,7–8,1
Île-du-Prince-Édouard	91,1	88,7–93,6	5,0 †	3,1–6,9	*		*		*	
Nouvelle-Écosse	66,0	61,5–70,6	20,6	16,8–24,4	*		5,8 †	3,5–8,1	7,6 †	4,9–10,2
Nouveau-Brunswick	67,0	62,3–71,8	17,3	13,5–21,2	*		1,6 ‡	0,4–2,9	13,7	10,2–17,2
Québec	70,0	67,6–72,4	13,7	11,9–15,5	2,1 †	1,3–2,9	4,0	3,0–5,0	10,2	8,6–11,9
Ontario	78,0	76,2–79,8	6,8	5,7–8,0	6,4	5,3–7,5	4,9	4,0–5,9	3,8	3,0–4,6
Manitoba	60,4	55,8–65,1	20,2	16,6–23,9	6,5 †	4,0–8,9	6,5 †	4,1–9,0	6,3 †	3,8–8,9
Saskatchewan	56,0	51,0–61,0	31,6	27,0–36,2	*		4,8 †	2,7–7,0	7,6 †	4,9–10,3
Alberta	61,5	57,9–65,2	22,1	19,2–25,1	2,3 †	1,1–3,4	6,5	4,7–8,4	7,5	5,5–9,5
Colombie-Britannique	57,5	53,8–61,2	26,8	23,5–30,1	6,1	4,3–7,8	3,1 †	1,7–4,4	6,5	4,6–8,4
Yukon	39,0	33,3–44,8	50,8	45,0–56,6	*		*		*	
Territoires du Nord-Ouest	36,8	31,2–42,4	39,3	33,5–45,0	*		6,0 †	3,2–8,8	15,8	11,5–20,2
Nunavut	21,1	14,6–27,5	38,2	30,7–45,7	*		9,9 †	5,3–14,6	25,1	18,6–31,6
<b>Canada</b>	<b>69,6</b>	<b>68,5–70,8</b>	<b>14,6</b>	<b>13,8–15,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,7–4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,2–5,3</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1–7,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Les soins des sages-femmes sont actuellement autorisés en vertu de la loi dans sept provinces (Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Québec, Manitoba, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse) et dans les Territoires du Nord-Ouest<sup>3</sup> et financés par les fonds publics dans quatre provinces (Ontario, Colombie-Britannique, Québec, Manitoba) et dans les Territoires du Nord-Ouest<sup>4,5</sup>. Au Nunavut, les sages-femmes autorisées d'une province quelconque peuvent exercer et être rémunérées à la maison des naissances de Rankin Inlet<sup>4</sup>.

\*\* La catégorie « Autre » inclut les professionnels de la santé dont le type n'a pas été précisé par les mères, notamment les médecins dont la spécialisation n'a pas été précisée.

**Proportion de femmes ayant été suivies par le même professionnel de la santé pendant la grossesse et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 17.2]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	23,8	19,6–27,9
Île-du-Prince-Édouard	54,4	50,3–58,6
Nouvelle-Écosse	56,2	51,6–60,9
Nouveau-Brunswick	38,8	34,1–43,4
Québec	47,2	44,4–50,0
Ontario	49,6	47,3–51,8
Manitoba	44,2	39,6–48,7
Saskatchewan	50,0	45,3–54,8
Alberta	49,0	45,3–52,7
Colombie-Britannique	58,5	54,7–62,3
Yukon	76,5	71,6–81,5
Territoires du Nord-Ouest	34,1	28,7–39,5
Nunavut	38,4	31,5–45,3
<b>Canada</b>	<b>49,4</b>	<b>48,1–50,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant été suivies par le même professionnel de la santé pendant la grossesse et l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	55,1	49,2–61,1
20–24	49,8	46,2–53,4
25–29	48,2	45,9–50,4
30–34	49,0	46,8–51,1
35–39	52,6	49,1–56,0
≥40	44,4	36,8–52,0
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	52,2	47,6–56,7
Diplôme d'études secondaires	48,9	46,0–51,8
Diplôme d'études postsecondaires	49,8	47,7–52,0
Diplôme universitaire	48,9	46,8–51,0
<b>Parité</b>		
Primipares	46,9	45,0–48,8
Multipares	51,5	49,8–53,1
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	46,7	45,2–48,2
Césarienne	57,1	54,6–59,5
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	50,0	47,0–53,1
Au-dessus du SFR	49,3	47,9–50,8
<b>Toutes les femmes</b>	<b>49,4</b>	<b>48,1–50,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui estimaient qu'il était important d'être suivi par le même professionnel de la santé pendant leur grossesse et pendant le travail et l'accouchement, selon qu'elles aient ou non été suivies par le même professionnel, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
Le même professionnel de la santé pendant la grossesse et l'accouchement	88,4	87,3–89,5
Un différent professionnel de la santé pendant la grossesse et l'accouchement	42,3	40,5–44,1

IC – Intervalle de confiance.

# 18 Type d'accouchement

## Répartition du type d'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 18.1]

Province/territoire	Accouchement par voie vaginale spontané		Accouchement par voie vaginale assisté		Accouchement par voie vaginale non connu §		Césarienne planifiée		Césarienne non prévue	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	57,0	51,9–62,1	13,3	9,8–16,9	*		13,9	10,4–17,5	15,7	12,0–19,5
Île-du-Prince-Édouard	63,0	59,0–67,0	3,3 †	1,9–4,8	*		18,5	15,3–21,7	14,1	11,2–16,9
Nouvelle-Écosse	57,5	53,1–61,9	11,2	8,3–14,0	*		17,2	13,7–20,6	13,6	10,5–16,7
Nouveau-Brunswick	61,8	56,8–66,8	13,5	10,0–16,9	*		12,7	9,3–16,1	11,1	7,9–14,3
Québec	63,9	61,3–66,5	12,8	11,0–14,5	0,6 ‡	0,2–1,0	11,6	9,9–13,3	11,1	9,5–12,8
Ontario	60,2	58,1–62,3	12,0	10,6–13,4	0,5 ‡	0,2–0,8	14,1	12,5–15,7	13,2	11,8–14,6
Manitoba	69,4	64,8–73,9	6,9 †	4,3–9,4	*		13,3	10,1–16,5	9,9	6,9–12,9
Saskatchewan	61,0	56,1–65,8	13,9	10,5–17,2	*		10,2	7,4–13,0	14,4	11,1–17,7
Alberta	59,7	56,2–63,3	12,5	10,1–14,9	*		13,1	10,7–15,6	14,0	11,4–16,5
Colombie-Britannique	57,9	54,2–61,5	10,6	8,3–12,9	1,4 ‡	0,5–2,3	15,6	13,0–18,3	14,5	11,9–17,0
Yukon	73,6	68,5–78,8	*		*		11,3 †	7,6–15,0	12,0	8,2–15,7
Territoires du Nord-Ouest	70,5	65,2–75,9	5,8 †	3,2–8,5	*		13,5	9,5–17,5	7,1 †	4,1–10,0
Nunavut	79,7	73,7–85,6	*		7,3 †	3,5–11,1	5,9 †	2,3–9,4	*	
<b>Canada</b>	<b>61,1</b>	<b>59,9–62,4</b>	<b>11,9</b>	<b>11,1–12,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5–0,9</b>	<b>13,5</b>	<b>12,6–14,3</b>	<b>12,8</b>	<b>12,0–13,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Se rapporte aux femmes qui ont accouché par voie vaginale mais n'ont pas indiqué si on avait utilisé les forceps ou la ventouse obstétricale.

## Répartition du type d'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 18.1, Figure 18.2 et Figure 18.3]

	Accouchement par voie vaginale spontané		Accouchement par voie vaginale assisté		Accouchement par voie vaginale non connu §		Césarienne planifiée		Césarienne non prévue	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>										
15–19	61,1	55,2–66,9	16,4	12,0–20,9	2,1 ‡	0,6–3,6	3,9 †	1,5–6,2	16,5	12,2–20,8
20–24	68,1	64,8–71,5	10,7	8,5–12,9	1,6 †	0,7–2,6	6,6	4,9–8,3	13,0	10,5–15,4
25–29	63,5	61,3–65,7	12,0	10,6–13,5	0,6 ‡	0,2–1,0	11,2	9,7–12,6	12,7	11,2–14,2
30–34	58,5	56,3–60,6	12,9	11,5–14,4	0,3 ‡	0,1–0,6	15,5	13,9–17,1	12,8	11,4–14,2
35–39	57,6	54,3–61,0	10,3	8,2–12,5	0,6 ‡	0,1–1,2	19,7	17,0–22,4	11,7	9,6–13,8
≥40	48,6	40,9–56,3	8,9 †	4,8–13,0	*		26,6	19,7–33,4	16,0 †	10,2–21,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>										
Études secondaires non terminées	65,9	61,7–70,0	8,0	5,7–10,4	1,6 ‡	0,5–2,6	12,7	9,7–15,6	11,9	8,9–14,8
Diplôme d'études secondaires	64,0	61,3–66,6	10,4	8,6–12,2	0,9 †	0,4–1,5	13,7	11,7–15,7	11,0	9,2–12,8
Diplôme d'études postsecondaires	60,8	58,7–62,9	12,5	11,1–14,0	0,7 †	0,3–1,0	13,2	11,8–14,6	12,8	11,3–14,2
Diplôme universitaire	59,1	57,0–61,3	12,7	11,3–14,1	0,3 ‡	0,0–0,5	13,9	12,3–15,4	14,0	12,5–15,5
<b>Parité</b>										
Primipares	50,3	48,3–52,2	19,5	18,0–21,0	0,7 †	0,4–1,1	6,9	5,9–7,9	22,7	21,1–24,3
Multipares	70,2	68,6–71,8	5,7	4,9–6,5	0,6 †	0,3–0,9	18,8	17,5–20,2	4,7	4,0–5,4
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	65,6	62,8–68,4	10,1	8,3–12,0	1,4 †	0,7–2,2	12,5	10,5–14,4	10,3	8,6–12,1
Au-dessus du SFR	60,3	58,8–61,8	12,1	11,1–13,1	0,4 †	0,2–0,6	13,8	12,7–14,8	13,4	12,4–14,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>61,1</b>	<b>59,9–62,4</b>	<b>11,9</b>	<b>11,1–12,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5–0,9</b>	<b>13,5</b>	<b>12,6–14,3</b>	<b>12,8</b>	<b>12,0–13,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Se rapporte aux femmes qui ont accouché par voie vaginale mais n'ont pas indiqué si on avait utilisé les forceps ou la ventouse obstétricale.

**Proportion de femmes ayant donné naissance par voie vaginale ou par césarienne, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	Accouchement par voie vaginale		Césarienne	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	70,1	65,5–74,7	29,9	25,3–34,5
Île-du-Prince-Édouard	67,4	63,7–71,2	32,6	28,8–36,3
Nouvelle-Écosse	69,2	65,1–73,3	30,8	26,7–34,9
Nouveau-Brunswick	76,2	71,8–80,6	23,8	19,4–28,2
Québec	77,3	74,9–79,6	22,7	20,4–25,1
Ontario	72,7	70,7–74,6	27,3	25,4–29,3
Manitoba	76,8	72,7–80,8	23,2	19,2–27,3
Saskatchewan	75,4	71,2–79,6	24,6	20,4–28,8
Alberta	72,7	69,4–75,9	27,3	24,1–30,6
Colombie-Britannique	69,9	66,5–73,3	30,1	26,7–33,5
Yukon	76,7	71,9–81,6	23,3	18,4–28,1
Territoires du Nord-Ouest	79,5	74,7–84,2	20,5	15,8–25,3
Nunavut	90,7	86,4–95,1	9,3 †	4,9–13,6
<b>Canada</b>	<b>73,7</b>	<b>72,5–74,8</b>	<b>26,3</b>	<b>25,2–27,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.



**Proportion de femmes ayant donné naissance par voie vaginale ou par césarienne, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Accouchement par voie vaginale		Césarienne	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>				
15–19	79,6	74,8–84,4	20,4	15,6–25,2
20–24	80,3	77,5–83,2	19,7	16,8–22,5
25–29	76,1	74,2–78,1	23,9	21,9–25,8
30–34	71,6	69,7–73,6	28,4	26,4–30,3
35–39	68,6	65,4–71,8	31,4	28,2–34,6
≥40	57,4	49,7–65,1	42,6	34,9–50,3
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>				
Études secondaires non terminées	75,3	71,4–79,1	24,7	20,9–28,6
Diplôme d'études secondaires	75,2	72,7–77,7	24,8	22,3–27,3
Diplôme d'études postsecondaires	74,0	72,2–75,8	26,0	24,2–27,8
Diplôme universitaire	72,1	70,1–74,1	27,9	25,9–29,9
<b>Parité</b>				
Primipares	70,4	68,6–72,1	29,6	27,9–31,4
Multipares	76,5	75,0–77,9	23,5	22,1–25,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	77,2	74,8–79,6	22,8	20,4–25,2
Au-dessus du SFR	72,8	71,4–74,1	27,2	25,9–28,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>73,7</b>	<b>72,5–74,8</b>	<b>26,3</b>	<b>25,2–27,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

### Répartition des types d'accouchement assisté par voie vaginale, Canada, 2006–2007

	%	IC 95 %
Forceps seulement	3,6	3,1–4,1
Ventouse obstétricale seulement	7,1	6,5–7,8
Les deux (forceps et ventouse obstétricale)	1,2	0,9–1,4
<b>Toutes les femmes qui ont accouché par voie vaginale assisté</b>	<b>11,9</b>	<b>11,1–12,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont demandé une césarienne et proportion des femmes dont le professionnel de la santé a recommandé une césarienne à un moment donné pendant la grossesse, avant le travail et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	La femme a demandé à son professionnel de la santé d'accoucher par césarienne		Le professionnel de la santé avait recommandé une césarienne	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	7,7 †	4,9–10,5	17,1	13,3–21,0
Île-du-Prince-Édouard	10,9	8,3–13,5	19,1	15,9–22,3
Nouvelle-Écosse	10,1	7,2–12,9	21,9	18,2–25,6
Nouveau-Brunswick	8,4 †	5,6–11,2	14,6	11,0–18,2
Québec	5,4	4,2–6,6	12,3	10,5–14,1
Ontario	9,0	7,7–10,2	16,9	15,2–18,5
Manitoba	10,5	7,5–13,5	16,0	12,5–19,4
Saskatchewan	8,0	5,4–10,6	14,1	10,8–17,4
Alberta	8,4	6,4–10,4	16,0	13,4–18,7
Colombie-Britannique	9,0	7,0–11,0	18,1	15,2–21,0
Yukon	8,0 †	4,8–11,2	16,6	12,3–21,0
Territoires du Nord-Ouest	14,5	10,5–18,6	14,3	10,4–18,3
Nunavut	7,5 †	3,7–11,3	8,7 †	4,5–12,9
<b>Canada</b>	<b>8,1</b>	<b>7,4–8,7</b>	<b>15,8</b>	<b>14,8–16,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes dont l'accouchement par césarienne planifié était dû à des raisons médicales chez les femmes dont l'accouchement par césarienne était planifié, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	88,8	80,0–97,6
Île-du-Prince-Édouard	84,9	77,8–91,9
Nouvelle-Écosse	84,9	76,8–93,1
Nouveau-Brunswick	78,2	66,3–90,0
Québec	91,3	86,9–95,6
Ontario	85,8	81,7–89,9
Manitoba	90,9	82,8–99,0
Saskatchewan	83,1	71,3–94,8
Alberta	80,1	71,9–88,2
Colombie-Britannique	89,5	83,6–95,4
Yukon	70,6	54,7–86,5
Territoires du Nord-Ouest	74,1	60,7–87,4
Nunavut	100,0	100,0–100,0
<b>Canada</b>	<b>86,7</b>	<b>84,4–89,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

# 19 Position pour accoucher

## Répartition des positions pour accoucher adoptées par les femmes ayant accouché par voie vaginale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 19.1]

Province/territoire	Décubitus dorsal		Adossée/assise		Décubitus latéral		Autre	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	36,6	30,7–42,5	58,5	52,5–64,6	3,2 ‡	1,0–5,4	*	
Île-du-Prince-Édouard	24,2	19,9–28,4	71,8	67,2–76,4	*		*	
Nouvelle-Écosse	35,6	30,0–41,1	55,3	49,7–60,9	6,2 †	3,5–8,9	3,0 †	1,1–4,8
Nouveau-Brunswick	45,1	39,6–50,6	52,3	46,9–57,8	*		*	
Québec	57,2	54,2–60,2	38,4	35,4–41,3	2,0 †	1,2–2,9	2,4 †	1,4–3,4
Ontario	48,2	45,5–50,9	45,7	43,1–48,3	3,2	2,3–4,1	2,9	2,0–3,8
Manitoba	42,3	36,8–47,8	51,2	45,7–56,7	2,2 ‡	0,6–3,8	4,3 †	2,0–6,6
Saskatchewan	34,6	29,3–40,0	63,0	57,8–68,3	*		*	
Alberta	40,8	36,6–45,1	53,2	48,9–57,5	2,8 †	1,4–4,2	3,2 †	1,6–4,8
Colombie-Britannique	44,3	39,9–48,7	42,6	38,3–47,0	8,1	5,7–10,6	4,9 †	3,0–6,8
Yukon	21,1	15,7–26,5	59,5	53,0–66,1	*		13,0 †	8,4–17,6
Territoires du Nord-Ouest	32,5	26,4–38,6	53,9	47,4–60,3	*		11,0 †	7,1–14,9
Nunavut	63,3	56,0–70,6	30,0	23,2–36,9	*		*	
<b>Canada</b>	<b>47,9</b>	<b>46,4–49,4</b>	<b>45,8</b>	<b>44,3–47,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8–3,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5–3,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition des positions pour accoucher adoptées par les femmes ayant accouché par voie vaginale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Décubitus dorsal		Adossée/assise		Décubitus latéral		Autre	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	43,8	37,1–50,5	49,5	42,7–56,3	3,4 ‡	0,9–5,8	3,3 ‡	0,7–5,9
20–24	47,5	43,5–51,5	47,2	43,1–51,3	2,7 †	1,4–4,0	2,6 †	1,4–3,8
25–29	47,8	45,2–50,5	46,8	44,2–49,4	2,9	2,1–3,8	2,4 †	1,6–3,2
30–34	48,8	46,1–51,5	45,1	42,5–47,7	2,7	1,9–3,5	3,4	2,5–4,4
35–39	47,0	42,8–51,1	42,8	38,7–46,9	6,0 †	4,0–8,0	4,3 †	2,6–5,9
≥40	45,4	35,7–55,2	47,4	37,7–57,1	6,2 ‡	1,5–10,8	*	
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	50,0	44,6–55,3	44,8	39,6–50,1	2,4 ‡	0,8–4,0	2,8 †	1,2–4,5
Diplôme d'études secondaires	45,8	42,5–49,1	49,4	46,0–52,8	2,2 †	1,2–3,2	2,6 †	1,5–3,6
Diplôme d'études postsecondaires	47,0	44,6–49,5	47,0	44,5–49,5	3,5	2,6–4,4	2,5	1,7–3,3
Diplôme universitaire	48,9	46,3–51,5	43,0	40,5–45,6	4,1	3,1–5,2	4,0	3,0–4,9
<b>Parité</b>								
Primipares	49,3	47,0–51,6	45,1	42,8–47,4	3,1	2,3–3,8	2,5	1,8–3,2
Multipares	46,6	44,5–48,6	46,5	44,5–48,5	3,6	2,8–4,3	3,4	2,6–4,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	52,6	49,2–56,1	41,7	38,3–45,2	2,9 †	1,8–4,0	2,7 †	1,6–3,8
Au-dessus du SFR	45,4	43,6–47,2	48,0	46,2–49,8	3,5	2,8–4,2	3,2	2,5–3,8
<b>Toutes les femmes</b>	<b>47,9</b>	<b>46,4–49,4</b>	<b>45,8</b>	<b>44,3–47,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8–3,9</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5–3,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Proportion de femmes ayant accouché par voie vaginale et ne se trouvant pas en décubitus latéral au moment de la naissance qui ont utilisé des étriers, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 19.2]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	69,2	63,5–74,9
Île-du-Prince-Édouard	70,4	65,8–75,0
Nouvelle-Écosse	37,7	31,9–43,5
Nouveau-Brunswick	60,2	54,5–65,8
Québec	73,4	70,6–76,3
Ontario	51,6	49,0–54,2
Manitoba	54,2	48,5–59,9
Saskatchewan	62,9	57,5–68,3
Alberta	50,9	46,5–55,4
Colombie-Britannique	44,4	39,6–49,2
Yukon	39,2	32,4–46,0
Territoires du Nord-Ouest	49,1	42,5–55,8
Nunavut	54,6	47,1–62,1
<b>Canada</b>	<b>57,0</b>	<b>55,5–58,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant accouché par voie vaginale et ne se trouvant pas en décubitus latéral au moment de la naissance qui ont utilisé des étrières, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<i>Âge de la mère (années)</i>		
15–19	58,9	52,3–65,6
20–24	56,9	52,9–60,9
25–29	60,6	58,1–63,1
30–34	54,7	52,1–57,3
35–39	54,9	50,6–59,3
≥40	43,4	33,5–53,2
<i>Niveau de scolarité de la mère</i>		
Études secondaires non terminées	57,5	52,1–62,9
Diplôme d'études secondaires	55,8	52,3–59,2
Diplôme d'études postsecondaires	60,0	57,6–62,4
Diplôme universitaire	54,4	51,8–57,0
<i>Parité</i>		
Primipares	59,5	57,3–61,8
Multipares	55,2	53,2–57,3
<i>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</i>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	57,9	54,4–61,4
Au-dessus du SFR	56,3	54,6–58,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>57,0</b>	<b>55,5–58,5</b>

IC – Intervalle de confiance.



## 20 Déclenchement ou accélération du travail

**Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale dont le professionnel de la santé a essayé de déclencher ou d'accélérer le travail, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 20.1]

Province/territoire	Le professionnel de la santé a essayé de déclencher le travail		Le professionnel de la santé a essayé d'accélérer le travail	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	43,8	38,7–48,9	40,1	34,8–45,4
Île-du-Prince-Édouard	52,5	47,7–57,2	37,5	32,7–42,2
Nouvelle-Écosse	46,9	41,5–52,2	34,9	29,8–39,9
Nouveau-Brunswick	47,0	41,3–52,6	39,7	34,2–45,1
Québec	46,5	43,6–49,4	40,6	37,7–43,5
Ontario	46,4	44,1–48,8	37,7	35,3–40,0
Manitoba	39,1	33,7–44,4	34,6	29,3–39,9
Saskatchewan	43,6	38,4–48,8	33,4	28,2–38,5
Alberta	44,1	40,2–48,1	36,0	32,1–39,9
Colombie-Britannique	38,3	34,5–42,2	32,9	28,9–37,0
Yukon	32,1	26,0–38,1	24,7	19,1–30,4
Territoires du Nord-Ouest	33,9	28,1–39,7	31,0	25,4–36,5
Nunavut	21,6	15,6–27,6	16,1 †	10,6–21,5
<b>Canada</b>	<b>44,8</b>	<b>43,4–46,1</b>	<b>37,3</b>	<b>36,0–38,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale dont le professionnel de la santé a essayé de déclencher ou d'accélérer le travail, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Le professionnel de la santé a essayé de déclencher le travail		Le professionnel de la santé a essayé d'accélérer le travail	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<i>Âge de la mère (années)</i>				
15–19	48,5	42,0–54,9	36,2	30,2–42,1
20–24	42,7	39,0–46,4	35,0	31,2–38,8
25–29	46,5	44,0–48,9	38,5	36,2–40,9
30–34	43,6	41,2–46,0	39,2	36,8–41,5
35–39	45,6	41,9–49,4	33,4	29,9–37,0
≥40	45,6	36,6–54,6	36,8	28,0–45,6
<i>Niveau de scolarité de la mère</i>				
Études secondaires non terminées	44,7	39,9–49,6	34,0	29,4–38,7
Diplôme d'études secondaires	44,0	40,8–47,2	36,2	33,3–39,1
Diplôme d'études postsecondaires	46,8	44,6–49,1	38,2	36,0–40,4
Diplôme universitaire	43,3	40,9–45,6	37,7	35,4–40,0
<i>Parité</i>				
Primipares	50,7	48,7–52,7	44,7	42,8–46,7
Multipares	39,4	37,5–41,4	30,8	28,9–32,6
<i>Type d'accouchement</i>				
Voie vaginale	42,1	40,6–43,5	34,7	33,4–36,1
Césarienne	65,0	61,0–69,0	56,7	52,6–60,8
<i>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</i>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	46,0	42,8–49,3	32,7	29,7–35,8
Au-dessus du SFR	44,7	43,0–46,3	38,8	37,2–40,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>44,8</b>	<b>43,4–46,1</b>	<b>37,3</b>	<b>36,0–38,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

# 21 Monitoringage fœtal électronique

## Répartition de l'utilisation du monitoringage fœtal électronique (MFE) pendant le travail chez les femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 21.1]

Province/territoire	Moment du recours au MFE								Aucune utilisation du MFE	
	À l'arrivée uniquement		De temps en temps		En continu		Moment inconnu		%	IC 95 %
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %		
Terre-Neuve-et-Labrador	5,4 †	2,9–7,9	32,6	27,5–37,8	52,7	47,1–58,4	*		7,3 †	4,5–10,1
Île-du-Prince-Édouard	4,3 †	2,4–6,2	28,5	24,2–32,9	64,3	59,8–68,8	*		*	
Nouvelle-Écosse	4,6 †	2,4–6,9	23,1	18,6–27,7	64,7	59,8–69,7	2,6 †	0,9–4,3	4,9 †	2,6–7,1
Nouveau-Brunswick	4,8 †	2,5–7,2	29,4	24,5–34,3	58,6	53,4–63,9	1,8 ‡	0,4–3,2	5,3 †	2,7–8,0
Québec	4,7	3,5–5,9	20,2	17,9–22,5	66,9	64,2–69,7	1,0 †	0,5–1,6	7,1	5,6–8,6
Ontario	5,0	4,0–6,1	16,4	14,6–18,2	67,2	64,9–69,4	1,4 †	0,9–2,0	9,9	8,4–11,4
Manitoba	4,6 †	2,3–7,0	25,2	20,7–29,8	58,1	52,9–63,4	*		11,3	7,7–14,9
Saskatchewan	9,5 †	6,4–12,6	24,2	19,6–28,8	56,8	51,6–62,1	2,1 ‡	0,6–3,6	7,4 †	4,7–10,1
Alberta	6,1	4,2–8,0	26,4	22,7–30,1	59,6	55,5–63,7	1,5 †	0,6–2,5	6,4	4,4–8,3
Colombie-Britannique	4,6 †	2,9–6,3	27,1	23,4–30,8	49,2	45,0–53,4	3,0 †	1,6–4,5	16,0	13,0–19,1
Yukon	13,8 †	9,2–18,4	43,1	36,6–49,6	29,3	23,4–35,2	*		11,7 †	7,5–15,9
Territoires du Nord-Ouest	13,0	8,8–17,1	34,8	28,9–40,7	38,1	32,2–44,0	*		10,2 †	6,6–13,8
Nunavut	17,2 †	11,5–22,9	21,5	15,0–28,0	29,3	22,3–36,4	6,8 †	3,0–10,5	25,2	18,3–32,1
<b>Canada</b>	<b>5,2</b>	<b>4,6–5,8</b>	<b>21,1</b>	<b>19,9–22,3</b>	<b>62,9</b>	<b>61,5–64,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3–1,9</b>	<b>9,2</b>	<b>8,4–10,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition de l'utilisation de toute forme de monitoring fœtal électronique (MFE) pendant le travail chez les femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	92,7	89,9–95,5
Île-du-Prince-Édouard	98,6	97,5–99,7
Nouvelle-Écosse	95,1	92,9–97,4
Nouveau-Brunswick	94,7	92,0–97,3
Québec	92,9	91,4–94,4
Ontario	90,1	88,6–91,6
Manitoba	88,7	85,1–92,3
Saskatchewan	92,6	89,9–95,3
Alberta	93,6	91,7–95,6
Colombie-Britannique	84,0	80,9–87,0
Yukon	88,3	84,1–92,5
Territoires du Nord-Ouest	89,8	86,2–93,4
Nunavut	74,8	67,9–81,7
<b>Canada</b>	<b>90,8</b>	<b>90,0–91,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Répartition de l'utilisation de toute forme de monitoring fœtal électronique (MFE) pendant le travail chez les femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	93,6	90,5–96,7
20–24	91,4	89,4–93,5
25–29	91,7	90,4–93,1
30–34	90,6	89,1–92,0
35–39	88,1	85,5–90,6
≥40	86,5	80,7–92,4
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	92,1	89,5–94,7
Diplôme d'études secondaires	91,3	89,5–93,0
Diplôme d'études postsecondaires	92,5	91,3–93,7
Diplôme universitaire	88,4	86,9–89,9
<b>Parité</b>		
Primipares	94,0	93,0–94,9
Multipares	87,9	86,6–89,2
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	89,9	88,9–90,8
Césarienne	97,5	96,2–98,8
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	90,8	88,8–92,7
Au-dessus du SFR	90,7	89,7–91,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>90,8</b>	<b>90,0–91,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de l'utilisation du stéthoscope, de l'appareil Doppler ou du fœtoscope pour surveiller le rythme cardiaque du bébé pendant le travail chez les femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 21.2]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	36,6	30,9–42,4
Île-du-Prince-Édouard	21,8	17,9–25,8
Nouvelle-Écosse	28,5	23,5–33,5
Nouveau-Brunswick	20,4	15,8–25,1
Québec	25,6	22,9–28,2
Ontario	33,0	30,6–35,3
Manitoba	34,3	28,8–39,7
Saskatchewan	33,5	28,0–39,0
Alberta	35,6	31,5–39,7
Colombie-Britannique	43,4	39,0–47,8
Yukon	43,9	37,3–50,5
Territoires du Nord-Ouest	48,3	41,9–54,7
Nunavut	34,0	26,5–41,5
<b>Canada</b>	<b>32,3</b>	<b>31,0–33,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de l'utilisation du stéthoscope, de l'appareil Doppler ou du fœtoscope pour surveiller le rythme cardiaque du bébé pendant le travail chez les femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 21.3]

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	27,3	21,4–33,2
20–24	31,4	27,7–35,0
25–29	31,8	29,4–34,2
30–34	31,3	28,9–33,6
35–39	35,9	32,0–39,9
≥40	42,7	33,5–52,0
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	28,9	24,1–33,6
Diplôme d'études secondaires	31,2	28,0–34,3
Diplôme d'études postsecondaires	31,1	28,9–33,4
Diplôme universitaire	34,6	32,3–37,0
<b>Parité</b>		
Primipares	34,4	32,4–36,3
Multipares	30,3	28,4–32,2
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	30,8	29,4–32,3
Césarienne	43,8	39,6–48,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	31,5	28,4–34,6
Au-dessus du SFR	32,4	30,8–34,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>32,3</b>	<b>31,0–33,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes chez lesquelles l'auscultation du rythme cardiaque du fœtus pendant le travail a été effectuée exclusivement au moyen d'un stéthoscope, d'un appareil Doppler ou d'un fœtoscope, chez les femmes qui ont accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 §**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	3,1 ‡	1,1–5,2
Île-du-Prince-Édouard	*	
Nouvelle-Écosse	2,1 ‡	0,5–3,6
Nouveau-Brunswick	*	
Québec	4,7	3,4–6,0
Ontario	7,8	6,4–9,2
Manitoba	6,8 †	3,9–9,8
Saskatchewan	3,2 †	1,2–5,1
Alberta	4,5 †	2,7–6,3
Colombie-Britannique	11,7	8,8–14,7
Yukon	11,0 †	6,6–15,4
Territoires du Nord-Ouest	7,1 †	3,8–10,5
Nunavut	11,9 †	6,7–17,1
<b>Canada</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8–7,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Le monitoringage fœtal électronique n'a pas du tout été utilisé pendant le travail.



## 22 Rasage du pubis, lavement et poussée sur l'abdomen

Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale dont le pubis ou le périnée a été rasé, auxquelles on a administré un lavement ou chez lesquelles on a poussé sur le dessus de l'abdomen, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 22.1]

Province/territoire	Rasage du pubis ou du périnée		Lavement		Poussée sur l'abdomen §	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	20,8	16,5–25,2	3,6 †	1,5–5,8	11,6 †	7,7–15,6
Île-du-Prince-Édouard	13,2	9,9–16,4	4,4 †	2,4–6,4	11,4	8,0–14,9
Nouvelle-Écosse	14,3	10,5–18,0	1,9 ‡	0,5–3,3	16,3	12,3–20,4
Nouveau-Brunswick	20,9	16,5–25,4	6,7 †	3,9–9,5	14,7	10,3–19,0
Québec	12,1	10,2–14,0	6,2	4,7–7,6	12,7	10,6–14,8
Ontario	24,3	22,1–26,5	4,5	3,5–5,5	14,4	12,6–16,3
Manitoba	18,6	14,4–22,7	10,5 †	7,0–13,9	12,1	8,3–15,9
Saskatchewan	16,5	12,6–20,4	13,0	9,3–16,6	12,9	9,0–16,8
Alberta	16,5	13,5–19,5	3,4 †	1,9–4,9	12,3	9,3–15,2
Colombie-Britannique	21,9	18,6–25,2	5,5 †	3,5–7,4	10,9	7,9–13,9
Yukon	15,4	10,6–20,1	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	*		*		19,3	14,0–24,6
Nunavut	*		*		*	
<b>Canada</b>	<b>19,1</b>	<b>17,9–20,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,7–6,0</b>	<b>13,2</b>	<b>12,1–14,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Inclut uniquement les femmes ayant accouché par voie vaginale.

**Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale dont le pubis ou le périnée a été rasé, auxquelles on a administré un lavement ou chez lesquelles on a poussé sur le dessus de l'abdomen, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 22.2 et Figure 22.3]

	Rasage du pubis ou du périnée		Lavement		Poussée sur l'abdomen §	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	26,0	20,4–31,6	9,9 †	5,9–13,8	15,4	10,6–20,1
20–24	25,0	21,7–28,3	5,4	3,8–7,0	17,9	14,7–21,1
25–29	19,7	17,7–21,6	5,1	3,9–6,2	12,0	10,1–13,8
30–34	16,5	14,7–18,2	4,9	3,9–6,0	12,3	10,5–14,2
35–39	15,4	12,4–18,4	5,4	3,7–7,1	13,2	10,2–16,1
≥40	20,4 †	12,9–27,9	8,1 †	3,0–13,3	10,2 †	4,1–16,3
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	23,5	19,2–27,8	8,5 †	5,7–11,2	14,6	11,0–18,2
Diplôme d'études secondaires	24,6	21,8–27,4	6,6	5,1–8,1	14,5	12,1–16,9
Diplôme d'études postsecondaires	19,2	17,4–21,1	4,4	3,5–5,4	14,8	13,1–16,6
Diplôme universitaire	14,6	12,9–16,3	4,9	3,8–5,9	9,9	8,4–11,5
<b>Parité</b>						
Primipares	22,4	20,7–24,1	6,3	5,3–7,2	13,7	12,1–15,4
Multipares	16,0	14,5–17,5	4,5	3,7–5,3	12,6	11,3–14,0
<b>Type d'accouchement</b>						
Voie vaginale	15,7	14,6–16,9	5,1	4,5–5,8		
Césarienne	44,2	40,4–48,1	7,3	5,2–9,4		
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	25,8	22,9–28,7	6,9	5,2–8,6	17,4	14,7–20,0
Au-dessus du SFR	17,1	15,8–18,3	4,4	3,7–5,1	11,9	10,7–13,1
<b>Toutes les femmes</b>	<b>19,1</b>	<b>17,9–20,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,7–6,0</b>	<b>13,2</b>	<b>12,1–14,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ Inclut uniquement les femmes ayant accouché par voie vaginale.

**Proportion de femmes qui ont subi une poussée sur l'abdomen chez les femmes ayant accouché par voie vaginale, selon le type d'accoucheur, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
Obstétricien/gynécologue	14,4	13,0–15,8
Médecin de famille	12,3	10,1–14,5
Sage-femme	6,2 †	2,9–9,5
Infirmière/infirmière praticienne	8,2 †	5,0–11,5
Autre §	13,9	9,9–17,9
<b>Toutes les femmes</b>	<b>13,2</b>	<b>12,1–14,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ Inclut les professionnels de la santé dont le type n'a pas été précisé par les mères, notamment les médecins dont la spécialisation n'a pas été précisée.

## 23 Épisiotomie et points de suture dans la région du périnée

**Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont eu une épisiotomie ou des points de suture dans la région du périnée, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 23.1]

Province/territoire	Épisiotomie		Points de suture dans la région du périnée	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	20,4	15,7–25,1	61,8	56,4–67,2
Île-du-Prince-Édouard	12,8	9,7–15,9	65,2	60,8–69,7
Nouvelle-Écosse	19,4	15,2–23,7	67,9	62,8–72,9
Nouveau-Brunswick	19,3	15,0–23,6	71,5	66,4–76,5
Québec	24,1	21,6–26,6	71,3	68,6–73,9
Ontario	23,2	21,1–25,3	63,4	61,1–65,8
Manitoba	18,4	14,3–22,6	59,3	54,0–64,6
Saskatchewan	18,6	14,5–22,8	59,8	54,9–64,6
Alberta	12,9	10,3–15,6	59,7	55,8–63,6
Colombie-Britannique	16,3	13,0–19,6	57,8	53,6–62,0
Yukon	*		58,1	51,7–64,4
Territoires du Nord-Ouest	10,0 †	6,3–13,6	46,0	40,0–52,1
Nunavut	*		23,2	16,8–29,6
<b>Canada</b>	<b>20,7</b>	<b>19,6–21,8</b>	<b>64,1</b>	<b>62,8–65,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont eu une épisiotomie ou des points de suture dans la région du périnée, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 23.2 et Figure 23.3]

	Épisiotomie		Points de suture dans la région du périnée	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>				
15–19	14,4	10,2–18,6	63,2	57,1–69,2
20–24	17,4	14,4–20,3	59,5	55,8–63,2
25–29	21,7	19,7–23,8	64,3	62,0–66,7
30–34	20,7	18,8–22,7	65,6	63,3–67,9
35–39	23,3	19,9–26,7	64,8	61,1–68,4
≥40	19,5 †	12,2–26,8	63,5	54,9–72,1
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>				
Études secondaires non terminées	14,2	10,6–17,8	51,7	47,0–56,4
Diplôme d'études secondaires	17,7	15,3–20,0	59,6	56,5–62,6
Diplôme d'études postsecondaires	22,4	20,4–24,3	64,1	61,9–66,3
Diplôme universitaire	21,9	20,0–23,8	69,1	66,9–71,3
<b>Parité</b>				
Primipares	27,1	25,3–28,8	70,6	68,8–72,4
Multipares	15,0	13,6–16,4	58,2	56,3–60,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	19,7	17,1–22,4	59,6	56,5–62,7
Au-dessus du SFR	20,8	19,4–22,1	65,5	63,9–67,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>20,7</b>	<b>19,6–21,8</b>	<b>64,1</b>	<b>62,8–65,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui n'ont pas eu une épisiotomie ou des points de suture dans la région du périnée, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

<b>Province/territoire</b>	<b>%</b>	<b>IC 95 %</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	38,8	33,3–44,2
Île-du-Prince-Édouard	34,8	30,3–39,2
Nouvelle-Écosse	32,3	27,2–37,3
Nouveau-Brunswick	28,7	23,5–33,8
Québec	28,8	26,1–31,4
Ontario	36,3	33,9–38,7
Manitoba	40,5	35,2–45,8
Saskatchewan	40,7	35,7–45,6
Alberta	40,6	36,7–44,5
Colombie-Britannique	42,2	38,0–46,3
Yukon	41,6	35,0–48,1
Territoires du Nord-Ouest	54,0	47,9–60,1
Nunavut	78,6	72,2–84,9
<b>Canada</b>	<b>35,9</b>	<b>34,5–37,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

## 24 Gestion de la douleur

### Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont utilisé des techniques particulières pour calmer la douleur, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 24.1]

Technique	%	IC 95 %
Exercices de respiration	74,1	72,9–75,3
Changement de position	69,5	68,2–70,8
Marche	52,0	50,7–53,3
Massage	33,0	31,6–34,3
Bain ou douche	32,5	31,3–33,8
S'asseoir sur un ballon d'accouchement	18,1	17,1–19,0
Anesthésie épidurale ou spinale	57,3	56,0–58,5
Analgésiques	22,0	20,9–23,1
Gaz	20,5	19,5–21,5

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont eu une anesthésie épidurale ou spinale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 24.2]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	46,1	40,8–51,3
Île-du-Prince-Édouard	29,7	25,4–34,1
Nouvelle-Écosse	58,4	53,5–63,2
Nouveau-Brunswick	49,7	44,4–55,0
Québec	66,7	64,1–69,3
Ontario	60,7	58,4–63,0
Manitoba	50,3	44,9–55,6
Saskatchewan	56,8	51,7–61,9
Alberta	54,1	50,2–58,1
Colombie-Britannique	36,3	32,5–40,2
Yukon	24,2	18,7–29,8
Territoires du Nord-Ouest	28,5	23,3–33,7
Nunavut	13,0 †	8,0–17,9
<b>Canada</b>	<b>57,3</b>	<b>56,0–58,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.



**Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont eu une anesthésie épidurale ou spinale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	64,9	59,0–70,7
20–24	55,4	51,7–59,1
25–29	59,4	57,1–61,6
30–34	57,3	54,9–59,6
35–39	52,4	48,4–56,3
≥40	52,8	44,0–61,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	51,9	47,1–56,8
Diplôme d'études secondaires	52,7	49,6–55,7
Diplôme d'études postsecondaires	58,7	56,6–60,8
Diplôme universitaire	59,6	57,3–61,8
<b>Parité</b>		
Primipares	71,6	69,7–73,5
Multipares	44,3	42,4–46,2
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	53,6	52,2–55,0
Césarienne	84,4	81,5–87,3
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	50,7	47,4–54,0
Au-dessus du SFR	59,4	57,9–60,9
<b>Toutes les femmes</b>	<b>57,3</b>	<b>56,0–58,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Répartition des opinions des femmes sur l'efficacité des techniques pour calmer la douleur utilisées pendant le travail et l'accouchement, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 24.3]

Gestion de la douleur	Beaucoup aidée		Plutôt aidée		Pas du tout aidée	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Exercices de respiration	32,5	31,0–34,1	47,9	46,3–49,5	19,6	18,3–20,8
Changement de position	24,5	23,0–25,9	52,2	50,6–53,8	23,3	22,0–24,7
Marche	26,6	24,9–28,3	45,5	43,5–47,4	28,0	26,2–29,7
Massage	35,7	33,4–37,9	48,5	46,1–50,8	15,9	14,1–17,7
Bain ou douche	54,8	52,5–57,2	29,5	27,3–31,7	15,7	13,9–17,5
S'asseoir sur un ballon d'accouchement	35,4	32,4–38,5	36,7	33,7–39,8	27,8	25,0–30,7
Anesthésie épidurale ou spinale	81,1	79,7–82,6	11,4	10,2–12,6	7,5	6,5–8,5
Analgésiques	26,8	24,2–29,5	35,4	32,8–38,1	37,7	34,9–40,5
Gaz	22,5	20,0–25,1	37,0	34,1–40,0	40,4	37,4–43,5

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont utilisé des techniques avec médicaments, sans médicaments ou les deux pour calmer la douleur pendant le travail et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 24.4]

Province/territoire	Sans et avec médicaments		Sans médicaments uniquement		Avec médicaments uniquement		Aucune	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	76,4	71,8–81,0	20,0	15,7–24,2	2,2 ‡	0,7–3,8	*	
Île-du-Prince-Édouard	78,8	74,8–82,8	16,3	12,8–19,8	4,2 †	2,2–6,2	*	
Nouvelle-Écosse	78,0	73,6–82,5	13,5	9,8–17,2	6,9 †	4,2–9,6	*	
Nouveau-Brunswick	74,8	70,0–79,6	13,7	9,9–17,5	9,1 †	6,0–12,2	2,4 ‡	0,7–4,1
Québec	63,6	60,9–66,2	27,2	24,8–29,6	6,7	5,2–8,1	2,5 †	1,6–3,4
Ontario	68,5	66,2–70,7	22,9	21,0–24,9	6,4	5,2–7,7	2,2	1,5–2,9
Manitoba	73,9	69,2–78,6	20,8	16,5–25,2	2,8 †	1,0–4,5	2,5 ‡	0,8–4,2
Saskatchewan	78,5	74,1–82,9	16,9	12,9–20,9	3,5 †	1,6–5,5	*	
Alberta	72,8	69,3–76,3	20,6	17,4–23,8	4,2 †	2,6–5,8	2,4 †	1,1–3,6
Colombie-Britannique	70,1	66,3–73,9	22,6	19,1–26,0	5,0 †	3,0–6,9	2,2 †	0,9–3,4
Yukon	66,9	60,6–73,3	31,2	25,1–37,4	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	71,7	66,4–77,0	24,1	19,1–29,0	*		*	
Nunavut	40,5	33,3–47,6	54,2	46,8–61,6	*		*	
<b>Canada</b>	<b>68,9</b>	<b>67,6–70,2</b>	<b>23,0</b>	<b>21,9–24,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1–6,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8–2,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Proportion de femmes ayant accouché ou tenté d'accoucher par voie vaginale qui ont utilisé des techniques avec médicaments, sans médicaments ou les deux pour calmer la douleur pendant le travail et l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Sans et avec médicaments		Sans médicaments uniquement		Avec médicaments uniquement		Aucune	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	78,9	73,8–84,1	14,3	10,1–18,6	4,9 †	2,3–7,5	*	
20–24	69,4	65,9–73,0	21,5	18,4–24,6	6,5	4,6–8,4	2,3 †	1,1–3,4
25–29	70,3	68,1–72,6	21,6	19,6–23,6	5,6	4,4–6,8	2,5	1,7–3,3
30–34	68,9	66,7–71,1	23,6	21,6–25,6	5,6	4,4–6,7	1,9 †	1,2–2,6
35–39	62,8	59,0–66,6	28,8	25,1–32,4	6,2	4,2–8,1	2,3 †	1,2–3,4
≥40	66,6	58,3–74,8	26,0	18,3–33,7	6,2 ‡	1,9–10,6	*	
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	63,3	58,4–68,1	26,8	22,5–31,1	6,4 †	4,1–8,8	3,5 †	1,6–5,5
Diplôme d'études secondaires	68,4	65,5–71,3	23,2	20,6–25,8	6,0	4,5–7,5	2,2 †	1,2–3,1
Diplôme d'études postsecondaires	71,4	69,2–73,5	20,3	18,4–22,1	5,4	4,3–6,5	2,9	2,1–3,7
Diplôme universitaire	68,1	65,9–70,4	24,9	22,8–26,9	5,8	4,7–7,0	1,2 †	0,7–1,7
<b>Parité</b>								
Primipares	80,0	78,3–81,7	14,1	12,6–15,5	5,1	4,1–6,0	0,9 †	0,5–1,3
Multipares	58,9	57,0–60,8	31,1	29,3–32,9	6,5	5,6–7,5	3,4	2,7–4,2
<b>Type d'accouchement</b>								
Voie vaginale	66,7	65,3–68,1	25,1	23,8–26,3	5,8	5,1–6,6	2,4	1,9–2,9
Césarienne	85,5	82,7–88,3	7,7	5,4–10,0	5,5 †	3,7–7,4	1,1 ‡	0,2–1,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	62,7	59,5–65,9	27,2	24,3–30,1	6,5	4,8–8,2	3,5 †	2,3–4,8
Au-dessus du SFR	70,8	69,3–72,4	21,6	20,2–23,0	5,6	4,9–6,4	1,9	1,4–2,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>68,9</b>	<b>67,6–70,2</b>	<b>23,0</b>	<b>21,9–24,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1–6,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8–2,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition des types d'anesthésie que les femmes ont reçu pendant l'accouchement par césarienne, que l'accouchement par césarienne soit planifié ou non, Canada, 2006–2007**

	Anesthésie épidurale ou spinale uniquement		Anesthésie général uniquement		Les deux	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Césarienne planifiée	94,4	92,8–96,0	2,8 †	1,6–3,9	2,9 †	1,7–4,1
Césarienne non prévue	87,2	84,8–89,7	4,8	3,3–6,3	8,0	6,1–9,9
<b>Toutes les femmes qui ont accouchement par césarienne</b>	<b>90,9</b>	<b>89,5–92,3</b>	<b>3,8</b>	<b>2,8–4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3–6,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant subi une anesthésie générale pendant l'accouchement par césarienne, que l'accouchement par césarienne soit planifié ou non, Canada, 2006–2007 §**

	%	IC 95 %
Césarienne planifiée	5,6	4,0–7,2
Césarienne non prévue	12,8	10,3–15,2
<b>Toutes les femmes qui ont accouchement par césarienne</b>	<b>9,1</b>	<b>7,7–10,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ Inclut les femmes qui avaient eu une anesthésie générale, sans ou avec une anesthésie épidurale ou spinale.

**Proportion de femmes ayant reçu suffisamment d'information sur l'utilisation de techniques sans médicaments pour calmer la douleur et sur les effets secondaires éventuels des analgésiques et de l'anesthésie, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 24.5]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	76,6	72,4–80,8
Île-du-Prince-Édouard	82,7	79,6–85,8
Nouvelle-Écosse	75,7	71,6–79,8
Nouveau-Brunswick	73,9	69,4–78,3
Québec	70,3	67,9–72,7
Ontario	79,6	77,9–81,4
Manitoba	80,0	76,2–83,8
Saskatchewan	77,8	73,9–81,8
Alberta	80,4	77,5–83,3
Colombie-Britannique	78,2	75,1–81,2
Yukon	84,9	80,5–89,3
Territoires du Nord-Ouest	70,1	64,9–75,3
Nunavut	50,5	43,2–57,7
<b>Canada</b>	<b>77,0</b>	<b>75,9–78,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant reçu suffisamment d'information sur l'utilisation de techniques sans médicaments pour calmer la douleur et sur les effets secondaires éventuels des analgésiques et de l'anesthésie, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	68,1	62,5–73,7
20–24	70,4	67,2–73,7
25–29	77,6	75,7–79,4
30–34	78,5	76,6–80,3
35–39	78,5	75,7–81,4
≥40	84,7	79,1–90,3
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	73,2	69,1–77,3
Diplôme d'études secondaires	73,7	71,2–76,2
Diplôme d'études postsecondaires	78,1	76,4–79,9
Diplôme universitaire	78,9	77,1–80,7
<b>Parité</b>		
Primipares	75,5	73,9–77,1
Multipares	78,2	76,7–79,7
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	77,3	76,1–78,5
Césarienne	76,0	73,9–78,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	73,1	70,5–75,8
Au-dessus du SFR	78,4	77,2–79,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>77,0</b>	<b>75,9–78,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

## 25 Soutien pendant le travail et l'accouchement

**Proportion de femmes qui avaient à leurs côtés leur mari ou conjoint ou encore une compagne ou un compagnon pendant le travail et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 25.1]

Province/territoire	Mari ou conjoint présent pendant le travail		Mari ou conjoint présent pendant l'accouchement		Compagne ou compagnon présent pendant le travail ou l'accouchement	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	89,3	86,1–92,5	86,2	82,7–89,7	46,1	41,3–51,0
Île-du-Prince-Édouard	90,5	88,0–93,1	87,0	84,1–89,8	49,1	45,0–53,1
Nouvelle-Écosse	93,1	90,6–95,6	89,7	86,8–92,6	42,0	37,4–46,6
Nouveau-Brunswick	93,1	90,5–95,8	90,5	87,5–93,5	40,8	36,1–45,6
Québec	95,7	94,6–96,8	94,4	93,1–95,7	28,9	26,5–31,3
Ontario	94,6	93,6–95,6	91,8	90,5–93,0	36,1	34,0–38,2
Manitoba	90,3	87,3–93,4	89,6	86,6–92,6	40,2	35,4–44,9
Saskatchewan	91,9	89,2–94,6	86,9	83,5–90,3	34,0	29,6–38,4
Alberta	95,6	94,0–97,1	93,1	91,3–95,0	38,1	34,5–41,7
Colombie-Britannique	95,9	94,4–97,5	94,3	92,5–96,1	38,5	34,8–42,2
Yukon	96,6	94,4–98,8	94,9	92,3–97,5	42,4	36,8–47,9
Territoires du Nord-Ouest	75,3	70,4–80,2	68,3	63,0–73,5	49,9	44,4–55,5
Nunavut	36,3	28,9–43,7	37,8	30,4–45,2	57,7	50,5–64,9
<b>Canada</b>	<b>94,6</b>	<b>94,1–95,2</b>	<b>92,3</b>	<b>91,6–93,0</b>	<b>35,5</b>	<b>34,2–36,7</b>

IC – Intervalle de confiance.



**Proportion de femmes qui avaient à leurs côtés leur mari ou conjoint ou encore une compagne ou un compagnon pendant le travail et l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 25.2]

	Mari ou conjoint présent pendant le travail		Mari ou conjoint présent pendant l'accouchement		Compagne ou compagnon présent pendant le travail ou l'accouchement	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	83,8	79,4–88,2	78,8	73,9–83,6	73,0	67,8–78,2
20–24	90,7	88,7–92,7	87,6	85,4–89,9	55,3	51,9–58,7
25–29	95,7	94,8–96,6	93,7	92,6–94,8	36,4	34,2–38,6
30–34	95,6	94,8–96,5	93,9	92,9–94,9	28,6	26,6–30,7
35–39	95,7	94,3–97,1	92,8	91,0–94,5	26,0	23,0–28,9
≥40	94,5	90,8–98,1	91,0	86,6–95,4	24,3	17,8–30,9
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	86,7	83,8–89,6	83,6	80,4–86,9	47,6	43,3–52,0
Diplôme d'études secondaires	92,3	90,7–93,8	89,5	87,8–91,3	44,6	41,7–47,5
Diplôme d'études postsecondaires	95,1	94,2–96,0	92,5	91,3–93,6	35,2	33,1–37,2
Diplôme universitaire	97,4	96,7–98,1	95,8	94,9–96,7	27,7	25,8–29,7
<b>Parité</b>						
Primipares	95,3	94,6–96,1	92,4	91,4–93,4	44,9	43,0–46,8
Multipares	94,1	93,3–94,9	92,4	91,4–93,3	27,6	26,1–29,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	85,9	83,8–87,9	83,1	80,9–85,4	47,3	44,4–50,2
Au-dessus du SFR	97,5	97,0–98,0	95,5	94,8–96,1	31,6	30,2–33,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>94,6</b>	<b>94,1–95,2</b>	<b>92,3</b>	<b>91,6–93,0</b>	<b>35,5</b>	<b>34,2–36,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du soutien qu'elles ont reçu de leur mari ou conjoint ou encore de leur compagne ou compagnon pendant le travail et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	Très satisfaites du soutien reçu du mari ou du conjoint pendant le travail		Très satisfaites du soutien reçu du mari ou du conjoint pendant l'accouchement		Très satisfaites du soutien reçu de la compagne ou du compagnon pendant le travail ou l'accouchement	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	88,0	84,6–91,5	92,0	89,0–94,9	88,1	83,4–92,9
Île-du-Prince-Édouard	84,0	80,8–87,3	88,1	85,2–91,0	91,1	87,8–94,4
Nouvelle-Écosse	81,9	78,0–85,9	90,3	87,3–93,3	89,9	85,6–94,2
Nouveau-Brunswick	86,9	83,3–90,5	91,6	88,7–94,6	88,6	83,8–93,3
Québec	81,1	79,0–83,2	84,6	82,6–86,6	79,3	75,4–83,3
Ontario	83,5	81,8–85,1	87,8	86,3–89,3	87,3	85,0–89,7
Manitoba	79,6	75,4–83,8	84,6	80,6–88,6	83,7	77,9–89,5
Saskatchewan	80,4	76,3–84,5	85,9	82,2–89,6	84,2	78,2–90,2
Alberta	83,0	80,1–85,8	88,2	85,8–90,6	89,3	85,6–93,1
Colombie-Britannique	83,9	81,0–86,9	87,4	84,8–90,0	86,7	82,5–90,8
Yukon	79,4	74,7–84,1	86,0	81,8–90,2	89,0	83,3–94,6
Territoires du Nord-Ouest	73,4	67,6–79,2	86,8	81,9–91,8	92,9	89,0–96,9
Nunavut	76,5	66,3–86,6	80,4	72,0–88,8	73,0	64,8–81,2
<b>Canada</b>	<b>82,7</b>	<b>81,7–83,7</b>	<b>87,0</b>	<b>86,1–87,9</b>	<b>85,8</b>	<b>84,4–87,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du soutien qu'elles ont reçu de leur mari ou conjoint ou encore de leur compagne ou compagnon pendant le travail et l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 25.3]

	Très satisfaites du soutien reçu du mari ou du conjoint pendant le travail		Très satisfaites du soutien reçu du mari ou du conjoint pendant l'accouchement		Très satisfaites du soutien reçu de la compagne ou du compagnon pendant le travail ou l'accouchement	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	66,1	59,8–72,5	74,2	68,1–80,3	80,4	74,7–86,1
20–24	78,4	75,3–81,4	84,9	82,1–87,6	86,7	83,5–89,9
25–29	83,3	81,5–85,1	87,1	85,5–88,7	86,2	83,6–88,7
30–34	84,8	83,1–86,4	88,5	87,1–89,9	85,4	82,5–88,2
35–39	83,4	80,6–86,1	87,8	85,5–90,2	87,5	83,1–91,9
≥40	83,0	76,9–89,0	85,6	79,8–91,4	81,0	68,9–93,2
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	75,3	71,0–79,6	80,4	76,3–84,6	83,9	79,6–88,3
Diplôme d'études secondaires	81,1	78,8–83,5	85,9	83,7–88,0	86,3	83,3–89,4
Diplôme d'études postsecondaires	82,2	80,5–83,9	86,5	85,0–88,1	84,6	82,1–87,2
Diplôme universitaire	85,6	84,0–87,1	89,1	87,8–90,5	87,8	85,1–90,5
<b>Parité</b>						
Primipares	82,5	81,0–84,0	87,8	86,5–89,2	86,4	84,5–88,4
Multipares	82,9	81,5–84,3	86,2	85,0–87,5	84,8	82,6–87,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	78,8	76,2–81,4	83,9	81,5–86,3	82,2	79,1–85,4
Au-dessus du SFR	83,5	82,3–84,6	87,5	86,5–88,5	86,5	84,8–88,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>82,7</b>	<b>81,7–83,7</b>	<b>87,0</b>	<b>86,1–87,9</b>	<b>85,8</b>	<b>84,4–87,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui avaient reçu suffisamment d'information sur ce que leur mari ou conjoint pouvait faire pour les aider pendant le travail et l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007**

<b>Province/territoire</b>	<b>%</b>	<b>IC 95 %</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	93,6	91,1–96,0
Île-du-Prince-Édouard	95,1	93,3–96,9
Nouvelle-Écosse	90,7	88,0–93,5
Nouveau-Brunswick	92,4	89,6–95,1
Québec	89,8	88,2–91,4
Ontario	92,8	91,7–94,0
Manitoba	90,3	87,3–93,4
Saskatchewan	94,0	91,6–96,4
Alberta	93,1	91,2–94,9
Colombie-Britannique	93,8	92,1–95,6
Yukon	98,2	96,7–99,8
Territoires du Nord-Ouest	85,9	81,8–90,0
Nunavut	67,1	60,0–74,3
<b>Canada</b>	<b>92,1</b>	<b>91,4–92,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

## 26 Contact entre la mère et le nourrisson à la naissance

### Répartition des types de contact entre la mère et le nourrisson après la naissance, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 §

[Contient les données pour Figure 26.1]

Province/territoire	Contact avec le nourrisson dans les cinq minutes		Mère et nourrisson nus au premier contact		Nourrisson dans le lit de la mère la première heure suivant la naissance	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	62,2	57,0–67,4	11,8	8,4–15,3	29,1	24,2–34,0
Île-du-Prince-Édouard	72,0	68,1–75,8	13,8	10,8–16,8	35,1	30,8–39,4
Nouvelle-Écosse	66,6	61,8–71,5	17,0	13,2–20,9	42,8	37,9–47,8
Nouveau-Brunswick	71,1	66,0–76,3	24,9	19,8–29,9	41,5	35,8–47,2
Québec	80,0	77,7–82,3	50,2	47,4–53,0	55,3	52,5–58,0
Ontario	69,4	67,2–71,6	24,7	22,6–26,7	43,6	41,3–46,0
Manitoba	68,9	63,9–73,9	20,6	16,2–25,0	34,9	30,0–39,9
Saskatchewan	66,4	61,4–71,4	13,9	10,3–17,6	36,1	30,8–41,5
Alberta	69,1	65,4–72,7	23,8	20,4–27,2	38,1	34,1–42,0
Colombie-Britannique	71,4	67,9–75,0	35,0	31,1–38,9	46,9	42,9–51,0
Yukon	89,2	85,5–92,9	62,2	56,4–68,0	60,6	54,5–66,6
Territoires du Nord-Ouest	79,7	74,6–84,7	32,2	26,7–37,8	47,9	41,7–54,2
Nunavut	82,7	76,7–88,7	44,4	36,8–52,1	34,8	27,1–42,5
<b>Canada</b>	<b>71,9</b>	<b>70,7–73,2</b>	<b>31,1</b>	<b>29,8–32,3</b>	<b>45,3</b>	<b>43,9–46,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Les femmes dont le bébé a été admis dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux immédiatement après la naissance sont exclues.

**Répartition des types de contact entre la mère et le nourrisson après la naissance, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 §**

	Contact avec le nourrisson dans les cinq minutes		Mère et nourrisson nus au premier contact		Nourrisson dans le lit de la mère la première heure suivant la naissance	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	65,2	58,9–71,6	18,1	13,2–23,1	40,0	33,7–46,3
20–24	72,1	68,8–75,4	24,6	21,4–27,8	44,5	40,8–48,2
25–29	73,5	71,3–75,6	29,8	27,7–32,0	44,3	42,0–46,7
30–34	72,3	70,2–74,4	34,5	32,3–36,8	47,1	44,8–49,5
35–39	70,5	67,2–73,7	34,2	30,5–37,8	46,1	42,6–49,7
≥40	62,8	54,9–70,7	31,4	23,9–38,9	40,8	32,8–48,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	68,4	64,0–72,8	19,7	15,8–23,6	39,4	34,7–44,1
Diplôme d'études secondaires	68,5	65,7–71,4	24,8	22,2–27,5	41,0	38,1–43,9
Diplôme d'études postsecondaires	72,2	70,2–74,3	31,1	29,0–33,2	45,3	43,1–47,6
Diplôme universitaire	74,1	72,0–76,1	36,8	34,5–39,2	48,5	46,0–50,9
<b>Parité</b>						
Primipares	67,6	65,6–69,5	28,0	26,1–29,9	41,7	39,7–43,7
Multipares	75,3	73,7–76,9	33,6	31,8–35,3	48,0	46,3–49,8
<b>Type d'accouchement</b>						
Voie vaginale	85,7	84,6–86,8	38,7	37,1–40,2	52,5	51,0–54,0
Césarienne	29,0	26,5–31,6	7,5	6,0–9,1	22,6	20,2–25,1
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	70,4	67,5–73,3	28,5	25,6–31,5	41,3	38,2–44,5
Au-dessus du SFR	72,4	71,0–73,9	32,6	31,1–34,1	47,2	45,7–48,8
<b>Toutes les femmes</b>	<b>71,9</b>	<b>70,7–73,2</b>	<b>31,1</b>	<b>29,8–32,3</b>	<b>45,3</b>	<b>43,9–46,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Les femmes dont le bébé a été admis dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux immédiatement après la naissance sont exclues.

## Répartition des évaluations des femmes du moment de leur premier contact avec leur bébé, Canada, 2006–2007 §

Type d'accouchement	Au bon moment		Trop tôt		Trop tard	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Voie vaginale	91,0	90,1–91,9	3,6	3,0–4,2	5,3	4,7–6,0
Césarienne	71,3	68,8–73,8	2,5	1,6–3,4	26,2	23,8–28,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>86,2</b>	<b>85,3–87,1</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8–3,9</b>	<b>10,4</b>	<b>9,6–11,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Les femmes dont le bébé a été admis dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux immédiatement après la naissance sont exclues.

## Répartition des endroits où le bébé a passé la plus grande partie de la première heure après la naissance, Canada, 2006–2007 §

	%	IC 95 %
Le bébé dans le lit avec la mère	45,3	43,9–46,6
Le bébé dans la même chambre, mais pas dans le même lit	40,8	39,5–42,1
Le bébé à l'extérieur de la chambre	13,9	13,0–14,8

IC – Intervalle de confiance.

§ Les femmes dont le bébé a été admis dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux immédiatement après la naissance sont exclues.



## Répartition du nombre d'heures que le nourrisson a passé en dehors de la chambre de sa mère pendant les 24 premières heures suivant la naissance, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 §

[Contient les données pour Figure 26.2]

Province/territoire	<1 heure		De 1 à 5 heures		≥6 heures	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	21,4	17,1–25,6	38,3	33,2–43,5	40,3	35,2–45,4
Île-du-Prince-Édouard	16,7	13,4–19,9	38,7	34,3–43,1	44,7	40,3–49,0
Nouvelle-Écosse	67,2	62,5–71,8	24,9	20,5–29,4	7,9 †	5,2–10,6
Nouveau-Brunswick	38,8	33,4–44,1	39,0	33,3–44,6	22,3	17,6–27,0
Québec	64,9	62,2–67,6	21,1	18,7–23,6	14,0	12,0–15,9
Ontario	70,6	68,5–72,7	20,5	18,6–22,4	8,9	7,6–10,2
Manitoba	61,9	56,6–67,1	28,0	23,2–32,8	10,2	6,9–13,4
Saskatchewan	31,3	26,4–36,2	46,6	41,3–52,0	22,0	17,6–26,4
Alberta	59,0	55,2–62,9	29,7	26,1–33,2	11,3	8,8–13,8
Colombie-Britannique	72,8	69,3–76,2	21,9	18,6–25,2	5,3 †	3,6–7,1
Yukon	78,6	73,8–83,5	17,9	13,3–22,5	*	
Territoires du Nord-Ouest	71,4	66,0–76,7	24,9	19,7–30,0	*	
Nunavut	60,3	52,7–67,8	28,0	21,2–34,7	11,8 †	6,9–16,7
<b>Canada</b>	<b>65,0</b>	<b>63,8–66,2</b>	<b>23,8</b>	<b>22,7–24,9</b>	<b>11,2</b>	<b>10,4–12,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ Les femmes dont le bébé a été admis dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux immédiatement après la naissance sont exclues.

**Répartition du nombre d'heures que le nourrisson a passé en dehors de la chambre de sa mère pendant les 24 premières heures suivant la naissance, selon le type d'accouchement, Canada, 2006–2007 §**

[Contient les données pour Figure 26.3]

Type d'accouchement	<1 heure		De 1 à 5 heures		≥6 heures	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Voie vaginale	70,9	69,6–72,2	21,4	20,2–22,6	7,7	6,9–8,5
Césarienne	46,5	43,8–49,3	31,3	28,8–33,7	22,2	20,0–24,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>65,0</b>	<b>63,8–66,2</b>	<b>23,8</b>	<b>22,7–24,9</b>	<b>11,2</b>	<b>10,4–12,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Les femmes dont le bébé a été admis dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux immédiatement après la naissance sont exclues.

## 27 Expérience de l'accouchement et satisfaction à l'égard des soins

### Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard de leur expérience globale du travail et de l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 27.1]

Province/territoire	Très positive		Assez positive		Ni positive ni négative		Assez ou très négative	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	53,0	48,0–58,0	27,2	22,6–31,8	11,3	8,1–14,5	8,5	5,8–11,3
Île-du-Prince-Édouard	57,1	53,0–61,2	23,2	19,7–26,8	10,4	7,9–13,0	9,3	6,9–11,6
Nouvelle-Écosse	59,0	54,4–63,7	22,7	18,9–26,5	10,5	7,8–13,2	7,8	5,3–10,4
Nouveau-Brunswick	53,7	48,8–58,6	28,7	24,1–33,2	9,2	6,3–12,1	8,5 †	5,6–11,3
Québec	55,5	52,8–58,2	28,9	26,4–31,5	9,3	7,7–10,9	6,2	4,9–7,5
Ontario	54,1	51,9–56,3	26,2	24,3–28,1	10,7	9,3–12,1	9,0	7,8–10,3
Manitoba	48,4	43,3–53,5	28,1	23,7–32,5	11,5	8,3–14,6	12,1	8,8–15,4
Saskatchewan	46,8	42,0–51,6	27,8	23,5–32,1	9,7	6,8–12,6	15,7	12,2–19,1
Alberta	53,9	50,1–57,6	23,0	19,8–26,2	11,9	9,4–14,4	11,2	8,9–13,5
Colombie-Britannique	52,0	48,2–55,7	23,6	20,3–26,8	12,6	10,1–15,2	11,8	9,4–14,3
Yukon	60,5	54,8–66,2	16,6	12,1–21,1	19,5	14,7–24,3	*	
Territoires du Nord-Ouest	55,1	49,5–60,7	23,0	18,2–27,7	14,8	10,8–18,9	7,1 †	4,1–10,0
Nunavut	46,1	38,9–53,4	24,8	18,4–31,2	9,5 †	5,1–13,8	19,6	13,8–25,4
<b>Canada</b>	<b>53,8</b>	<b>52,5–55,1</b>	<b>26,2</b>	<b>25,1–27,4</b>	<b>10,7</b>	<b>9,9–11,5</b>	<b>9,2</b>	<b>8,5–10,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

## Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard de leur expérience globale du travail et de l'accouchement, selon le type d'accoucheur, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 27.2]

Type d'accoucheur	Très positive		Assez positive		Ni positive ni négative		Assez ou très négative	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Obstétricien/gynécologue	52,3	50,7–53,9	27,4	26,0–28,8	10,6	9,6–11,6	9,7	8,8–10,6
Médecin de famille	58,3	55,1–61,5	24,3	21,5–27,1	10,1	8,1–12,0	7,3	5,7–9,0
Sage-femme	71,1	65,3–76,8	17,0	12,2–21,9	9,1 †	5,4–12,7	2,9 ‡	0,8–4,9
Infirmière/infirmière praticienne	53,6	47,8–59,5	26,2	20,8–31,5	11,9	8,1–15,8	8,3	5,1–11,5
Autre §	50,2	45,4–55,0	24,2	20,1–28,3	14,4	11,0–17,8	11,2	8,3–14,2
<b>Toutes les femmes</b>	<b>53,9</b>	<b>52,6–55,2</b>	<b>26,2</b>	<b>25,0–27,4</b>	<b>10,8</b>	<b>10,0–11,6</b>	<b>9,2</b>	<b>8,5–10,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Inclut les professionnels de la santé dont le type n'a pas été précisé par les mères, notamment les médecins dont la spécialisation n'a pas été précisée.

**Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard de leur expérience globale du travail et de l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Très positive		Assez positive		Ni positive ni négative		Assez ou très négative	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	47,4	41,2–53,7	26,8	21,4–32,2	14,3	10,0–18,5	11,5	7,8–15,2
20–24	54,9	51,2–58,6	24,7	21,5–27,9	11,8	9,4–14,2	8,6	6,7–10,6
25–29	54,8	52,5–57,0	26,9	24,9–28,9	10,4	9,1–11,8	7,9	6,8–9,0
30–34	53,2	51,0–55,5	25,9	23,9–27,9	11,2	9,7–12,6	9,7	8,4–11,0
35–39	53,4	50,1–56,8	26,3	23,2–29,3	9,4	7,4–11,5	10,9	8,7–13,0
≥40	55,8	48,3–63,4	25,8	19,1–32,5	7,8 †	3,8–11,9	10,5 †	5,9–15,2
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	46,4	41,9–50,9	31,6	27,4–35,8	12,7	9,7–15,7	9,3	6,8–11,9
Diplôme d'études secondaires	54,8	51,8–57,8	24,1	21,6–26,6	11,3	9,4–13,2	9,8	8,1–11,5
Diplôme d'études postsecondaires	56,3	54,2–58,3	24,9	23,1–26,7	10,2	8,9–11,4	8,7	7,5–9,8
Diplôme universitaire	52,4	50,2–54,6	27,7	25,7–29,7	10,2	8,9–11,5	9,6	8,3–10,9
<b>Parité</b>								
Primipares	50,7	48,7–52,6	26,8	25,0–28,5	12,0	10,8–13,3	10,6	9,4–11,7
Multipares	56,5	54,7–58,2	25,8	24,2–27,3	9,6	8,6–10,6	8,1	7,2–9,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	51,8	48,7–54,9	26,0	23,4–28,6	10,8	9,0–12,6	11,4	9,5–13,3
Au-dessus du SFR	54,9	53,4–56,4	26,1	24,7–27,4	10,4	9,5–11,4	8,6	7,8–9,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>53,8</b>	<b>52,5–55,1</b>	<b>26,2</b>	<b>25,1–27,4</b>	<b>10,7</b>	<b>9,9–11,5</b>	<b>9,2</b>	<b>8,5–10,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant reçu de l'information par leur professionnel de la santé, sur la progression du travail, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	87,0	83,2–90,8
Île-du-Prince-Édouard	90,1	87,3–92,9
Nouvelle-Écosse	91,1	88,1–94,0
Nouveau-Brunswick	90,1	86,9–93,2
Québec	89,1	87,2–90,9
Ontario	89,0	87,4–90,5
Manitoba	89,4	86,0–92,8
Saskatchewan	89,2	86,0–92,5
Alberta	88,8	86,2–91,5
Colombie-Britannique	89,6	87,0–92,2
Yukon	96,3	94,0–98,6
Territoires du Nord-Ouest	90,5	87,0–94,1
Nunavut	79,2	73,4–85,1
<b>Canada</b>	<b>89,1</b>	<b>88,2–90,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard de certains aspects de l'interaction avec les professionnels de la santé pendant toute la grossesse, le travail, l'accouchement et le post-partum immédiat, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 27.3]

Aspect de l'interaction	Très satisfaites		Assez satisfaites		Ni satisfaites ni insatisfaites		Assez insatisfaites		Très insatisfaites	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Information fournie par les professionnels de la santé	61,8	60,6–63,0	30,3	29,2–31,5	4,0	3,5–4,5	3,0	2,6–3,5	0,9	0,6–1,1
Compassion et compréhension dont ont fait preuve les professionnels de la santé	65,4	64,1–66,6	26,7	25,6–27,8	3,7	3,2–4,2	2,9	2,5–3,4	1,3	1,0–1,6
Compétence des professionnels de la santé	75,9	74,8–77,0	19,4	18,4–20,4	1,8	1,5–2,2	1,9	1,6–2,2	1,0	0,7–1,2
Respect de l'intimité et de la dignité de la femme dont ont fait preuve les professionnels de la santé	75,6	74,5–76,7	18,3	17,3–19,3	2,7	2,3–3,1	2,1	1,8–2,5	1,3	1,0–1,6
Respect dont ont fait preuve les professionnels de la santé	78,5	77,5–79,6	16,7	15,8–17,6	1,8	1,5–2,2	1,8	1,5–2,2	1,1	0,8–1,3
Participation à la prise de décisions	72,6	71,5–73,8	21,2	20,2–22,2	2,7	2,3–3,2	2,4	2,1–2,8	1,0	0,7–1,3

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de l'information fournie par les professionnels de la santé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	65,6	60,9–70,2
Île-du-Prince-Édouard	65,8	61,7–69,8
Nouvelle-Écosse	66,4	62,1–70,7
Nouveau-Brunswick	66,9	62,1–71,6
Québec	51,8	49,2–54,3
Ontario	64,3	62,2–66,5
Manitoba	63,0	58,2–67,8
Saskatchewan	61,5	56,9–66,2
Alberta	64,6	61,1–68,1
Colombie-Britannique	68,6	65,1–72,2
Yukon	72,1	66,8–77,3
Territoires du Nord-Ouest	60,6	55,2–66,0
Nunavut	39,1	32,1–46,2
<b>Canada</b>	<b>61,8</b>	<b>60,6–63,0</b>

IC – Intervalle de confiance.



**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de l'information fournie par les professionnels de la santé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	48,1	42,1–54,1
20–24	58,7	55,3–62,0
25–29	61,3	59,1–63,5
30–34	61,7	59,7–63,8
35–39	67,9	64,8–70,9
≥40	67,0	60,0–74,0
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	58,4	53,9–62,8
Diplôme d'études secondaires	63,7	60,9–66,5
Diplôme d'études postsecondaires	63,1	61,0–65,1
Diplôme universitaire	60,5	58,3–62,7
<b>Parité</b>		
Primipares	58,7	56,9–60,6
Multipares	64,3	62,7–66,0
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	62,0	60,6–63,5
Césarienne	61,1	58,6–63,6
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	61,2	58,3–64,1
Au-dessus du SFR	62,0	60,6–63,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>61,8</b>	<b>60,6–63,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de la compassion et de la compréhension dont ont fait preuve les professionnels de la santé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	67,9	63,4–72,5
Île-du-Prince-Édouard	76,6	73,0–80,1
Nouvelle-Écosse	68,4	64,1–72,8
Nouveau-Brunswick	67,0	62,2–71,8
Québec	53,8	51,1–56,5
Ontario	68,4	66,3–70,5
Manitoba	65,9	61,2–70,6
Saskatchewan	63,7	59,1–68,2
Alberta	70,1	66,7–73,4
Colombie-Britannique	73,0	69,7–76,4
Yukon	72,3	66,8–77,7
Territoires du Nord-Ouest	65,1	59,5–70,6
Nunavut	45,3	38,0–52,6
<b>Canada</b>	<b>65,4</b>	<b>64,1–66,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de la compassion et de la compréhension dont ont fait preuve les professionnels de la santé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	50,3	44,4–56,1
20–24	62,4	58,9–65,9
25–29	63,9	61,7–66,1
30–34	67,8	65,7–69,8
35–39	68,8	65,7–71,9
≥40	66,2	58,7–73,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	59,8	55,4–64,1
Diplôme d'études secondaires	66,2	63,3–69,0
Diplôme d'études postsecondaires	66,6	64,6–68,5
Diplôme universitaire	65,2	63,2–67,3
<b>Parité</b>		
Primipares	62,6	60,8–64,4
Multipares	67,6	66,0–69,2
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	66,1	64,6–67,5
Césarienne	63,4	60,8–65,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	65,2	62,4–68,1
Au-dessus du SFR	65,6	64,2–67,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>65,4</b>	<b>64,1–66,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de la compétence dont ont fait preuve les professionnels de la santé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	73,4	69,1–77,7
Île-du-Prince-Édouard	84,3	81,2–87,3
Nouvelle-Écosse	80,2	76,4–83,9
Nouveau-Brunswick	71,9	67,4–76,4
Québec	69,2	66,6–71,7
Ontario	77,9	76,2–79,7
Manitoba	77,8	73,7–81,8
Saskatchewan	72,4	68,1–76,7
Alberta	78,7	75,6–81,8
Colombie-Britannique	80,6	77,5–83,8
Yukon	83,6	79,2–88,0
Territoires du Nord-Ouest	65,2	59,9–70,5
Nunavut	53,6	46,0–61,1
<b>Canada</b>	<b>75,9</b>	<b>74,8–77,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de la compétence dont ont fait preuve les professionnels de la santé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	62,6	56,9–68,4
20–24	69,7	66,3–73,1
25–29	77,3	75,4–79,1
30–34	77,0	75,1–78,9
35–39	79,2	76,5–81,9
≥40	74,9	68,2–81,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	68,7	64,5–72,8
Diplôme d'études secondaires	75,9	73,4–78,3
Diplôme d'études postsecondaires	77,0	75,2–78,8
Diplôme universitaire	77,0	75,2–78,8
<b>Parité</b>		
Primipares	74,0	72,4–75,7
Multipares	77,6	76,1–79,1
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	76,5	75,2–77,8
Césarienne	74,2	72,1–76,4
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	72,2	69,5–74,9
Au-dessus du SFR	77,5	76,3–78,8
<b>Toutes les femmes</b>	<b>75,9</b>	<b>74,8–77,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du respect de leur intimité et de leur dignité démontré par les professionnels de la santé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

<b>Province/territoire</b>	<b>%</b>	<b>IC 95 %</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	73,2	68,9–77,6
Île-du-Prince-Édouard	77,1	73,5–80,8
Nouvelle-Écosse	80,8	77,0–84,6
Nouveau-Brunswick	79,6	75,7–83,5
Québec	67,2	64,7–69,6
Ontario	78,2	76,3–80,0
Manitoba	76,5	72,3–80,6
Saskatchewan	72,8	68,3–77,3
Alberta	77,9	74,8–81,0
Colombie-Britannique	81,1	78,1–84,1
Yukon	84,0	79,7–88,4
Territoires du Nord-Ouest	70,8	65,5–76,1
Nunavut	60,1	52,7–67,4
<b>Canada</b>	<b>75,6</b>	<b>74,5–76,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du respect de leur intimité et de leur dignité démontré par les professionnels de la santé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	63,9	58,0–69,8
20–24	72,8	69,5–76,0
25–29	75,4	73,5–77,4
30–34	76,5	74,6–78,4
35–39	78,2	75,4–80,9
≥40	79,7	73,6–85,9
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	68,6	64,5–72,7
Diplôme d'études secondaires	76,3	73,8–78,8
Diplôme d'études postsecondaires	76,0	74,2–77,8
Diplôme universitaire	76,7	74,9–78,6
<b>Parité</b>		
Primipares	74,0	72,4–75,7
Multipares	77,1	75,7–78,5
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	75,3	74,0–76,6
Césarienne	76,3	74,1–78,5
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	73,3	70,6–75,9
Au-dessus du SFR	77,0	75,8–78,2
<b>Toutes les femmes</b>	<b>75,6</b>	<b>74,5–76,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du respect dont les professionnels de la santé ont fait preuve à leur endroit, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	76,3	72,1–80,6
Île-du-Prince-Édouard	83,2	79,9–86,4
Nouvelle-Écosse	79,6	75,8–83,4
Nouveau-Brunswick	82,4	78,6–86,1
Québec	69,7	67,3–72,2
Ontario	81,9	80,2–83,5
Manitoba	80,3	76,5–84,2
Saskatchewan	77,6	73,4–81,8
Alberta	79,7	76,8–82,6
Colombie-Britannique	83,4	80,5–86,3
Yukon	83,8	79,3–88,3
Territoires du Nord-Ouest	79,0	74,3–83,8
Nunavut	72,5	65,9–79,2
<b>Canada</b>	<b>78,5</b>	<b>77,5–79,6</b>

IC – Intervalle de confiance.



**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » du respect dont les professionnels de la santé ont fait preuve à leur endroit, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	70,2	64,5–75,8
20–24	76,5	73,4–79,5
25–29	79,4	77,6–81,3
30–34	79,1	77,3–80,9
35–39	78,8	76,0–81,5
≥40	80,1	73,9–86,2
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	71,9	67,8–75,9
Diplôme d'études secondaires	79,6	77,3–81,9
Diplôme d'études postsecondaires	79,0	77,2–80,8
Diplôme universitaire	79,2	77,3–81,0
<b>Parité</b>		
Primipares	77,1	75,5–78,6
Multipares	79,9	78,6–81,3
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	78,9	77,7–80,1
Césarienne	77,5	75,3–79,6
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	77,6	75,1–80,1
Au-dessus du SFR	79,3	78,1–80,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>78,5</b>	<b>77,5–79,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de leur participation personnelle à la prise de décisions, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	73,1	68,7–77,5
Île-du-Prince-Édouard	73,7	70,0–77,5
Nouvelle-Écosse	78,8	74,8–82,8
Nouveau-Brunswick	77,1	73,0–81,2
Québec	63,1	60,5–65,6
Ontario	76,1	74,1–78,0
Manitoba	76,4	72,2–80,6
Saskatchewan	70,1	65,7–74,5
Alberta	73,9	70,7–77,0
Colombie-Britannique	77,3	74,1–80,6
Yukon	80,7	76,0–85,4
Territoires du Nord-Ouest	66,5	61,2–71,7
Nunavut	53,5	46,0–60,9
<b>Canada</b>	<b>72,6</b>	<b>71,5–73,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui étaient « très satisfaites » de leur participation personnelle à la prise de décisions, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	63,2	57,4–69,0
20–24	73,1	70,0–76,1
25–29	70,9	68,9–73,0
30–34	74,1	72,2–76,0
35–39	74,6	71,6–77,6
≥40	74,0	67,3–80,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	66,4	62,1–70,6
Diplôme d'études secondaires	75,1	72,6–77,5
Diplôme d'études postsecondaires	75,0	73,2–76,9
Diplôme universitaire	70,3	68,3–72,2
<b>Parité</b>		
Primipares	69,9	68,2–71,6
Multipares	74,9	73,4–76,4
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	73,1	71,8–74,4
Césarienne	71,4	69,1–73,6
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	73,2	70,5–75,9
Au-dessus du SFR	73,1	71,8–74,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>72,6</b>	<b>71,5–73,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

## 28 Durée du séjour de la mère à l'hôpital

Durée moyenne du séjour à l'hôpital de la mère après l'accouchement, Canada, 2006–2007

Type d'accouchement	Moyenne (jours)	IC 95 %
Voie vaginale	2,1	2,0–2,2
Césarienne	3,8	3,6–4,0

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont passé un court séjour à l'hôpital après l'accouchement, selon le type d'accouchement et la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 28.1]

Province/territoire	Accouchement par voie vaginale (séjour de <2 jours)		Accouchement par césarienne (séjour de <4 jours)	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	18,8	14,2–23,4	44,5	35,5–53,5
Île-du-Prince-Édouard	6,4 †	4,0–8,9	8,3 †	4,4–12,3
Nouvelle-Écosse	17,3	13,2–21,4	40,7	32,4–49,0
Nouveau-Brunswick	18,6	14,3–23,0	43,3	33,2–53,5
Québec	12,2	10,2–14,2	35,3	29,8–40,8
Ontario	39,8	37,3–42,3	60,8	56,7–64,8
Manitoba	31,9	26,6–37,2	44,0	34,3–53,8
Saskatchewan	20,3	15,5–25,1	49,1	39,1–59,1
Alberta	60,7	56,7–64,6	59,1	52,0–66,2
Colombie-Britannique	44,1	39,6–48,6	60,8	54,0–67,7
Yukon	14,7 †	9,8–19,7	*	
Territoires du Nord-Ouest	34,0	28,0–40,1	28,5 †	16,3–40,6
Nunavut	45,7	38,1–53,3	87,5	71,9–100,0
<b>Canada</b>	<b>33,6</b>	<b>32,3–34,9</b>	<b>53,0</b>	<b>50,5–55,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes qui ont passé un court séjour à l'hôpital après l'accouchement, selon le type d'accouchement, l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 28.2]

	Accouchement par voie vaginale (séjour de <2 jours)		Accouchement par césarienne (séjour de <4 jours)	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>				
15–19	28,8	22,8–34,9	34,2 †	20,8–47,7
20–24	29,6	25,9–33,4	52,7	44,6–60,8
25–29	31,1	28,8–33,4	54,3	49,5–59,0
30–34	35,6	33,1–38,1	53,6	49,5–57,7
35–39	38,6	34,6–42,7	52,7	46,7–58,6
≥40	45,4	35,3–55,6	54,3	42,4–66,2
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>				
Études secondaires non terminées	32,1	27,2–37,0	44,0	35,0–53,0
Diplôme d'études secondaires	34,7	31,6–37,8	54,8	48,8–60,7
Diplôme d'études postsecondaires	31,8	29,5–34,1	52,8	48,8–56,8
Diplôme universitaire	34,9	32,4–37,3	54,8	50,5–59,0
<b>Parité</b>				
Primipares	22,5	20,7–24,4	49,0	45,5–52,5
Multipares	41,9	40,0–43,7	57,3	53,6–61,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>				
Au niveau ou au-dessous du SFR	32,7	29,5–35,8	47,8	41,5–54,1
Au-dessus du SFR	34,2	32,7–35,8	54,9	52,0–57,8
<b>Toutes les femmes</b>	<b>33,6</b>	<b>32,3–34,9</b>	<b>53,0</b>	<b>50,5–55,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Répartition des opinions des femmes sur la durée de leur séjour à l'hôpital après l'accouchement, selon la durée du séjour et le type d'accouchement, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 28.3]

Opinion sur la durée du séjour	Accouchement par voie vaginale (séjour de <2 jours)		Accouchement par voie vaginale (séjour de ≥2 jours)		Accouchement par césarienne (séjour de <4 jours)		Accouchement par césarienne (séjour de ≥4 jours)		Toutes les femmes	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Suffisante	69,1	66,6–71,6	69,6	67,9–71,2	70,9	67,7–74,1	67,9	64,4–71,4	<b>69,5</b>	<b>68,3–70,6</b>
Trop courte	19,5	17,4–21,7	10,3	9,2–11,4	15,1	12,6–17,7	10,0	7,9–12,1	<b>13,2</b>	<b>12,3–14,0</b>
Trop longue	11,4	9,7–13,0	20,1	18,7–21,6	14,0	11,6–16,4	22,1	18,9–25,3	<b>17,4</b>	<b>16,4–18,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

## 29 Taux d'allaitement

Proportion de femmes qui avaient l'intention d'allaiter, proportion ayant commencé à allaiter et durée de l'allaitement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 29.1]

Province/territoire	Intention		Commencement		3 mois - à l'occasion		3 mois - exclusif		6 mois - à l'occasion §		6 mois - exclusif §	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	75,7	71,5–79,9	74,6	70,3–79,0	44,8	39,8–49,9	34,8	30,1–39,6	37,6	32,5–42,7	5,8 †	3,4–8,3
Île-du-Prince-Édouard	71,9	68,1–75,7	72,2	68,6–75,9	46,2	42,0–50,4	37,4	33,3–41,5	34,5	30,3–38,7	10,0	7,4–12,7
Nouvelle-Écosse	82,5	79,1–86,0	83,2	79,8–86,5	55,6	51,1–60,1	40,1	35,7–44,5	39,7	34,8–44,6	9,6	6,7–12,6
Nouveau-Brunswick	80,0	76,0–84,0	78,6	74,6–82,7	48,8	43,9–53,8	41,3	36,4–46,2	35,5	30,5–40,4	11,7	8,4–15,0
Québec	86,8	85,0–88,6	87,0	85,3–88,8	61,0	58,5–63,6	48,0	45,3–50,7	48,9	46,1–51,7	10,2	8,4–12,0
Ontario	90,4	89,1–91,6	90,6	89,3–91,9	69,1	67,1–71,1	52,5	50,3–54,7	54,0	51,7–56,3	15,6	13,8–17,3
Manitoba	90,6	87,7–93,5	91,2	88,4–94,0	63,8	59,0–68,6	52,8	47,8–57,8	51,2	45,9–56,5	15,7	12,0–19,4
Saskatchewan	91,4	88,7–94,2	91,4	88,6–94,3	65,3	60,8–69,9	50,1	45,2–54,9	51,7	46,6–56,7	16,7	12,9–20,5
Alberta	93,8	92,0–95,7	94,6	92,8–96,3	73,2	69,8–76,5	53,1	49,4–56,8	58,9	55,0–62,8	15,8	13,0–18,7
Colombie-Britannique	96,4	95,1–97,8	97,0	95,8–98,3	80,8	77,9–83,7	61,4	57,6–65,2	68,1	64,4–71,8	19,2	16,0–22,4
Yukon	96,7	94,5–98,9	93,4	90,4–96,3	78,5	73,6–83,4	70,5	65,2–75,8	73,6	68,4–78,8	34,2	28,6–39,7
Territoires du Nord-Ouest	83,6	79,5–87,8	85,1	81,1–89,0	63,0	57,7–68,3	46,4	40,7–52,1	46,7	41,2–52,2	18,7	14,5–23,0
Nunavut	81,5	75,7–87,3	84,3	79,2–89,3	62,4	55,6–69,2	49,6	42,2–56,9	53,3	46,4–60,3	19,7	13,9–25,5
<b>Canada</b>	<b>90,0</b>	<b>89,3–90,7</b>	<b>90,3</b>	<b>89,6–91,0</b>	<b>67,6</b>	<b>66,5–68,8</b>	<b>51,7</b>	<b>50,4–53,0</b>	<b>53,9</b>	<b>52,6–55,2</b>	<b>14,4</b>	<b>13,5–15,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ Les taux d'allaitement à six mois excluent les femmes qui ont été interrogées moins de six mois après leur accouchement.



**Proportion de femmes qui avaient l'intention d'allaiter, proportion ayant commencé à allaiter et durée de l'allaitement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 29.2, Figure 29.3 et Figure 29.4]

	Intention		Commencement		3 mois - à l'occasion		3 mois - exclusif		6 mois - à l'occasion §		6 mois - exclusif §	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>												
15–19	83,3	79,2–87,4	83,6	79,6–87,7	40,5	34,6–46,4	34,1	28,4–39,7	22,8	17,9–27,8	5,1 †	2,3–7,8
20–24	88,8	86,6–90,9	89,3	87,2–91,4	54,3	50,7–57,9	46,3	42,7–50,0	37,1	33,3–40,8	7,6	5,5–9,6
25–29	88,9	87,6–90,2	88,5	87,2–89,9	65,2	63,2–67,2	50,5	48,2–52,7	51,3	48,9–53,6	12,7	11,1–14,3
30–34	91,6	90,4–92,8	92,0	90,8–93,2	73,1	71,2–75,0	54,9	52,7–57,0	60,2	57,9–62,5	16,8	15,1–18,6
35–39	91,3	89,6–93,1	92,7	91,1–94,3	76,1	73,3–78,9	55,0	51,8–58,3	64,3	60,9–67,6	19,9	17,0–22,8
≥40	92,5	88,5–96,4	92,5	88,5–96,5	79,1	72,9–85,3	58,6	51,1–66,1	69,7	62,3–77,1	22,8	16,0–29,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>												
Études secondaires non terminées	82,8	79,5–86,1	82,5	79,2–85,8	44,9	40,3–49,6	38,3	34,0–42,7	31,5	27,0–36,0	4,9 †	2,8–7,1
Diplôme d'études secondaires	85,6	83,7–87,5	86,0	84,1–87,9	57,5	54,7–60,3	46,5	43,5–49,5	42,8	39,8–45,8	11,1	9,1–13,1
Diplôme d'études postsecondaires	88,2	86,9–89,5	88,6	87,3–89,9	63,5	61,5–65,5	47,9	45,7–50,1	48,5	46,2–50,9	12,9	11,4–14,4
Diplôme universitaire	95,9	95,0–96,7	96,1	95,3–96,9	82,2	80,6–83,9	61,4	59,3–63,5	70,6	68,5–72,6	19,9	18,0–21,8
<b>Parité</b>												
Primipares	93,2	92,3–94,1	92,8	91,8–93,7	66,0	64,2–67,8	49,2	47,2–51,1	52,0	50,0–54,0	12,5	11,2–13,9
Multipares	87,5	86,4–88,6	88,4	87,4–89,4	68,9	67,4–70,4	53,8	52,2–55,5	55,5	53,7–57,3	16,0	14,7–17,3
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>												
Au niveau ou au-dessous du SFR	86,9	84,9–88,9	87,7	85,8–89,6	63,0	60,1–65,9	48,8	45,8–51,8	47,3	44,1–50,4	11,6	9,5–13,7
Au-dessus du SFR	91,1	90,3–91,9	91,1	90,3–91,9	69,1	67,8–70,5	52,8	51,3–54,2	56,0	54,4–57,6	15,4	14,3–16,6
<b>Toutes les femmes</b>	<b>90,0</b>	<b>89,3–90,7</b>	<b>90,3</b>	<b>89,6–91,0</b>	<b>67,6</b>	<b>66,5–68,8</b>	<b>51,7</b>	<b>50,4–53,0</b>	<b>53,9</b>	<b>52,6–55,2</b>	<b>14,4</b>	<b>13,5–15,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ Les taux d'allaitement à six mois excluent les femmes qui ont été interrogées moins de six mois après leur accouchement.

**Proportion de femmes qui ont introduit d'autres liquides que le lait maternel dans l'alimentation du bébé dans la première semaine après l'accouchement, chez les femmes qui ont allaité ou tenté d'allaiter le bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	22,7	17,8–27,6
Île-du-Prince-Édouard	17,2	13,5–21,0
Nouvelle-Écosse	27,7	23,2–32,3
Nouveau-Brunswick	22,0	17,6–26,5
Québec	20,3	17,9–22,6
Ontario	22,1	20,2–24,0
Manitoba	19,2	15,2–23,1
Saskatchewan	17,6	13,8–21,4
Alberta	22,4	19,2–25,6
Colombie-Britannique	18,1	15,1–21,2
Yukon	12,3	8,4–16,3
Territoires du Nord-Ouest	13,2	9,1–17,2
Nunavut	17,8 †	11,7–24,0
<b>Canada</b>	<b>21,0</b>	<b>20,0–22,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes qui ont introduit d'autres liquides que le lait maternel dans l'alimentation du bébé dans les 14 premiers jours après l'accouchement, chez les femmes qui ont allaité ou tenté d'allaiter le bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	30,2	24,9–35,5
Île-du-Prince-Édouard	20,2	16,3–24,1
Nouvelle-Écosse	34,8	29,9–39,8
Nouveau-Brunswick	28,6	23,6–33,6
Québec	24,3	21,8–26,8
Ontario	26,6	24,6–28,6
Manitoba	23,0	18,6–27,3
Saskatchewan	22,5	18,2–26,7
Alberta	25,8	22,4–29,1
Colombie-Britannique	21,4	18,2–24,7
Yukon	15,9	11,4–20,4
Territoires du Nord-Ouest	18,5	13,7–23,4
Nunavut	20,5	14,0–27,0
<b>Canada</b>	<b>25,2</b>	<b>24,1–26,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

## 30 Initiative Hôpitaux amis des bébés

### Proportion de femmes qui ont vécu des expériences correspondant aux étapes 3 à 10 de l'Initiative Hôpitaux amis des bébés, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 30.1]

	%	IC 95 %
Étape 3 : Les femmes avaient reçu suffisamment d'information sur l'allaitement	92,3	91,6–93,0
Étape 4 : Les femmes ont allaité leur bébé pour la première fois dans les 30 minutes à deux heures qui ont suivi la naissance	26,6	25,5–27,7
Étape 5 : Les professionnels de la santé ont offert de l'aide pour commencer l'allaitement	80,7	79,7–81,7
Étape 6 : Les professionnels de la santé n'ont jamais offert ni donné d'échantillons gratuits de lait maternisé	64,2	63,0–65,4
Étape 7 : Les femmes ont gardé leur bébé dans leur chambre pendant au moins 23 heures au cours des 24 heures qui ont suivi la naissance §	65,0	63,8–66,2
Étape 8 : Les femmes ont allaité leur bébé à la demande pendant la première semaine après la naissance **	49,8	48,5–51,2
Étape 9 : Aucune sucette ou tétine artificielle n'a été donnée au bébé pendant la première semaine suivant la naissance **	55,6	54,3–56,9
Étape 10 : Les femmes ont reçu de l'information sur les ressources communautaires de soutien à l'allaitement **	86,3	85,4–87,2

IC – Intervalle de confiance.

§ Les femmes dont le bébé a été admis dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux immédiatement après la naissance sont exclues.

\*\* Chez les femmes qui ont allaité ou essayé d'allaiter leur bébé même pendant un court laps de temps.

**Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur l'allaitement (étape 3 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	89,2	86,1–92,3
Île-du-Prince-Édouard	91,8	89,5–94,0
Nouvelle-Écosse	91,5	88,9–94,1
Nouveau-Brunswick	92,4	89,7–95,1
Québec	91,4	89,9–92,9
Ontario	92,3	91,1–93,4
Manitoba	93,4	91,0–95,9
Saskatchewan	92,6	90,0–95,1
Alberta	92,4	90,4–94,4
Colombie-Britannique	94,5	92,7–96,2
Yukon	94,9	92,1–97,7
Territoires du Nord-Ouest	90,0	86,7–93,2
Nunavut	84,1	78,8–89,3
<b>Canada</b>	<b>92,3</b>	<b>91,6–93,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur l'allaitement (étape 3 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	90,4	87,0–93,8
20–24	92,5	90,6–94,4
25–29	91,9	90,6–93,1
30–34	92,2	90,9–93,4
35–39	93,8	92,1–95,4
≥40	93,6	89,9–97,3
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	90,9	88,4–93,3
Diplôme d'études secondaires	91,2	89,5–92,9
Diplôme d'études postsecondaires	92,5	91,4–93,6
Diplôme universitaire	93,1	91,9–94,2
<b>Parité</b>		
Primipares	89,8	88,6–90,9
Multipares	94,4	93,6–95,2
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	92,2	91,4–93,0
Césarienne	92,6	91,4–93,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	92,9	91,4–94,4
Au-dessus du SFR	92,3	91,5–93,1
<b>Toutes les femmes</b>	<b>92,3</b>	<b>91,6–93,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont commencé l'allaitement entre 30 minutes et deux heures après la naissance (étape 4 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	32,8	28,4–37,2
Île-du-Prince-Édouard	18,1	14,8–21,4
Nouvelle-Écosse	29,9	25,7–34,1
Nouveau-Brunswick	22,1	17,9–26,3
Québec	22,4	20,2–24,5
Ontario	27,8	25,8–29,8
Manitoba	33,0	28,4–37,6
Saskatchewan	30,0	25,4–34,6
Alberta	31,3	27,9–34,7
Colombie-Britannique	23,3	20,4–26,3
Yukon	28,4	23,1–33,7
Territoires du Nord-Ouest	23,1	18,2–28,0
Nunavut	26,6	20,2–32,9
<b>Canada</b>	<b>26,6</b>	<b>25,5–27,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont commencé l'allaitement entre 30 minutes et deux heures après la naissance (étape 4 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	25,7	20,5–30,8
20–24	24,6	21,6–27,6
25–29	26,5	24,6–28,4
30–34	28,4	26,4–30,3
35–39	25,8	22,8–28,7
≥40	23,3	16,7–30,0
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	21,4	17,8–25,0
Diplôme d'études secondaires	26,5	23,9–29,1
Diplôme d'études postsecondaires	25,2	23,4–27,0
Diplôme universitaire	29,5	27,5–31,5
<b>Parité</b>		
Primipares	27,4	25,7–29,0
Multipares	26,0	24,4–27,5
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	25,7	24,4–27,0
Césarienne	29,3	27,0–31,6
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	21,5	19,1–24,0
Au-dessus du SFR	28,1	26,8–29,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>26,6</b>	<b>25,5–27,7</b>

IC – Intervalle de confiance.



**Proportion de femmes ayant reçu l'aide d'un professionnel de la santé pour commencer l'allaitement (étape 5 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	86,6	83,1–90,0
Île-du-Prince-Édouard	80,5	77,2–83,7
Nouvelle-Écosse	81,7	77,9–85,4
Nouveau-Brunswick	78,8	74,8–82,8
Québec	77,4	75,2–79,6
Ontario	82,0	80,3–83,7
Manitoba	83,9	80,3–87,6
Saskatchewan	77,2	73,0–81,4
Alberta	80,3	77,4–83,3
Colombie-Britannique	83,3	80,5–86,1
Yukon	88,1	83,9–92,2
Territoires du Nord-Ouest	71,7	66,6–76,7
Nunavut	68,4	61,8–74,9
<b>Canada</b>	<b>80,7</b>	<b>79,7–81,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant reçu l'aide d'un professionnel de la santé pour commencer l'allaitement (étape 5 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	83,8	79,4–88,2
20–24	83,4	80,8–86,1
25–29	80,0	78,3–81,7
30–34	80,8	79,1–82,6
35–39	79,7	77,1–82,4
≥40	74,0	67,3–80,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	76,0	72,3–79,7
Diplôme d'études secondaires	78,6	76,2–81,0
Diplôme d'études postsecondaires	79,5	77,8–81,1
Diplôme universitaire	84,1	82,6–85,6
<b>Parité</b>		
Primipares	88,8	87,6–90,0
Multipares	74,0	72,6–75,5
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	79,7	78,5–80,8
Césarienne	83,6	81,8–85,4
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	79,5	77,2–81,8
Au-dessus du SFR	81,2	80,0–82,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>80,7</b>	<b>79,7–81,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui n'ont pas reçu ou ne se sont pas vu offrir des échantillons gratuits de lait maternisé par les professionnels de la santé (étape 6 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 30.3]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	61,6	56,9–66,2
Île-du-Prince-Édouard	66,6	62,6–70,5
Nouvelle-Écosse	63,0	58,4–67,6
Nouveau-Brunswick	59,4	54,4–64,4
Québec	70,7	68,1–73,3
Ontario	57,3	55,1–59,4
Manitoba	62,1	57,3–66,9
Saskatchewan	68,1	63,7–72,4
Alberta	61,7	58,0–65,3
Colombie-Britannique	77,3	74,1–80,6
Yukon	71,6	66,0–77,2
Territoires du Nord-Ouest	58,3	52,3–64,3
Nunavut	52,9	45,8–60,1
<b>Canada</b>	<b>64,2</b>	<b>63,0–65,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui n'ont pas reçu ou ne se sont pas vu offrir des échantillons gratuits de lait maternisé par les professionnels de la santé (étape 6 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	47,9	42,4–53,3
20–24	61,5	58,0–65,0
25–29	63,2	61,1–65,3
30–34	66,2	64,1–68,3
35–39	68,2	65,0–71,3
≥40	61,2	53,8–68,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	53,6	49,2–57,9
Diplôme d'études secondaires	59,6	56,9–62,4
Diplôme d'études postsecondaires	62,7	60,7–64,7
Diplôme universitaire	70,7	68,7–72,7
<b>Parité</b>		
Primipares	60,0	58,1–61,9
Multipares	67,7	66,1–69,2
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	67,7	66,3–69,1
Césarienne	54,2	51,7–56,7
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	58,3	55,4–61,1
Au-dessus du SFR	66,7	65,3–68,1
<b>Toutes les femmes</b>	<b>64,2</b>	<b>63,0–65,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont gardé le bébé dans leur chambre pendant au moins 23 heures la première journée suivant la naissance (étape 7 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 §**

[Contient les données pour Figure 30.4]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	21,4	17,1–25,6
Île-du-Prince-Édouard	16,7	13,4–19,9
Nouvelle-Écosse	67,2	62,5–71,8
Nouveau-Brunswick	38,8	33,4–44,1
Québec	64,9	62,2–67,6
Ontario	70,6	68,5–72,7
Manitoba	61,9	56,6–67,1
Saskatchewan	31,3	26,4–36,2
Alberta	59,0	55,2–62,9
Colombie-Britannique	72,8	69,3–76,2
Yukon	78,6	73,8–83,5
Territoires du Nord-Ouest	71,4	66,0–76,7
Nunavut	60,3	52,7–67,8
<b>Canada</b>	<b>65,0</b>	<b>63,8–66,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Les femmes dont le bébé a été admis dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux immédiatement après la naissance sont exclues.

**Proportion de femmes qui ont gardé le bébé dans leur chambre pendant au moins 23 heures la première journée suivant la naissance (étape 7 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 §**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	59,7	53,4–65,9
20–24	62,5	59,1–65,9
25–29	64,1	61,9–66,3
30–34	66,6	64,4–68,8
35–39	65,9	62,4–69,4
≥40	64,1	56,6–71,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	59,1	54,3–63,8
Diplôme d'études secondaires	62,0	59,2–64,8
Diplôme d'études postsecondaires	64,8	62,8–66,9
Diplôme universitaire	68,0	65,8–70,1
<b>Parité</b>		
Primipares	63,7	61,7–65,6
Multipares	66,0	64,4–67,7
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	70,9	69,6–72,3
Césarienne	46,5	43,8–49,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	63,3	60,3–66,4
Au-dessus du SFR	65,5	64,1–66,9
<b>Toutes les femmes</b>	<b>65,0</b>	<b>63,8–66,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Les femmes dont le bébé a été admis dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux immédiatement après la naissance sont exclues.

**Proportion de femmes qui ont allaité le bébé à la demande au cours de la première semaine suivant la naissance (étape 8 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 §**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	40,4	34,5–46,3
Île-du-Prince-Édouard	40,8	36,0–45,5
Nouvelle-Écosse	51,8	46,8–56,7
Nouveau-Brunswick	40,3	34,7–45,8
Québec	55,0	52,1–57,8
Ontario	46,3	44,0–48,7
Manitoba	44,0	39,0–49,0
Saskatchewan	52,3	47,1–57,5
Alberta	52,3	48,5–56,2
Colombie-Britannique	51,3	47,3–55,3
Yukon	66,5	60,8–72,3
Territoires du Nord-Ouest	57,2	51,2–63,2
Nunavut	61,6	54,1–69,2
<b>Canada</b>	<b>49,8</b>	<b>48,5–51,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Chez les femmes qui ont allaité ou essayé d'allaiter leur bébé même pendant un court laps de temps.

**Proportion de femmes qui ont allaité le bébé à la demande au cours de la première semaine suivant la naissance (étape 8 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 §**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	46,2	39,7–52,7
20–24	43,7	39,9–47,5
25–29	48,0	45,6–50,4
30–34	50,5	48,2–52,9
35–39	56,3	52,7–59,9
≥40	58,7	51,0–66,3
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	49,2	44,2–54,3
Diplôme d'études secondaires	47,8	44,6–51,0
Diplôme d'études postsecondaires	47,2	44,9–49,5
Diplôme universitaire	53,3	51,2–55,5
<b>Parité</b>		
Primipares	43,7	41,7–45,8
Multipares	54,9	53,1–56,7
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	51,8	50,2–53,4
Césarienne	44,2	41,5–46,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	47,0	43,6–50,3
Au-dessus du SFR	50,8	49,3–52,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>49,8</b>	<b>48,5–51,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Chez les femmes qui ont allaité ou essayé d'allaiter leur bébé même pendant un court laps de temps.



**Proportion de bébés qui ont reçu ni tétine artificielle ni sucette au cours de la première semaine suivant la naissance (étape 9 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 §**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	54,7	48,9–60,6
Île-du-Prince-Édouard	62,5	57,7–67,2
Nouvelle-Écosse	54,8	49,6–59,9
Nouveau-Brunswick	57,5	51,9–63,1
Québec	50,8	47,9–53,6
Ontario	59,0	56,7–61,2
Manitoba	52,6	47,5–57,7
Saskatchewan	52,8	47,6–58,0
Alberta	49,9	46,2–53,7
Colombie-Britannique	60,9	57,2–64,7
Yukon	68,4	62,7–74,1
Territoires du Nord-Ouest	62,8	56,9–68,7
Nunavut	57,9	50,1–65,8
<b>Canada</b>	<b>55,6</b>	<b>54,3–56,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Chez les femmes qui ont allaité ou essayé d'allaiter leur bébé même pendant un court laps de temps.

**Proportion de bébés qui ont reçu ni tétine artificielle ni sucette au cours de la première semaine suivant la naissance (étape 9 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 §**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	37,8	31,4–44,2
20–24	42,8	39,1–46,6
25–29	52,7	50,4–55,1
30–34	60,2	58,0–62,3
35–39	63,2	59,8–66,6
≥40	67,8	60,6–75,1
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	40,3	35,2–45,5
Diplôme d'études secondaires	47,1	44,0–50,2
Diplôme d'études postsecondaires	54,3	52,1–56,5
Diplôme universitaire	63,6	61,5–65,8
<b>Parité</b>		
Primipares	56,0	54,0–57,9
Multipares	55,1	53,2–56,9
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	56,7	55,2–58,2
Césarienne	52,5	49,8–55,1
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	53,7	50,4–57,0
Au-dessus du SFR	56,2	54,7–57,8
<b>Toutes les femmes</b>	<b>55,6</b>	<b>54,3–56,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Chez les femmes qui ont allaité ou essayé d'allaiter leur bébé même pendant un court laps de temps.

**Proportion de femmes qui ont reçu de l'information sur les services communautaires de soutien à l'allaitement (étape 10 de l'IHAB), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007 §**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	88,8	85,2–92,4
Île-du-Prince-Édouard	87,2	84,1–90,4
Nouvelle-Écosse	88,6	85,2–92,0
Nouveau-Brunswick	88,1	84,4–91,9
Québec	81,3	79,0–83,6
Ontario	89,3	87,8–90,7
Manitoba	86,9	83,6–90,2
Saskatchewan	84,3	80,5–88,1
Alberta	82,8	80,0–85,6
Colombie-Britannique	90,1	87,8–92,3
Yukon	87,9	83,8–92,0
Territoires du Nord-Ouest	69,1	63,3–74,9
Nunavut	62,0	54,1–69,9
<b>Canada</b>	<b>86,3</b>	<b>85,4–87,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Chez les femmes qui ont allaité ou essayé d'allaiter leur bébé même pendant un court laps de temps.

**Proportion de femmes qui ont reçu de l'information sur les services communautaires de soutien à l'allaitement (étape 10 de l'IHAB), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007 §**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	84,4	79,5–89,3
20–24	83,2	80,3–86,2
25–29	84,9	83,1–86,6
30–34	87,7	86,1–89,2
35–39	89,3	87,2–91,4
≥40	88,4	83,4–93,4
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	81,5	77,5–85,5
Diplôme d'études secondaires	84,3	82,0–86,6
Diplôme d'études postsecondaires	87,3	85,9–88,7
Diplôme universitaire	87,7	86,3–89,2
<b>Parité</b>		
Primipares	87,9	86,6–89,2
Multipares	85,0	83,7–86,3
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	85,9	84,8–87,0
Césarienne	87,4	85,7–89,1
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	84,4	82,0–86,8
Au-dessus du SFR	87,4	86,4–88,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>86,3</b>	<b>85,4–87,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ Chez les femmes qui ont allaité ou essayé d'allaiter leur bébé même pendant un court laps de temps.

## Répartition du moment où la mère a allaité son bébé pour la première fois, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 30.2]

	%	IC 95 %
Cinq minutes ou moins après la naissance	19,8	18,7–20,8
De 6 à 29 minutes après la naissance	21,5	20,4–22,6
De 30 minutes à moins de deux heures après la naissance	26,6	25,5–27,7
Deux heures ou moins après la naissance	21,6	20,6–22,7
Le bébé a reçu du lait maternel extrait à l'aide d'une pompe	0,8	0,5–1,0
Le bébé n'a pas été allaité	9,7	9,0–10,4

IC – Intervalle de confiance.

## Répartition des méthodes d'allaitement pendant la première semaine après la naissance, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 30.5]

	%	IC 95 %
Allaitement à la demande	49,8	48,5–51,2
Allaitement selon un horaire déterminé	17,7	16,6–18,7
Combinaison de l'allaitement à la demande et selon un horaire déterminé	32,5	31,2–33,8

IC – Intervalle de confiance.

# 31 Contact à domicile et satisfaction à l'égard des soins postnataux

**Proportion de femmes qui ont été contactées à leur domicile par un professionnel de la santé après la naissance, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 31.1]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	99,2	98,3–100,0
Île-du-Prince-Édouard	100,0	100,0–100,0
Nouvelle-Écosse	98,6	97,5–99,6
Nouveau-Brunswick	75,1	70,7–79,4
Québec	95,7	94,6–96,8
Ontario	87,7	86,3–89,1
Manitoba	98,5	97,4–99,7
Saskatchewan	97,1	95,5–98,7
Alberta	99,4	98,8–100,0
Colombie-Britannique	99,6	99,1–100,0
Yukon	91,2	87,5–94,8
Territoires du Nord-Ouest	83,5	79,2–87,8
Nunavut	62,9	55,7–70,1
<b>Canada</b>	<b>93,3</b>	<b>92,6–93,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont été contactées à leur domicile par un professionnel de la santé après la naissance, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	95,9	93,5–98,3
20–24	92,8	90,9–94,7
25–29	93,8	92,7–94,9
30–34	93,1	91,9–94,2
35–39	94,0	92,3–95,7
≥40	87,5	82,4–92,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	92,0	89,4–94,6
Diplôme d'études secondaires	93,1	91,6–94,7
Diplôme d'études postsecondaires	93,5	92,4–94,5
Diplôme universitaire	93,6	92,4–94,7
<b>Parité</b>		
Primipares	94,6	93,7–95,5
Multipares	92,2	91,3–93,1
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	93,5	92,8–94,3
Césarienne	92,5	91,2–93,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	91,8	90,2–93,4
Au-dessus du SFR	94,0	93,3–94,8
<b>Toutes les femmes</b>	<b>93,3</b>	<b>92,6–93,9</b>

IC – Intervalle de confiance.



**Nombre moyen de jours qui se sont écoulés avant le premier contact à domicile par un professionnel de la santé, parmi les femmes qui ont été contactées, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 31.2]

Province/territoire	Depuis la naissance		Depuis la sortie de l'hôpital §	
	Moyenne	IC 95 %	Moyenne	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	7,3	6,6–8,0	4,3	3,6–5,0
Île-du-Prince-Édouard	7,1	6,5–7,7	3,3	2,8–3,9
Nouvelle-Écosse	8,7	7,8–9,7	5,5	4,6–6,4
Nouveau-Brunswick	14,6	11,6–17,7	11,8	8,8–14,8
Québec	6,6	6,2–7,0	3,8	3,4–4,1
Ontario	8,3	7,9–8,7	5,9	5,5–6,4
Manitoba	6,2	5,5–6,8	3,6	3,0–4,2
Saskatchewan	6,7	6,1–7,4	3,9	3,3–4,4
Alberta	4,1	3,8–4,4	2,1	1,8–2,4
Colombie-Britannique	5,6	5,1–6,1	3,2	2,7–3,6
Yukon	7,5	6,3–8,7	4,1	3,0–5,2
Territoires du Nord-Ouest	11,0	9,3–12,7	8,2	6,5–9,9
Nunavut	7,2	5,9–8,5	5,5	4,3–6,6
<b>Canada</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7–7,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2–4,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

§ On estime les jours écoulés après la sortie de l'hôpital en soustrayant la durée du séjour à l'hôpital après l'accouchement de l'âge du bébé au moment du contact à domicile. Les accouchements au domicile sont exclus.

## Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard des soins maternels postnataux, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 31.3]

Province/territoire	Très satisfaites		Assez satisfaites		Ni satisfaites ni insatisfaites		Assez ou très insatisfaites	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	71,6	67,1–76,0	22,2	18,1–26,3	3,8 †	1,9–5,7	2,5 †	0,9–4,0
Île-du-Prince-Édouard	73,4	69,8–77,0	21,2	17,8–24,5	*		3,8 †	2,1–5,5
Nouvelle-Écosse	74,5	70,4–78,7	18,0	14,4–21,7	3,3 †	1,5–5,1	4,1 †	2,2–6,1
Nouveau-Brunswick	73,5	69,1–77,8	19,9	16,0–23,9	2,5 †	1,0–3,9	4,1 †	2,1–6,2
Québec	56,8	54,0–59,5	32,6	30,1–35,2	6,6	5,3–8,0	4,0	2,9–5,0
Ontario	67,9	65,9–69,9	23,1	21,3–25,0	4,4	3,5–5,4	4,5	3,6–5,5
Manitoba	64,2	59,6–68,9	27,2	22,8–31,5	4,8 †	2,7–6,9	3,8 †	1,9–5,6
Saskatchewan	73,5	69,3–77,7	21,8	17,9–25,7	1,8 ‡	0,5–3,1	2,9 †	1,3–4,5
Alberta	67,5	63,9–71,0	22,1	19,0–25,2	5,7	4,0–7,4	4,7 †	3,1–6,3
Colombie-Britannique	71,2	67,7–74,7	20,8	17,6–24,1	4,0 †	2,5–5,4	4,0 †	2,5–5,4
Yukon	85,1	81,0–89,3	9,8 †	6,3–13,2	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	68,9	63,6–74,2	20,7	15,9–25,4	*		8,4 †	5,2–11,7
Nunavut	44,4	37,1–51,6	39,6	32,6–46,5	6,5 †	2,9–10,1	9,6 †	5,3–13,9
<b>Canada</b>	<b>66,0</b>	<b>64,8–67,1</b>	<b>24,9</b>	<b>23,8–26,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3–5,4</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7–4,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition de la satisfaction des femmes à l'égard des soins postnataux reçus par le bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 31.4]

Province/territoire	Très satisfaites		Assez satisfaites		Ni satisfaites ni insatisfaites		Assez ou très insatisfaites	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	74,2	69,8–78,5	22,2	18,0–26,5	*		2,8 †	1,2–4,4
Île-du-Prince-Édouard	74,5	71,0–78,1	17,9	14,7–21,0	*		6,5	4,5–8,6
Nouvelle-Écosse	81,2	77,6–84,8	14,9	11,6–18,2	1,4 ‡	0,3–2,6	2,4 †	1,0–3,9
Nouveau-Brunswick	82,9	79,3–86,6	12,5	9,3–15,7	*		3,6 †	1,8–5,4
Québec	65,3	62,7–67,8	27,7	25,3–30,1	2,8	1,9–3,7	4,2	3,2–5,3
Ontario	77,6	75,8–79,4	17,2	15,6–18,9	1,7 †	1,2–2,3	3,4	2,6–4,2
Manitoba	76,5	72,2–80,8	20,2	16,2–24,2	*		2,1 ‡	0,7–3,4
Saskatchewan	81,5	77,6–85,4	14,7	11,2–18,2	*		3,2 †	1,5–4,9
Alberta	75,5	72,2–78,7	16,9	14,1–19,7	2,8 †	1,6–4,1	4,8 †	3,2–6,5
Colombie-Britannique	77,0	73,8–80,2	17,0	14,0–19,9	3,0 †	1,7–4,3	3,0 †	1,7–4,4
Yukon	86,5	82,5–90,5	10,2 †	6,6–13,8	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	63,3	57,8–68,8	26,2	21,3–31,2	*		9,4 †	6,0–12,9
Nunavut	61,5	54,1–68,9	29,5	22,7–36,2	*		*	
<b>Canada</b>	<b>74,5</b>	<b>73,4–75,6</b>	<b>19,6</b>	<b>18,7–20,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8–2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2–4,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

## 32 Information postnatale

### Répartition des sources d'information postnatale jugées les plus utiles par les femmes, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

(Partie 1 de 2)

[Contient les données pour Figure 32.1]

Province/territoire	Professionnel de la santé §		Famille/amis		Livres		Grossesse précédente	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	37,4	32,6–42,2	24,8	20,5–29,2	15,0	11,4–18,6	12,4	9,2–15,6
Île-du-Prince-Édouard	29,2	25,4–33,0	24,2	20,6–27,8	21,4	17,9–24,8	13,1	10,3–15,9
Nouvelle-Écosse	38,3	33,8–42,8	23,4	19,5–27,3	19,7	16,1–23,3	11,1	8,1–14,1
Nouveau-Brunswick	22,7	18,6–26,8	24,9	20,4–29,3	20,4	16,3–24,4	16,0	12,4–19,5
Québec	17,0	15,0–19,1	21,3	19,1–23,5	22,7	20,4–25,0	26,2	24,1–28,2
Ontario	31,9	29,8–33,9	20,8	19,1–22,5	17,8	16,2–19,5	15,8	14,3–17,4
Manitoba	39,5	34,6–44,5	20,4	16,3–24,6	15,0	11,4–18,6	16,1	12,7–19,5
Saskatchewan	31,8	27,1–36,5	18,8	15,0–22,5	19,7	15,8–23,6	19,0	15,3–22,8
Alberta	34,3	30,9–37,7	18,4	15,5–21,2	17,2	14,3–20,1	16,8	14,0–19,6
Colombie-Britannique	35,4	31,7–39,1	18,6	15,7–21,4	18,1	15,2–21,0	17,3	14,6–20,0
Yukon	32,8	27,0–38,6	18,0	13,3–22,6	15,3	10,9–19,7	26,0	20,9–31,0
Territoires du Nord-Ouest	36,6	31,3–42,0	20,1	15,6–24,7	13,5	9,6–17,4	23,9	19,0–28,8
Nunavut	37,8	30,7–45,0	39,5	32,1–47,0	5,8 †	2,4–9,3	15,5	10,6–20,4
<b>Canada</b>	<b>29,4</b>	<b>28,3–30,5</b>	<b>20,5</b>	<b>19,5–21,5</b>	<b>18,9</b>	<b>17,9–20,0</b>	<b>18,5</b>	<b>17,6–19,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Obstétricien/gynécologue, médecin de famille/médecin généraliste, sage-femme et infirmière/infirmière praticienne.

\*\*Inclut les doulas.

## Répartition des sources d'information postnatale jugées les plus utiles par les femmes, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

(Partie 2 de 2)

[Contient les données pour Figure 32.1]

Province/territoire	Internet		Cours prénataux		Autre**	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	3,1 †	1,4–4,8	1,6 ‡	0,5–2,8	5,7 †	3,4–7,9
Île-du-Prince-Édouard	*		*		7,7	5,4–10,0
Nouvelle-Écosse	2,5 †	1,1–4,0	1,7 ‡	0,5–3,0	3,2 †	1,6–4,8
Nouveau-Brunswick	4,7 †	2,7–6,8	3,9 †	1,9–5,9	7,5 †	4,8–10,2
Québec	2,7 †	1,8–3,6	2,1 †	1,3–2,9	8,0	6,5–9,4
Ontario	5,9	4,8–6,9	2,1	1,5–2,8	5,7	4,6–6,7
Manitoba	4,4 †	2,4–6,4	*		3,8 †	1,9–5,7
Saskatchewan	3,5 †	1,7–5,3	2,7 †	1,1–4,2	4,5 †	2,5–6,6
Alberta	3,8 †	2,4–5,2	2,9 †	1,6–4,2	6,7	4,8–8,5
Colombie-Britannique	5,0 †	3,4–6,7	1,6 ‡	0,5–2,6	4,0 †	2,5–5,5
Yukon	*		*		*	
Territoires du Nord-Ouest	*		*		*	
Nunavut	*		*		*	
<b>Canada</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9–5,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8–2,5</b>	<b>6,0</b>	<b>5,4–6,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Obstétricien/gynécologue, médecin de famille/médecin généraliste, sage-femme et infirmière/infirmière praticienne.

\*\*Inclut les doulas.

**Répartition des sources d'information postnatale jugées les plus utiles par les femmes, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

(Partie 1 de 2)

[Contient les données pour Figure 32.2]

	Professionnel de la santé §		Famille/amis		Livres		Grossesse précédente	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	28,1	22,8–33,4	45,2	39,2–51,1	10,9 †	7,2–14,6	2,3 ‡	0,5–4,0
20–24	32,4	29,2–35,6	32,5	29,3–35,8	16,7	14,1–19,4	9,8	7,6–11,9
25–29	29,7	27,6–31,8	20,4	18,6–22,1	19,0	17,2–20,8	17,1	15,5–18,8
30–34	27,7	25,8–29,6	17,0	15,4–18,6	21,0	19,2–22,8	21,4	19,7–23,0
35–39	29,8	26,6–33,0	15,2	12,7–17,7	17,5	14,9–20,1	25,1	22,1–28,0
≥40	29,1	22,5–35,8	11,8 †	6,9–16,8	21,1	14,6–27,6	25,7	19,0–32,4
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	34,3	30,0–38,5	28,4	24,5–32,3	9,6	7,0–12,2	18,0	14,4–21,6
Diplôme d'études secondaires	30,7	28,2–33,3	22,0	19,7–24,2	18,0	15,7–20,3	18,9	16,6–21,2
Diplôme d'études postsecondaires	30,1	28,1–32,0	20,2	18,5–21,9	18,2	16,6–19,9	18,5	17,0–20,1
Diplôme universitaire	26,9	25,0–28,9	18,1	16,5–19,7	22,0	20,2–23,8	18,7	17,0–20,3
<b>Parité</b>								
Primipares	29,3	27,6–31,0	31,8	30,1–33,5	22,8	21,1–24,4	0,2 ‡	0,0–0,4
Multipares	29,4	27,8–31,0	11,2	10,2–12,3	15,8	14,5–17,1	33,6	31,9–35,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	32,3	29,5–35,1	19,7	17,4–22,1	13,2	11,2–15,2	21,9	19,5–24,4
Au-dessus du SFR	28,8	27,4–30,1	19,4	18,3–20,6	20,7	19,5–22,0	18,3	17,2–19,4
<b>Toutes les femmes</b>	<b>29,4</b>	<b>28,3–30,5</b>	<b>20,5</b>	<b>19,5–21,5</b>	<b>18,9</b>	<b>17,9–20,0</b>	<b>18,5</b>	<b>17,6–19,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Obstétricien/gynécologue, médecin de famille/médecin généraliste, sage-femme et infirmière/infirmière praticienne.

\*\*Inclut les doulas.

**Répartition des sources d'information postnatale jugées les plus utiles par les femmes, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

(Partie 2 de 2)

[Contient les données pour Figure 32.2]

	Internet		Cours prénataux		Autre**	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	1,9 ‡	0,2–3,6	2,1 ‡	0,3–3,9	9,6 †	6,2–13,0
20–24	2,1 †	1,1–3,1	2,7 †	1,5–3,9	3,8 †	2,4–5,1
25–29	5,3	4,2–6,4	2,5	1,8–3,2	6,0	5,0–7,1
30–34	4,9	3,9–5,9	1,9	1,3–2,6	6,1	5,1–7,2
35–39	4,3 †	2,8–5,7	1,4 †	0,6–2,1	6,8	5,1–8,6
≥40	3,6 ‡	0,7–6,4	*		6,2 †	2,5–9,9
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	1,6 ‡	0,4–2,7	2,3 †	0,8–3,8	5,8 †	3,7–8,0
Diplôme d'études secondaires	3,2 †	2,1–4,3	1,7 †	0,9–2,4	5,6	4,3–6,9
Diplôme d'études postsecondaires	4,9	4,0–5,8	2,4	1,8–3,1	5,6	4,6–6,6
Diplôme universitaire	5,4	4,4–6,5	2,1	1,5–2,8	6,7	5,6–7,8
<b>Parité</b>						
Primipares	5,9	5,0–6,8	3,7	2,9–4,4	6,3	5,4–7,3
Multipares	3,3	2,7–4,0	0,9 †	0,6–1,2	5,7	4,9–6,6
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	3,2 †	2,2–4,3	2,6 †	1,6–3,7	7,0	5,5–8,4
Au-dessus du SFR	5,0	4,3–5,7	2,1	1,7–2,5	5,8	5,0–6,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9–5,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8–2,5</b>	<b>6,0</b>	<b>5,4–6,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Obstétricien/gynécologue, médecin de famille/médecin généraliste, sage-femme et infirmière/infirmière praticienne.

\*\*Inclut les doulas.

**Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur des questions postnatales, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

(Partie 1 de 2)

[Contient les données pour Figure 32.3]

Province/territoire	Lait maternisé		Allaitement maternel		Réactions et émotions sexuelles		Contraception après la naissance		Dépression post-partum	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	82,4	78,6–86,2	89,2	86,1–92,3	78,3	74,2–82,4	91,7	88,8–94,5	91,0	88,1–94,0
Île-du-Prince-Édouard	81,9	78,8–85,0	91,8	89,5–94,0	77,7	74,3–81,1	90,2	87,7–92,7	91,3	88,9–93,6
Nouvelle-Écosse	78,9	75,1–82,8	91,5	88,9–94,1	78,2	74,3–82,1	86,6	83,3–89,9	93,8	91,5–96,1
Nouveau-Brunswick	81,1	77,2–85,0	92,4	89,7–95,1	74,2	69,8–78,6	88,4	85,2–91,7	89,6	86,5–92,7
Québec	77,7	75,5–79,9	91,4	89,9–92,9	78,9	76,8–81,1	90,9	89,4–92,5	88,7	87,0–90,4
Ontario	81,5	79,8–83,2	92,3	91,1–93,4	76,4	74,5–78,4	87,7	86,2–89,2	92,2	91,0–93,4
Manitoba	81,6	77,7–85,4	93,4	91,0–95,9	73,8	69,4–78,2	89,0	86,0–92,1	90,9	88,0–93,8
Saskatchewan	79,8	75,9–83,6	92,6	90,0–95,1	73,5	69,2–77,8	89,2	86,1–92,3	92,0	89,4–94,6
Alberta	79,5	76,4–82,5	92,4	90,4–94,4	78,0	74,8–81,2	87,7	85,2–90,1	95,1	93,5–96,7
Colombie-Britannique	73,7	70,4–77,0	94,5	92,7–96,2	72,8	69,4–76,2	87,9	85,6–90,3	93,9	92,1–95,7
Yukon	66,1	60,3–71,8	94,9	92,1–97,7	80,3	75,6–84,9	96,5	94,3–98,7	95,1	92,7–97,6
Territoires du Nord-Ouest	80,0	75,5–84,4	90,0	86,7–93,2	82,8	78,6–87,0	89,2	85,6–92,8	89,8	86,5–93,1
Nunavut	73,5	67,1–79,8	84,1	78,8–89,3	73,5	67,2–79,9	80,5	74,8–86,2	77,5	71,5–83,4
<b>Canada</b>	<b>79,3</b>	<b>78,3–80,3</b>	<b>92,3</b>	<b>91,6–93,0</b>	<b>76,6</b>	<b>75,6–77,7</b>	<b>88,6</b>	<b>87,8–89,5</b>	<b>91,8</b>	<b>91,1–92,5</b>

IC – Intervalle de confiance.



**Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur des questions postnatales, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

(Partie 2 de 2)

[Contient les données pour Figure 32.3]

Province/territoire	Sentiments négatifs après l'accouchement, p. ex., anxiété		Utilisation d'un siège-auto pour bébé		Syndrome de la mort subite du nourrisson (SMSN)		Exigences physiques sur le corps pendant les premiers mois après la naissance		Effet du nouveau bébé sur la relation avec le mari ou le conjoint	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	91,1	88,1–94,0	93,8	91,5–96,1	93,6	91,2–96,1	84,6	81,1–88,1	87,2	83,8–90,7
Île-du-Prince-Édouard	92,4	90,2–94,6	92,4	90,3–94,5	94,5	92,6–96,4	83,1	80,1–86,2	85,8	83,0–88,6
Nouvelle-Écosse	91,5	88,8–94,1	93,7	91,4–95,9	94,6	92,5–96,7	85,1	81,8–88,4	84,7	81,3–88,1
Nouveau-Brunswick	88,6	85,4–91,9	93,0	90,5–95,6	88,6	85,4–91,8	80,8	76,9–84,7	82,0	78,2–85,8
Québec	87,9	86,1–89,7	92,1	90,6–93,6	86,2	84,3–88,1	79,7	77,6–81,9	85,5	83,6–87,4
Ontario	91,6	90,3–92,8	93,3	92,2–94,3	90,9	89,6–92,2	83,0	81,3–84,7	84,3	82,7–86,0
Manitoba	86,6	83,3–90,0	91,1	88,2–93,9	88,1	84,8–91,3	82,6	78,9–86,4	82,9	79,1–86,7
Saskatchewan	91,9	89,2–94,7	93,0	90,5–95,6	95,2	93,1–97,4	83,5	80,1–87,0	85,8	82,4–89,2
Alberta	94,3	92,6–96,0	95,8	94,3–97,3	91,5	89,5–93,5	83,1	80,3–85,8	85,2	82,6–87,8
Colombie-Britannique	92,5	90,5–94,5	94,6	93,0–96,3	93,1	91,1–95,0	80,6	77,7–83,6	82,8	80,0–85,6
Yukon	94,9	92,3–97,5	91,6	88,3–94,9	93,4	90,4–96,3	90,0	86,5–93,5	90,0	86,5–93,6
Territoires du Nord-Ouest	86,2	82,2–90,1	84,4	80,3–88,4	79,0	74,3–83,7	78,9	74,5–83,3	82,4	78,1–86,7
Nunavut	75,8	69,7–81,9	53,4	45,6–61,1	77,1	70,6–83,7	76,9	70,9–83,0	78,0	71,7–84,3
<b>Canada</b>	<b>90,9</b>	<b>90,1–91,6</b>	<b>93,3</b>	<b>92,7–93,9</b>	<b>90,2</b>	<b>89,4–91,0</b>	<b>82,0</b>	<b>81,0–82,9</b>	<b>84,5</b>	<b>83,6–85,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur des questions postnatales, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

(Partie 1 de 2)

	Lait maternisé		Allaitement maternel		Réactions et émotions sexuelles		Contraception après la naissance		Dépression post-partum	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>										
15–19	85,6	81,5–89,7	90,4	87,0–93,8	73,0	67,4–78,5	86,7	82,7–90,8	88,8	84,8–92,9
20–24	81,0	78,1–83,8	92,5	90,6–94,4	73,4	70,3–76,4	83,5	80,7–86,2	89,7	87,4–91,9
25–29	78,0	76,2–79,8	91,9	90,6–93,1	78,1	76,3–80,0	89,1	87,7–90,5	92,0	90,8–93,3
30–34	78,6	76,7–80,4	92,2	90,9–93,4	77,0	75,1–79,0	89,5	88,1–90,9	92,1	90,9–93,3
35–39	80,2	77,5–82,9	93,8	92,1–95,4	76,6	73,6–79,6	91,1	89,1–93,1	94,0	92,3–95,6
≥40	84,2	78,9–89,6	93,6	89,9–97,3	77,2	70,7–83,7	88,2	83,1–93,3	89,9	85,2–94,6
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>										
Études secondaires non terminées	86,5	83,5–89,5	90,9	88,4–93,3	78,8	75,1–82,5	86,6	83,4–89,9	87,0	83,8–90,2
Diplôme d'études secondaires	82,8	80,8–84,8	91,2	89,5–92,9	75,0	72,6–77,5	87,0	84,9–89,0	90,4	88,7–92,0
Diplôme d'études postsecondaires	81,1	79,5–82,8	92,5	91,4–93,6	77,7	76,0–79,5	89,6	88,2–90,9	92,8	91,7–93,9
Diplôme universitaire	73,8	71,9–75,7	93,1	91,9–94,2	76,1	74,2–77,9	89,2	87,8–90,5	93,0	91,8–94,1
<b>Parité</b>										
Primipares	73,7	72,1–75,3	89,8	88,6–90,9	73,4	71,7–75,1	86,5	85,1–87,8	91,4	90,4–92,4
Multipares	83,9	82,6–85,1	94,4	93,6–95,2	79,4	78,0–80,8	90,5	89,4–91,5	92,2	91,3–93,1
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	85,5	83,4–87,6	92,9	91,4–94,4	76,4	73,9–79,0	87,2	85,2–89,2	89,1	87,3–91,0
Au-dessus du SFR	77,5	76,3–78,7	92,3	91,5–93,1	77,4	76,2–78,6	89,4	88,5–90,4	93,3	92,5–94,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>79,3</b>	<b>78,3–80,3</b>	<b>92,3</b>	<b>91,6–93,0</b>	<b>76,6</b>	<b>75,6–77,7</b>	<b>88,6</b>	<b>87,8–89,5</b>	<b>91,8</b>	<b>91,1–92,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information sur des questions postnatales, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

(Partie 2 de 2)

	Sentiments négatifs après l'accouchement, p. ex., anxiété		Utilisation d'un siège-auto pour bébé		Syndrome de la mort subite du nourrisson (SMSN)		Exigences physiques sur le corps pendant les premiers mois après la naissance		Effet du nouveau bébé sur la relation avec le mari ou le conjoint	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>										
15–19	89,0	85,2–92,8	94,5	92,1–97,0	88,3	84,3–92,2	77,2	72,1–82,4	77,9	72,9–83,0
20–24	89,8	87,7–92,0	92,5	90,7–94,3	86,2	83,7–88,7	81,3	78,6–84,0	81,0	78,3–83,8
25–29	91,2	89,9–92,5	93,1	92,0–94,2	90,0	88,6–91,4	81,6	79,8–83,3	85,3	83,7–86,9
30–34	90,4	89,1–91,7	93,9	92,9–94,9	92,1	90,9–93,2	82,5	80,8–84,1	85,4	83,9–87,0
35–39	92,5	90,6–94,3	92,7	91,0–94,5	90,4	88,3–92,5	83,6	81,1–86,2	85,5	83,1–88,0
≥40	91,4	87,0–95,7	92,8	88,8–96,8	89,9	85,2–94,7	80,1	73,8–86,4	85,3	79,5–91,1
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>										
Études secondaires non terminées	89,1	86,3–92,0	91,6	89,1–94,1	83,9	80,5–87,2	83,0	79,6–86,4	81,2	77,7–84,8
Diplôme d'études secondaires	89,2	87,4–91,0	93,4	91,9–94,8	86,5	84,5–88,5	82,6	80,5–84,8	82,6	80,4–84,9
Diplôme d'études postsecondaires	91,5	90,3–92,7	93,6	92,6–94,6	90,7	89,5–91,9	84,0	82,5–85,6	85,8	84,3–87,2
Diplôme universitaire	91,9	90,7–93,1	93,3	92,3–94,3	93,1	91,9–94,2	79,2	77,5–80,9	85,2	83,6–86,8
<b>Parité</b>										
Primipares	89,4	88,2–90,5	91,2	90,1–92,2	91,2	90,1–92,3	74,8	73,1–76,5	82,3	80,8–83,7
Multipares	92,1	91,2–93,1	95,1	94,4–95,8	89,4	88,4–90,5	87,8	86,6–88,9	86,4	85,2–87,7
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>										
Au niveau ou au-dessous du SFR	89,8	88,0–91,7	93,7	92,3–95,1	84,9	82,7–87,1	82,0	79,7–84,3	82,1	79,7–84,5
Au-dessus du SFR	91,8	91,0–92,6	93,3	92,6–94,0	92,2	91,4–93,1	82,3	81,1–83,4	85,8	84,7–86,8
<b>Toutes les femmes</b>	<b>90,9</b>	<b>90,1–91,6</b>	<b>93,3</b>	<b>92,7–93,9</b>	<b>90,2</b>	<b>89,4–91,0</b>	<b>82,0</b>	<b>81,0–82,9</b>	<b>84,5</b>	<b>83,6–85,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

# 33 Congé de maternité

## Répartition du statut d'emploi des femmes pendant la grossesse et de la réception de prestations de maternité ou parentales, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 33.1]

Province/territoire	Ont travaillé et ont reçu des prestations		Ont travaillé et n'ont pas reçu de prestations		Ont travaillé mais ne savent pas si elles ont reçu des prestations		N'ont pas travaillé	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	65,3	60,9–69,7	12,6	9,4–15,7	*		21,0	17,0–24,9
Île-du-Prince-Édouard	83,2	80,2–86,3	7,6	5,4–9,7	*		8,1	5,9–10,3
Nouvelle-Écosse	70,2	66,0–74,4	11,9	8,9–14,8	*		17,3	13,7–20,9
Nouveau-Brunswick	71,1	66,5–75,6	11,4	8,3–14,5	*		16,9	13,0–20,8
Québec	78,6	76,4–80,8	2,8	1,9–3,7	0,4 ‡	0,1–0,7	18,2	16,1–20,3
Ontario	66,4	64,4–68,5	10,4	9,1–11,7	1,0 †	0,6–1,4	22,2	20,4–24,0
Manitoba	65,8	61,2–70,4	10,9	7,8–14,0	*		22,8	18,6–26,9
Saskatchewan	62,7	58,2–67,3	11,8	8,6–15,0	*		24,3	20,2–28,4
Alberta	58,5	54,8–62,1	14,8	12,2–17,4	2,0 †	0,9–3,0	24,8	21,5–28,1
Colombie-Britannique	65,7	62,2–69,1	10,8	8,5–13,2	1,7 †	0,7–2,6	21,8	18,7–24,9
Yukon	73,6	68,5–78,8	9,8 †	6,3–13,2	*		16,6	12,1–21,2
Territoires du Nord-Ouest	54,9	49,2–60,7	14,8	10,9–18,8	*		27,9	22,7–33,1
Nunavut	36,4	29,4–43,4	23,7	17,4–29,9	*		37,5	30,5–44,4
<b>Canada</b>	<b>68,3</b>	<b>67,1–69,4</b>	<b>9,3</b>	<b>8,6–10,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8–1,3</b>	<b>21,4</b>	<b>20,3–22,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition du statut d'emploi des femmes pendant la grossesse et de la réception de prestations de maternité ou parentales, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 33.2 et Figure 33.3]

	Ont travaillé et ont reçu des prestations		Ont travaillé et n'ont pas reçu de prestations		Ont travaillé mais ne savent pas si elles ont reçu des prestations		N'ont pas travaillé	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	36,5	30,8–42,2	24,2	19,2–29,2	*		38,8	32,9–44,6
20–24	59,8	56,2–63,4	10,8	8,6–13,1	0,8 ‡	0,2–1,4	28,6	25,3–31,8
25–29	71,4	69,3–73,4	7,5	6,2–8,7	0,7 †	0,4–1,1	20,4	18,6–22,2
30–34	72,2	70,2–74,1	8,8	7,5–10,0	1,1 †	0,6–1,6	17,9	16,2–19,7
35–39	68,9	65,8–72,0	9,9	8,0–11,9	1,5 †	0,6–2,3	19,8	17,1–22,5
≥40	57,3	49,8–64,7	11,8 †	7,0–16,6	*		28,6	21,9–35,4
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	35,7	31,4–40,0	14,0	10,9–17,0	*		49,7	45,4–54,1
Diplôme d'études secondaires	59,8	56,8–62,7	10,3	8,6–12,1	1,0 †	0,5–1,6	28,9	26,1–31,7
Diplôme d'études postsecondaires	73,2	71,4–75,0	9,1	8,0–10,3	1,0 †	0,6–1,4	16,7	15,2–18,2
Diplôme universitaire	75,4	73,6–77,2	8,1	7,0–9,2	1,1 †	0,6–1,6	15,4	13,8–16,9
<b>Parité</b>								
Primipares	79,5	78,0–80,9	8,1	7,1–9,1	0,6 †	0,3–0,9	11,8	10,6–13,0
Multipares	59,1	57,4–60,8	10,4	9,3–11,4	1,3	0,9–1,7	29,2	27,6–30,8
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	46,3	43,2–49,4	13,1	11,1–15,2	*		40,4	37,4–43,3
Au-dessus du SFR	75,6	74,3–76,8	8,4	7,5–9,2	1,2	0,9–1,6	14,8	13,8–15,9
<b>Toutes les femmes</b>	<b>68,3</b>	<b>67,1–69,4</b>	<b>9,3</b>	<b>8,6–10,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8–1,3</b>	<b>21,4</b>	<b>20,3–22,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Proportion de femmes qui ont occupé un emploi rémunéré ou travaillé à leur propre compte à un moment donné pendant la grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	79,0	75,1–83,0
Île-du-Prince-Édouard	91,9	89,7–94,1
Nouvelle-Écosse	82,7	79,1–86,3
Nouveau-Brunswick	83,1	79,2–87,0
Québec	81,8	79,7–83,9
Ontario	77,8	76,0–79,6
Manitoba	77,2	73,1–81,4
Saskatchewan	75,7	71,6–79,8
Alberta	75,2	71,9–78,5
Colombie-Britannique	78,2	75,1–81,3
Yukon	83,4	78,8–87,9
Territoires du Nord-Ouest	72,1	66,9–77,3
Nunavut	62,5	55,6–69,5
<b>Canada</b>	<b>78,6</b>	<b>77,6–79,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont occupé un emploi rémunéré ou travaillé à leur propre compte à un moment donné pendant la grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<i>Âge de la mère (années)</i>		
15–19	61,2	55,4–67,1
20–24	71,4	68,2–74,7
25–29	79,6	77,8–81,4
30–34	82,1	80,4–83,8
35–39	80,2	77,5–82,9
≥40	71,4	64,6–78,1
<i>Niveau de scolarité de la mère</i>		
Études secondaires non terminées	50,3	45,9–54,6
Diplôme d'études secondaires	71,1	68,3–73,9
Diplôme d'études postsecondaires	83,3	81,8–84,8
Diplôme universitaire	84,6	83,1–86,2
<i>Parité</i>		
Primipares	88,2	87,0–89,4
Multipares	70,8	69,2–72,5
<i>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</i>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	59,6	56,7–62,6
Au-dessus du SFR	85,2	84,1–86,2
<b>Toutes les femmes</b>	<b>78,6</b>	<b>77,6–79,7</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Pourcentage cumulatif de femmes qui ont arrêté de travailler pendant la grossesse, selon le nombre de semaines de grossesse, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 33.4]

Nombre de semaines de grossesse	%	IC 95 %
0–13	9,3	8,5–10,1
14–27	22,9	21,8–24,1
28	24,2	23,0–25,3
29	24,5	23,4–25,7
30	33,5	32,2–34,7
31	33,9	32,6–35,2
32	36,8	35,5–38,1
33	37,9	36,6–39,2
34	55,7	54,3–57,1
35	59,2	57,8–60,6
36	67,5	66,3–68,8
37	74,6	73,3–75,8
38	92,9	92,2–93,7
39	97,1	96,7–97,6
≥40	100,0	100,0–100,0

IC – Intervalle de confiance.



**Proportion de femmes qui sont retournées travailler dans les six mois suivant la naissance, selon la province ou le territoire, Canada 2006–2007 §**

[Contient les données pour Figure 33.5]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	18,5	14,1–22,8
Île-du-Prince-Édouard	21,3	17,5–25,0
Nouvelle-Écosse	17,0	13,1–20,9
Nouveau-Brunswick	14,6	10,9–18,3
Québec	9,4	7,7–11,0
Ontario	10,4	9,0–11,8
Manitoba	12,8	9,2–16,3
Saskatchewan	15,4	11,6–19,2
Alberta	14,3	11,5–17,0
Colombie-Britannique	13,4	10,6–16,2
Yukon	11,5 †	7,6–15,5
Territoires du Nord-Ouest	20,5	16,0–25,0
Nunavut	13,3 †	8,4–18,2
<b>Canada</b>	<b>11,6</b>	<b>10,8–12,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

§ Les femmes qui ont été interrogées moins de six mois après leur accouchement ont été exclues.

## 34 Santé postnatale de la mère

Proportion de femmes qui ont fait état d'au moins « un gros problème » de santé postnatale dans les trois premiers mois après l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	42,4	37,4–47,4
Île-du-Prince-Édouard	28,9	25,1–32,6
Nouvelle-Écosse	37,8	33,4–42,1
Nouveau-Brunswick	37,9	32,9–42,8
Québec	46,4	43,8–49,1
Ontario	42,6	40,4–44,7
Manitoba	43,4	38,6–48,2
Saskatchewan	36,6	31,9–41,3
Alberta	39,7	36,2–43,3
Colombie-Britannique	39,7	36,0–43,3
Yukon	39,9	34,1–45,8
Territoires du Nord-Ouest	35,9	30,8–41,1
Nunavut	24,1	18,0–30,3
<b>Canada</b>	<b>42,3</b>	<b>41,1–43,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes qui ont fait état d'au moins « un gros problème » de santé postnatale dans les trois premiers mois après l'accouchement, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	53,6	47,6–59,5
20–24	46,5	42,9–50,1
25–29	41,3	39,1–43,4
30–34	40,8	38,7–42,8
35–39	43,6	40,1–47,0
≥40	34,5	27,1–41,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	49,9	45,3–54,6
Diplôme d'études secondaires	40,3	37,5–43,0
Diplôme d'études postsecondaires	42,1	40,0–44,1
Diplôme universitaire	41,9	39,6–44,1
<b>Parité</b>		
Primipares	47,2	45,4–49,1
Multipares	38,3	36,6–39,9
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	43,2	41,7–44,7
Césarienne	39,9	37,5–42,4
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	44,7	41,7–47,8
Au-dessus du SFR	41,8	40,3–43,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>42,3</b>	<b>41,1–43,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Répartition des problèmes de santé jugés « un gros problème » par les femmes pendant les trois premiers mois qui ont suivi la naissance, selon le type d'accouchement, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 34.1]

Problème de santé postnatal	Accouchement par voie vaginale		Accouchement par césarienne		Toutes les femmes	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Douleurs aux seins	16,5	15,4–17,6	13,5	11,8–15,2	<b>15,7</b>	<b>14,8–16,7</b>
Douleurs aux alentours du vagin ou de l'incision de la césarienne	13,9	12,9–14,9	19,0	17,1–21,0	<b>15,2</b>	<b>14,3–16,2</b>
Douleurs au dos	12,3	11,3–13,2	11,8	10,2–13,4	<b>12,1</b>	<b>11,3–13,0</b>
Hémorroïdes	11,4	10,5–12,4	5,6	4,4–6,7	<b>9,9</b>	<b>9,1–10,6</b>
Douleurs pendant les relations sexuelles	7,2	6,3–8,1	5,0	3,8–6,3	<b>6,6</b>	<b>5,9–7,4</b>
Incontinence urinaire	4,2	3,6–4,8	1,1 †	0,6–1,6	<b>3,4</b>	<b>2,9–3,8</b>
Maux de tête graves	2,1	1,7–2,6	2,7	1,9–3,5	<b>2,3</b>	<b>1,9–2,7</b>
Perte de contrôle des intestins	1,7	1,3–2,1	1,9 †	1,2–2,6	<b>1,8</b>	<b>1,4–2,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Répartition des problèmes de santé jugés « un gros problème » par les femmes pendant les trois premiers mois qui ont suivi la naissance, selon la parité, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 34.2]

Problème de santé postnatal	Primipares		Multipares		Toutes les femmes	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Douleurs aux seins	18,1	16,6–19,5	13,8	12,6–15,0	<b>15,7</b>	<b>14,8–16,7</b>
Douleurs aux alentours du vagin ou de l'incision de la césarienne	20,1	18,6–21,5	11,3	10,2–12,4	<b>15,2</b>	<b>14,3–16,2</b>
Douleurs au dos	12,3	11,0–13,5	12,0	10,9–13,1	<b>12,1</b>	<b>11,3–13,0</b>
Hémorroïdes	10,6	9,5–11,8	9,3	8,3–10,3	<b>9,9</b>	<b>9,1–10,6</b>
Douleurs pendant les relations sexuelles	10,3	8,9–11,6	3,7	3,0–4,5	<b>6,6</b>	<b>5,9–7,4</b>
Incontinence urinaire	4,0	3,3–4,7	2,9	2,3–3,4	<b>3,4</b>	<b>2,9–3,8</b>
Maux de tête graves	2,4	1,8–2,9	2,2	1,7–2,7	<b>2,3</b>	<b>1,9–2,7</b>
Perte de contrôle des intestins	2,2	1,6–2,8	1,4	1,0–1,8	<b>1,8</b>	<b>1,4–2,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes réadmisses à l'hôpital dans les trois premiers mois après l'accouchement, selon le type d'accouchement, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<i>Type d'accouchement</i>		
Voie vaginale	2,3	1,8–2,7
Césarienne	3,0	2,2–3,9
<b>Toutes les femmes</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1–2,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant consulté un professionnel de la santé en dehors des consultations postnatales prévues après l'accouchement, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	31,2	26,5–35,8
Île-du-Prince-Édouard	30,4	26,7–34,0
Nouvelle-Écosse	30,8	26,4–35,1
Nouveau-Brunswick	27,6	23,1–32,2
Québec	20,1	17,9–22,2
Ontario	30,2	28,3–32,2
Manitoba	29,3	24,9–33,7
Saskatchewan	28,3	24,0–32,6
Alberta	31,2	27,8–34,6
Colombie-Britannique	31,1	27,6–34,6
Yukon	35,9	30,2–41,6
Territoires du Nord-Ouest	21,2	16,5–25,9
Nunavut	22,5	16,6–28,3
<b>Canada</b>	<b>27,9</b>	<b>26,7–29,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes indiquant qu'il était quelque peu ou très difficile de consulter un professionnel de la santé en dehors des consultations postnatales prévues après l'accouchement chez les femmes qui ont obtenu une telle consultation, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	14,3 †	7,7–20,9
Île-du-Prince-Édouard	23,1	16,8–29,3
Nouvelle-Écosse	16,0 †	9,7–22,3
Nouveau-Brunswick	16,1 †	9,0–23,1
Québec	20,7	15,7–25,8
Ontario	12,9	10,2–15,6
Manitoba	13,6 †	7,3–19,9
Saskatchewan	12,3 †	6,3–18,4
Alberta	19,0	13,8–24,2
Colombie-Britannique	13,2 †	8,5–18,0
Yukon	*	
Territoires du Nord-Ouest	26,3 †	15,5–37,1
Nunavut	30,5 †	16,9–37,1
<b>Canada</b>	<b>15,4</b>	<b>13,6–17,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.



**Proportion de femmes indiquant qu'il était quelque peu ou très difficile de consulter un professionnel de la santé en dehors des consultations postnatales prévues après l'accouchement chez les femmes qui ont obtenu une telle consultation, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	15,5 †	7,5–23,5
20–24	15,5	10,6–20,5
25–29	16,2	13,0–19,5
30–34	15,1	12,1–18,1
35–39	14,3	10,0–18,5
≥40	15,7 †	5,6–25,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	14,3 †	7,7–21,0
Diplôme d'études secondaires	15,1	11,0–19,1
Diplôme d'études postsecondaires	15,5	12,7–18,3
Diplôme universitaire	15,6	12,6–18,6
<b>Parité</b>		
Primipares	14,4	11,8–16,9
Multipares	16,4	13,9–18,9
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	14,9	12,9–17,0
Césarienne	16,5	13,1–20,0
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	16,2	12,0–20,4
Au-dessus du SFR	14,4	12,4–16,3
<b>Toutes les femmes</b>	<b>15,4</b>	<b>13,6–17,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Raisons pour lesquelles des femmes estimaient qu'il était quelque peu ou très difficile d'obtenir une consultation d'un professionnel de la santé en dehors des consultations postnatales prévues après l'accouchement, Canada, 2006–2007 §**

	%	IC 95 %
Le médecin/professionnel de la santé n'était pas disponible	68,4	62,8–74,0
Elle n'avait personne pour prendre soin des enfants	7,8 †	4,5–11,1
Elle était trop occupée	3,6 ‡	1,2–6,0
Elle n'avait pas de moyen de transport	3,7 †	1,3–6,0
Elle ne pouvait pas prendre congé de son emploi	*	
Autre	26,8	21,5–32,2

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Les femmes pouvaient choisir plus d'une réponse.

## Répartition des opinions des femmes sur leur santé postnatale, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 34.3]

Province/territoire	Excellente		Très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	36,9	32,1–41,7	44,2	39,1–49,3	15,3	11,6–19,0	3,6 †	1,7–5,5
Île-du-Prince-Édouard	32,1	28,2–35,9	50,6	46,5–54,6	15,2	12,3–18,1	*	
Nouvelle-Écosse	37,4	32,9–41,9	41,1	36,3–45,8	16,8	13,5–20,2	4,7 †	2,8–6,7
Nouveau-Brunswick	32,3	27,5–37,0	47,2	42,3–52,0	16,7	13,0–20,5	3,8 †	2,0–5,7
Québec	32,0	29,4–34,6	38,1	35,4–40,7	24,5	22,1–26,9	5,4	4,2–6,6
Ontario	33,3	31,1–35,4	39,2	37,1–41,4	22,2	20,3–24,1	5,3	4,3–6,3
Manitoba	33,6	28,9–38,4	40,4	35,6–45,1	21,7	17,7–25,7	4,3 †	2,3–6,2
Saskatchewan	33,1	28,5–37,6	39,6	34,8–44,4	22,0	17,8–26,1	5,4 †	3,2–7,5
Alberta	35,0	31,5–38,5	38,6	35,0–42,2	19,2	16,1–22,2	7,2	5,3–9,1
Colombie-Britannique	35,6	32,1–39,2	36,6	33,0–40,2	23,8	20,4–27,1	4,0 †	2,5–5,5
Yukon	35,5	29,8–41,2	38,1	32,3–44,0	24,8	19,6–30,1	*	
Territoires du Nord-Ouest	30,8	25,6–36,0	39,6	34,0–45,2	22,7	17,8–27,6	7,0 †	3,9–10,0
Nunavut	24,6	18,6–30,6	29,0	22,7–35,3	35,5	28,6–42,4	10,9 †	6,5–15,3
<b>Canada</b>	<b>33,6</b>	<b>32,4–34,7</b>	<b>38,9</b>	<b>37,6–40,2</b>	<b>22,2</b>	<b>21,1–23,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4,7–5,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Répartition des opinions des femmes sur leur santé postnatale, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 34.4 et Figure 34.5]

	Excellente		Très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	20,0	15,1–24,8	39,1	33,2–45,0	28,3	22,8–33,9	12,6	8,9–16,4
20–24	28,9	25,7–32,1	36,0	32,6–39,5	26,1	22,9–29,3	9,0	6,9–11,1
25–29	34,6	32,5–36,8	38,7	36,4–41,0	21,7	19,8–23,6	5,0	4,0–6,0
30–34	34,7	32,6–36,8	40,9	38,8–43,1	20,5	18,6–22,3	3,9	3,0–4,8
35–39	35,4	32,3–38,5	38,6	35,3–42,0	21,5	18,7–24,3	4,4	3,0–5,8
≥40	33,5	26,4–40,6	35,3	27,9–42,7	25,3	18,6–31,9	6,0 †	2,3–9,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	24,2	20,3–28,0	35,2	30,8–39,5	28,9	24,8–33,0	11,8	9,0–14,6
Diplôme d'études secondaires	28,6	26,1–31,2	38,2	35,6–40,9	24,8	22,3–27,2	8,4	6,8–10,0
Diplôme d'études postsecondaires	33,9	31,9–35,9	39,4	37,4–41,5	22,4	20,6–24,1	4,3	3,5–5,2
Diplôme universitaire	38,4	36,2–40,5	39,8	37,6–42,1	18,6	16,9–20,4	3,1	2,4–3,9
<b>Parité</b>								
Primipares	37,1	35,3–39,0	36,4	34,6–38,3	21,2	19,6–22,8	5,2	4,4–6,1
Multipares	30,7	29,1–32,3	40,9	39,2–42,7	23,0	21,5–24,5	5,4	4,6–6,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	23,8	21,4–26,3	35,6	32,7–38,5	31,5	28,8–34,3	9,0	7,4–10,6
Au-dessus du SFR	36,1	34,7–37,5	40,4	38,9–41,9	19,3	18,2–20,5	4,2	3,5–4,8
<b>Toutes les femmes</b>	<b>33,6</b>	<b>32,4–34,7</b>	<b>38,9</b>	<b>37,6–40,2</b>	<b>22,2</b>	<b>21,1–23,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4,7–5,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

# 35 Dépression post-partum, dépression antérieure et soutien

Répartition du score obtenu sur l'Échelle de dépression post-partum d'Édimbourg (EDPE), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 35.1]

Province/territoire	Score de 13 ou plus sur l'EDPE		Score de 10 à 12 sur l'EDPE		Score de 0 à 9 sur l'EDPE	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	7,9 †	5,2–10,6	8,6 †	5,6–11,5	83,5	79,8–87,3
Île-du-Prince-Édouard	5,0 †	3,2–6,8	4,4 †	2,7–6,1	90,6	88,2–93,0
Nouvelle-Écosse	6,5 †	4,2–8,8	8,4	5,9–11,0	85,0	81,8–88,2
Nouveau-Brunswick	4,5 †	2,4–6,5	10,7	7,6–13,8	84,9	81,2–88,5
Québec	7,8	6,4–9,2	7,8	6,3–9,3	84,4	82,4–86,4
Ontario	7,9	6,7–9,2	9,6	8,3–10,9	82,5	80,7–84,2
Manitoba	10,0	7,2–12,7	10,0	7,1–12,9	80,0	76,2–83,8
Saskatchewan	6,3 †	3,9–8,7	8,9 †	6,0–11,8	84,8	81,1–88,5
Alberta	6,5	4,5–8,4	5,5	3,9–7,2	88,0	85,6–90,4
Colombie-Britannique	6,4	4,5–8,3	8,9	6,7–11,1	84,7	81,9–87,6
Yukon	10,0 †	6,4–13,5	*		83,8	79,5–88,1
Territoires du Nord-Ouest	6,8 †	4,1–9,5	19,6	14,7–24,5	73,6	68,4–78,8
Nunavut	14,3 †	8,9–19,7	15,2 †	9,8–20,7	70,5	63,6–77,3
<b>Canada</b>	<b>7,5</b>	<b>6,8–8,2</b>	<b>8,6</b>	<b>7,9–9,3</b>	<b>84,0</b>	<b>83,0–84,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Répartition du score obtenu sur l'Échelle de dépression post-partum d'Édimbourg (EDPE), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 35.2 et Figure 35.3]

	Score de 13 ou plus sur l'EDPE		Score de 10 à 12 sur l'EDPE		Score de 0 à 9 sur l'EDPE	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>						
15–19	14,0	9,9–18,2	10,0 †	6,2–13,9	75,9	70,7–81,2
20–24	9,3	7,2–11,3	9,0	7,0–10,9	81,7	79,0–84,5
25–29	5,5	4,5–6,5	8,7	7,4–10,0	85,8	84,2–87,4
30–34	7,6	6,3–8,8	7,3	6,2–8,5	85,1	83,5–86,7
35–39	8,1	6,3–10,0	10,9	8,7–13,0	81,0	78,4–83,6
≥40	9,0 †	4,4–13,7	5,9 †	2,1–9,7	85,1	79,4–90,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>						
Études secondaires non terminées	13,5	10,3–16,7	10,8	8,0–13,6	75,7	71,7–79,7
Diplôme d'études secondaires	9,2	7,5–10,9	10,1	8,3–11,8	80,7	78,4–83,0
Diplôme d'études postsecondaires	6,6	5,5–7,6	8,7	7,6–9,9	84,7	83,1–86,2
Diplôme universitaire	6,1	5,0–7,2	6,9	5,8–8,0	87,0	85,4–88,5
<b>Parité</b>						
Primipares	6,4	5,5–7,3	8,1	7,1–9,2	85,5	84,1–86,8
Multipares	8,4	7,4–9,3	8,9	7,9–9,9	82,8	81,4–84,1
<b>Type d'accouchement</b>						
Voie vaginale	7,6	6,8–8,4	8,2	7,4–9,0	84,2	83,0–85,3
Césarienne	7,1	5,8–8,4	9,6	8,1–11,1	83,3	81,4–85,3
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>						
Au niveau ou au-dessous du SFR	13,7	11,5–15,8	11,5	9,6–13,4	74,8	72,1–77,5
Au-dessus du SFR	5,7	5,0–6,4	7,4	6,6–8,2	86,9	85,9–88,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>7,5</b>	<b>6,8–8,2</b>	<b>8,6</b>	<b>7,9–9,3</b>	<b>84,0</b>	<b>83,0–84,9</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes auxquelles on a prescrit des antidépresseurs ou chez lesquelles on avait diagnostiqué une dépression avant leur grossesse, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 35.4]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	14,1	10,5–17,8
Île-du-Prince-Édouard	17,3	14,2–20,3
Nouvelle-Écosse	23,8	19,6–27,9
Nouveau-Brunswick	20,1	16,2–24,0
Québec	11,6	9,9–13,2
Ontario	14,5	12,9–16,1
Manitoba	18,2	14,4–21,9
Saskatchewan	17,3	13,6–20,9
Alberta	19,1	16,2–22,0
Colombie-Britannique	19,3	16,5–22,2
Yukon	11,3	7,7–14,9
Territoires du Nord-Ouest	11,1	7,6–14,6
Nunavut	9,6 †	5,3–13,9
<b>Canada</b>	<b>15,5</b>	<b>14,5–16,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes auxquelles on a prescrit des antidépresseurs ou chez lesquelles on avait diagnostiqué une dépression avant leur grossesse, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	17,0	12,2–21,7
20–24	20,3	17,5–23,1
25–29	14,9	13,3–16,5
30–34	13,8	12,3–15,3
35–39	16,5	14,0–19,0
≥40	13,6 †	8,5–18,8
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	20,0	16,3–23,6
Diplôme d'études secondaires	18,5	16,2–20,7
Diplôme d'études postsecondaires	17,4	15,8–19,0
Diplôme universitaire	11,0	9,7–12,4
<b>Parité</b>		
Primipares	14,6	13,3–15,9
Multipares	16,2	15,0–17,4
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	14,9	13,8–16,0
Césarienne	17,0	15,2–18,9
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	18,2	16,0–20,4
Au-dessus du SFR	14,9	13,9–16,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>15,5</b>	<b>14,5–16,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.



**Proportion de femmes qui ont reçu suffisamment d'information pendant leur grossesse sur la dépression postpartum, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	91,0	88,1–94,0
Île-du-Prince-Édouard	91,3	88,9–93,6
Nouvelle-Écosse	93,8	91,5–96,1
Nouveau-Brunswick	89,6	86,5–92,7
Québec	88,7	87,0–90,4
Ontario	92,2	91,0–93,4
Manitoba	90,9	88,0–93,8
Saskatchewan	92,0	89,4–94,6
Alberta	95,1	93,5–96,7
Colombie-Britannique	93,9	92,1–95,7
Yukon	95,1	92,7–97,6
Territoires du Nord-Ouest	89,8	86,5–93,1
Nunavut	77,5	71,5–83,4
<b>Canada</b>	<b>91,8</b>	<b>91,1–92,5</b>

IC – Intervalle de confiance.

## Répartition de la disponibilité d'un soutien postnatal, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 35.5]

Province/territoire	Tout le temps		La plupart du temps		Parfois		Rarement ou jamais	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	57,7	52,7–62,6	32,8	28,1–37,4	7,8 †	5,1–10,6	1,8 ‡	0,5–3,0
Île-du-Prince-Édouard	58,8	54,7–62,8	31,0	27,2–34,9	7,5	5,4–9,7	2,7 †	1,4–4,0
Nouvelle-Écosse	61,8	57,0–66,5	30,0	25,6–34,5	5,8 †	3,7–8,0	2,4 †	0,9–3,8
Nouveau-Brunswick	57,5	52,4–62,7	28,6	23,9–33,3	11,7	8,3–15,1	2,2 ‡	0,8–3,7
Québec	45,0	42,4–47,7	32,9	30,5–35,4	12,2	10,5–14,0	9,8	8,2–11,4
Ontario	49,0	46,7–51,3	35,5	33,4–37,6	10,6	9,2–12,0	4,9	3,9–5,9
Manitoba	49,0	44,1–53,9	36,5	31,7–41,2	9,5	6,8–12,3	5,0 †	2,8–7,2
Saskatchewan	61,5	56,6–66,4	28,3	23,8–32,9	6,2 †	3,7–8,7	4,0 †	2,1–6,0
Alberta	59,1	55,5–62,7	28,6	25,3–32,0	8,2	6,3–10,2	4,1 †	2,5–5,6
Colombie-Britannique	55,9	52,2–59,7	30,3	26,8–33,8	9,9	7,6–12,1	4,0 †	2,5–5,4
Yukon	59,2	53,3–65,1	32,6	26,9–38,3	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	53,8	48,2–59,4	27,0	21,9–32,1	12,4	8,5–16,3	6,8 †	4,0–9,6
Nunavut	43,4	36,5–50,4	25,1	19,0–31,1	18,1	12,7–23,5	13,4 †	8,6–18,2
<b>Canada</b>	<b>51,1</b>	<b>49,8–52,4</b>	<b>32,9</b>	<b>31,7–34,1</b>	<b>10,3</b>	<b>9,5–11,1</b>	<b>5,7</b>	<b>5,1–6,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

## 36 Santé du nourrisson

### Répartition de l'âge de gestation (en semaines) à la naissance, Canada, 2006–2007

	%	IC 95 %
<34	1,2	0,9–1,5
34–36	5,0	4,4–5,6
≥37	93,8	93,2–94,4

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de nourrissons nés à moins de 37 semaines révolues de gestation (naissance prématurée), selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	5,8 †	3,4–8,2
Île-du-Prince-Édouard	3,4 †	1,9–4,9
Nouvelle-Écosse	8,1	5,6–10,7
Nouveau-Brunswick	4,8 †	2,6–7,1
Québec	6,3	5,0–7,5
Ontario	7,0	5,9–8,1
Manitoba	5,4 †	3,1–7,8
Saskatchewan	4,6 †	2,5–6,7
Alberta	6,3	4,5–8,2
Colombie-Britannique	3,9 †	2,4–5,4
Yukon	8,7 †	5,4–12,0
Territoires du Nord-Ouest	6,6 †	3,4–9,3
Nunavut	7,8 †	3,8–11,8
<b>Canada</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6–6,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de nourrissons nés à moins de 37 semaines révolues de gestation (naissance prématurée), selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	5,5 †	2,7–8,3
20–24	7,1	5,2–9,0
25–29	5,8	4,8–6,9
30–34	5,8	4,7–6,8
35–39	6,4	4,7–8,1
≥40	9,9 †	5,1–14,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	8,7	6,2–11,2
Diplôme d'études secondaires	6,3	4,8–7,8
Diplôme d'études postsecondaires	6,6	5,5–7,7
Diplôme universitaire	5,2	4,2–6,1
<b>Parité</b>		
Primipares	7,1	6,1–8,1
Multipares	5,5	4,7–6,3
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	5,5	4,9–6,2
Césarienne	8,0	6,6–9,5
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	7,3	5,8–8,9
Au-dessus du SFR	5,9	5,2–6,7
<b>Toutes les femmes</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6–6,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes dont le bébé a été admis à l'unité des soins intensifs ou des soins spéciaux après la naissance et durée du séjour du bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 36.1]

Province/territoire	Admission dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux <12 heures		Admission dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux ≥12 heures		Aucune admission dans une unité de soins intensifs ou de soins spéciaux	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	3,2 †	1,4–5,1	5,4 †	3,2–7,5	91,4	88,7–94,1
Île-du-Prince-Édouard	2,8 †	1,3–4,2	8,2	6,0–10,4	89,0	86,5–91,6
Nouvelle-Écosse	2,9 †	1,3–4,5	11,1	8,1–14,1	86,0	82,7–89,3
Nouveau-Brunswick	7,8 †	5,1–10,5	14,9	11,2–18,5	77,3	73,1–81,6
Québec	4,2	3,1–5,3	9,7	8,1–11,3	86,0	84,2–87,9
Ontario	2,5	1,8–3,2	10,0	8,6–11,3	87,5	86,0–89,0
Manitoba	4,9 †	2,7–7,0	9,4	6,7–12,2	85,7	82,4–89,1
Saskatchewan	2,6 †	1,1–4,2	10,4	7,3–13,5	87,0	83,6–90,4
Alberta	3,2 †	1,9–4,4	8,2	6,3–10,2	88,6	86,4–90,9
Colombie-Britannique	3,6 †	2,2–5,1	6,6	4,7–8,4	89,8	87,5–92,0
Yukon	*		*		96,7	94,6–98,8
Territoires du Nord-Ouest	5,5 †	3,0–8,0	*		89,8	86,4–93,2
Nunavut	*		6,5 †	2,9–10,2	89,5	85,0–94,1
<b>Canada</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9–3,8</b>	<b>9,3</b>	<b>8,6–10,1</b>	<b>87,3</b>	<b>86,5–88,2</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes dont le bébé a été admis à l'unité des soins intensifs ou des soins spéciaux après la naissance, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	8,6	5,9–11,3
Île-du-Prince-Édouard	11,0	8,4–13,5
Nouvelle-Écosse	14,0	10,7–17,3
Nouveau-Brunswick	22,7	18,4–26,9
Québec	14,0	12,2–15,9
Ontario	12,5	11,0–14,0
Manitoba	14,3	10,9–17,6
Saskatchewan	13,0	9,6–16,4
Alberta	11,5	9,3–13,8
Colombie-Britannique	10,5	8,2–12,7
Yukon	*	
Territoires du Nord-Ouest	10,2 †	6,8–13,6
Nunavut	10,5 †	5,9–15,0
<b>Canada</b>	<b>12,7</b>	<b>11,9–13,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes dont le bébé a été admis à l'unité des soins intensifs ou des soins spéciaux après la naissance, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	14,4	10,2–18,5
20–24	12,7	10,4–15,1
25–29	14,4	12,8–16,0
30–34	10,8	9,4–12,1
35–39	13,3	11,1–15,6
≥40	9,4 †	4,9–13,9
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	14,0	10,9–17,1
Diplôme d'études secondaires	13,1	11,2–15,0
Diplôme d'études postsecondaires	13,4	11,9–14,9
Diplôme universitaire	11,7	10,3–13,1
<b>Parité</b>		
Primipares	16,0	14,6–17,4
Multipares	10,1	9,1–11,2
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	10,5	9,6–11,4
Césarienne	19,1	17,1–21,1
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	12,7	10,8–14,7
Au-dessus du SFR	12,7	11,7–13,7
<b>Toutes les femmes</b>	<b>12,7</b>	<b>11,9–13,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.



**Proportion de nourrissons réadmis à l'hôpital dans le mois et dans les cinq mois suivant la naissance, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

Province/territoire	Réhospitalisés dans le mois suivant la naissance		Réhospitalisés dans les cinq mois suivant la naissance	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	3,7 †	1,9–5,6	5,6 †	3,3–7,9
Île-du-Prince-Édouard	2,7 †	1,3–4,1	11,5	8,9–14,0
Nouvelle-Écosse	6,3 †	4,0–8,6	12,5	9,4–15,5
Nouveau-Brunswick	2,3 †	0,8–3,8	7,9 †	5,1–10,7
Québec	3,8	2,7–4,8	8,3	6,8–9,7
Ontario	3,8	2,9–4,6	6,5	5,3–7,6
Manitoba	3,2 †	1,4–5,0	7,5 †	4,8–10,2
Saskatchewan	3,9 †	2,0–5,8	6,3 †	3,9–8,7
Alberta	2,7 †	1,5–4,0	4,6 †	3,0–6,2
Colombie-Britannique	3,2 †	1,9–4,4	5,3	3,7–6,9
Yukon	*		8,2 †	5,1–11,4
Territoires du Nord-Ouest	*		7,0 †	4,1–9,8
Nunavut	*		12,6 †	7,8–17,3
<b>Canada</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1–4,1</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1–7,4</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

## Proportion de femmes dont le bébé a reçu des soins de santé autres que de routine, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 36.2]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	66,6	61,8–71,5
Île-du-Prince-Édouard	55,9	51,6–60,1
Nouvelle-Écosse	61,8	57,0–66,7
Nouveau-Brunswick	51,2	46,4–56,1
Québec	48,2	45,5–50,9
Ontario	46,0	43,8–48,2
Manitoba	49,5	44,9–54,2
Saskatchewan	51,9	47,2–56,6
Alberta	49,4	45,7–53,0
Colombie-Britannique	52,1	48,1–56,0
Yukon	63,6	57,6–69,6
Territoires du Nord-Ouest	55,8	50,1–61,5
Nunavut	49,3	42,1–56,5
<b>Canada</b>	<b>48,8</b>	<b>47,5–50,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes dont le bébé a reçu des soins de santé autres que de routine, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	54,7	48,9–60,5
20–24	51,5	48,1–55,0
25–29	48,9	46,8–51,1
30–34	48,1	45,9–50,4
35–39	46,9	43,6–50,2
≥40	43,0	35,6–50,4
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	45,7	41,3–50,1
Diplôme d'études secondaires	45,6	42,8–48,5
Diplôme d'études postsecondaires	51,1	49,0–53,3
Diplôme universitaire	49,1	46,9–51,4
<b>Parité</b>		
Primipares	50,7	48,8–52,6
Multipares	47,2	45,4–49,0
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	49,0	47,5–50,5
Césarienne	48,2	45,6–50,7
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	42,3	39,4–45,3
Au-dessus du SFR	51,0	49,5–52,5
<b>Toutes les femmes</b>	<b>48,8</b>	<b>47,5–50,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Répartition de l'évaluation du degré de difficulté à voir un professionnel de la santé pour recevoir des soins de santé autres que de routine par les femmes dont le bébé a reçu de tels soins, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 36.3]

Province/territoire	Très facile		Assez facile		Ni facile ni difficile		Assez ou très difficile	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	62,2	56,1–68,3	20,3	15,1–25,5	*		15,7	11,2–20,2
Île-du-Prince-Édouard	57,4	51,9–62,8	18,4	14,0–22,7	5,9 †	3,3–8,6	18,3	13,8–22,8
Nouvelle-Écosse	72,5	67,2–77,9	17,7	13,3–22,2	*		8,2 †	5,0–11,5
Nouveau-Brunswick	75,7	69,6–81,8	15,1 †	10,0–20,2	*		7,2 †	3,6–10,8
Québec	47,6	43,8–51,5	27,7	24,2–31,2	6,4	4,5–8,2	18,3	15,3–21,3
Ontario	69,2	66,2–72,2	16,2	13,7–18,6	4,5	3,1–5,8	10,2	8,3–12,1
Manitoba	65,7	59,0–72,4	22,1	16,4–27,8	*		10,2 †	5,9–14,5
Saskatchewan	73,4	67,7–79,1	17,5	12,5–22,6	*		6,8 †	3,3–10,4
Alberta	63,9	59,0–68,8	17,9	14,0–21,8	2,2 ‡	0,7–3,7	16,0	12,3–19,7
Colombie-Britannique	70,6	65,6–75,5	15,7	11,9–19,6	*		12,4	8,9–16,0
Yukon	73,9	67,4–80,4	15,3 †	10,1–20,6	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	45,8	38,3–53,3	29,5	22,8–36,2	*		18,8 †	12,6–25,0
Nunavut	55,9	45,7–66,1	19,0 †	11,0–26,9	12,2 †	5,4–19,1	13,0 †	5,9–20,0
<b>Canada</b>	<b>63,6</b>	<b>61,9–65,3</b>	<b>19,4</b>	<b>18,0–20,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2–4,6</b>	<b>13,1</b>	<b>11,8–14,3</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Raisons pour lesquelles des femmes estimaient qu'il était quelque peu ou très difficile de consulter un professionnel de la santé pour des soins autres que de routine pour le nourrisson, Canada, 2006–2007 §**

	%	IC 95 %
Le médecin/professionnel de la santé n'était pas disponible	74,8	70,5–79,1
Elle n'avait personne pour prendre soin des enfants	1,6 ‡	0,4–2,9
Elle était trop occupée	*	
Elle n'avait pas de moyen de transport	2,9 †	1,2–4,5
Elle ne pouvait pas prendre congé de son emploi	*	
Autre	26,3	21,9–30,7

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

§ Les femmes pouvaient choisir plus d'une réponse.

## Répartition des opinions des femmes sur la santé du bébé, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 36.4]

Province/territoire	Excellente		Très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	72,7	68,4–77,0	23,3	19,2–27,4	3,4 †	1,7–5,2	*	
Île-du-Prince-Édouard	70,7	67,0–74,4	22,8	19,3–26,3	4,9 †	3,1–6,6	*	
Nouvelle-Écosse	73,0	68,8–77,2	20,6	16,7–24,5	4,8 †	2,8–6,9	1,5 ‡	0,3–2,8
Nouveau-Brunswick	72,8	68,3–77,4	24,0	19,6–28,3	2,6 †	1,1–4,1	*	
Québec	70,4	67,9–72,8	22,4	20,1–24,6	6,4	5,1–7,8	0,8 †	0,4–1,3
Ontario	70,2	68,2–72,3	22,0	20,1–23,9	6,8	5,7–7,9	1,0 †	0,6–1,5
Manitoba	71,7	67,3–76,1	22,2	18,1–26,2	5,8 †	3,5–8,2	*	
Saskatchewan	65,1	60,6–69,7	27,3	23,0–31,6	7,3 †	4,7–9,9	*	
Alberta	74,5	71,3–77,6	20,0	17,2–22,9	4,4 †	2,9–5,9	1,1 ‡	0,3–1,9
Colombie-Britannique	70,4	66,9–73,8	20,9	17,8–24,0	8,0	5,9–10,1	0,9 ‡	0,1–1,3
Yukon	72,3	67,0–77,6	24,4	19,2–29,6	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	64,9	59,4–70,3	26,9	21,9–31,9	8,2 †	5,0–11,5	*	
Nunavut	48,7	41,2–56,1	25,6	19,3–32,0	24,4	18,0–30,9	*	
<b>Canada</b>	<b>70,8</b>	<b>69,6–71,9</b>	<b>22,0</b>	<b>20,9–23,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8–7,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7–1,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Répartition des opinions des femmes sur la santé du bébé, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	Excellente		Très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	56,3	50,4–62,1	32,3	26,7–38,0	10,0 †	6,4–13,6	1,4 ‡	0,2–2,5
20–24	68,4	65,1–71,6	23,2	20,3–26,1	7,3	5,3–9,2	1,2 ‡	0,4–2,0
25–29	69,7	67,7–71,7	23,5	21,6–25,4	5,8	4,8–6,9	1,0 †	0,5–1,4
30–34	73,0	71,1–74,9	19,5	17,8–21,3	6,8	5,6–7,9	0,7 †	0,3–1,1
35–39	73,3	70,3–76,3	20,5	17,8–23,3	5,3	3,7–6,9	0,8 ‡	0,2–1,5
≥40	71,7	64,6–78,8	21,2	14,8–27,6	6,2 †	2,5–9,8	*	
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	60,3	55,7–64,9	28,0	23,8–32,2	10,3	7,7–12,8	1,5 ‡	0,3–2,6
Diplôme d'études secondaires	69,5	66,9–72,1	22,9	20,4–25,3	6,8	5,4–8,2	0,8 †	0,4–1,3
Diplôme d'études postsecondaires	73,8	72,0–75,7	20,1	18,4–21,8	5,5	4,5–6,5	0,5 †	0,2–0,8
Diplôme universitaire	71,2	69,2–73,2	21,6	19,8–23,4	6,0	5,0–7,1	1,2 †	0,7–1,7
<b>Parité</b>								
Primipares	74,2	72,6–75,8	19,7	18,2–21,1	5,4	4,5–6,3	0,8 †	0,5–1,1
Multipares	68,2	66,5–69,8	23,7	22,2–25,2	7,1	6,2–8,0	1,0 †	0,6–1,3
<b>Type d'accouchement</b>								
Voie vaginale	71,1	69,7–72,5	22,1	20,8–23,3	6,0	5,3–6,7	0,8 †	0,5–1,1
Césarienne	69,8	67,6–72,0	21,6	19,6–23,6	7,4	6,0–8,8	1,2 †	0,7–1,7
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	63,3	60,4–66,2	26,5	23,8–29,2	8,9	7,2–10,6	1,3 †	0,6–2,0
Au-dessus du SFR	73,6	72,3–74,9	20,3	19,1–21,5	5,4	4,7–6,1	0,7 †	0,5–1,0
<b>Toutes les femmes</b>	<b>70,8</b>	<b>69,6–71,9</b>	<b>22,0</b>	<b>20,9–23,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8–7,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7–1,1</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

# 37 Position du nourrisson pour dormir

## Répartition de la position du nourrisson pour dormir, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 37.1]

Province/territoire	Sur le dos		Sur le côté		Sur le ventre		Autre	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	69,9	65,2–74,5	23,8	19,5–28,0	6,4 †	4,0–8,7	*	
Île-du-Prince-Édouard	83,7	80,6–86,7	9,2	6,8–11,6	7,1	5,0–9,3	*	
Nouvelle-Écosse	77,4	73,3–81,4	14,9	11,6–18,3	6,9 †	4,5–9,2	*	
Nouveau-Brunswick	77,1	72,8–81,4	10,9	7,7–14,0	11,1	7,9–14,4	*	
Québec	81,2	79,1–83,3	12,0	10,2–13,9	6,4	5,0–7,7	0,4 ‡	0,1–0,7
Ontario	74,2	72,3–76,1	17,0	15,4–18,6	8,0	6,8–9,3	0,7 †	0,4–1,1
Manitoba	77,3	73,2–81,5	19,0	15,2–22,7	3,2 †	1,4–5,0	*	
Saskatchewan	82,5	78,9–86,1	11,3	8,3–14,3	5,0 †	2,9–7,1	*	
Alberta	78,0	75,0–81,0	15,7	13,1–18,3	6,0	4,4–7,6	*	
Colombie-Britannique	80,0	76,9–83,2	11,6	9,0–14,1	7,7	5,6–9,8	*	
Yukon	86,5	82,3–90,7	8,4 †	5,0–11,8	*		*	
Territoires du Nord-Ouest	59,6	54,2–65,0	36,0	30,7–41,4	*		*	
Nunavut	45,8	38,7–52,9	34,6	27,8–41,4	19,6	13,8–25,4	*	
<b>Canada</b>	<b>77,4</b>	<b>76,3–78,5</b>	<b>14,9</b>	<b>14,0–15,8</b>	<b>7,1</b>	<b>6,4–7,8</b>	<b>0,6 †</b>	<b>0,4–0,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.



**Répartition de la position du nourrisson pour dormir, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 37.2 et Figure 37.3]

	Sur le dos		Sur le côté		Sur le ventre		Autre	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>								
15–19	70,4	65,1–75,8	18,3	13,6–22,9	10,5 †	7,0–14,0	*	
20–24	72,8	69,7–75,9	17,2	14,6–19,9	9,3	7,1–11,4	0,7 ‡	0,1–1,2
25–29	77,3	75,4–79,2	14,9	13,3–16,5	7,1	5,9–8,3	0,8 †	0,4–1,2
30–34	78,9	77,1–80,8	13,9	12,3–15,5	6,6	5,5–7,7	0,6 †	0,2–0,9
35–39	79,9	77,2–82,5	13,7	11,4–16,0	6,2	4,5–7,9	*	
≥40	78,7	72,5–84,9	17,2 †	11,5–22,9	4,1 ‡	1,0–7,2	*	
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>								
Études secondaires non terminées	65,9	61,7–70,2	24,5	20,6–28,4	8,6	6,2–11,1	0,9 ‡	0,1–1,7
Diplôme d'études secondaires	72,3	69,8–74,8	18,6	16,4–20,8	8,5	6,9–10,0	0,6 ‡	0,2–1,1
Diplôme d'études postsecondaires	77,5	75,8–79,3	14,1	12,6–15,5	7,7	6,6–8,8	0,7 †	0,3–1,1
Diplôme universitaire	82,9	81,2–84,6	11,3	9,9–12,8	5,4	4,4–6,4	0,4 ‡	0,1–0,7
<b>Parité</b>								
Primipares	81,1	79,6–82,6	12,3	11,1–13,6	6,0	5,1–6,9	0,5 †	0,2–0,8
Multipares	74,5	73,0–76,1	16,8	15,5–18,1	8,0	7,0–9,0	0,6 †	0,4–0,9
<b>Type d'accouchement</b>								
Voie vaginale	76,5	75,2–77,8	15,5	14,4–16,6	7,5	6,7–8,3	0,5 †	0,3–0,7
Césarienne	80,1	78,0–82,1	13,0	11,4–14,7	6,0	4,8–7,2	0,9 †	0,4–1,4
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>								
Au niveau ou au-dessous du SFR	68,5	65,7–71,3	21,7	19,2–24,3	9,3	7,4–11,1	0,5 ‡	0,1–0,9
Au-dessus du SFR	80,8	79,6–82,0	12,3	11,3–13,3	6,4	5,6–7,1	0,5	0,3–0,8
<b>Toutes les femmes</b>	<b>77,4</b>	<b>76,3–78,5</b>	<b>14,9</b>	<b>14,0–15,8</b>	<b>7,1</b>	<b>6,4–7,8</b>	<b>0,6 †</b>	<b>0,4–0,8</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

‡ Coefficient de variation >33,3 %.

**Proportion de femmes ayant reçu suffisamment d'information sur le syndrome de la mort subite du nourrisson, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 37.4]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	93,6	91,2–96,1
Île-du-Prince-Édouard	94,5	92,6–96,4
Nouvelle-Écosse	94,6	92,5–96,7
Nouveau-Brunswick	88,6	85,4–91,8
Québec	86,2	84,3–88,1
Ontario	90,9	89,6–92,2
Manitoba	88,1	84,8–91,3
Saskatchewan	95,2	93,1–97,4
Alberta	91,5	89,5–93,5
Colombie-Britannique	93,1	91,1–95,0
Yukon	93,4	90,4–96,3
Territoires du Nord-Ouest	79,0	74,3–83,7
Nunavut	77,1	70,6–83,7
<b>Canada</b>	<b>90,2</b>	<b>89,4–91,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

**Proportion de femmes ayant reçu suffisamment d'information sur le syndrome de la mort subite du nourrisson, selon l'âge de la mère, le niveau de scolarité de la mère, la parité, le type d'accouchement et la situation du revenu du ménage par rapport au seuil de faible revenu, Canada, 2006–2007**

	%	IC 95 %
<b>Âge de la mère (années)</b>		
15–19	88,3	84,3–92,2
20–24	86,2	83,7–88,7
25–29	90,0	88,6–91,4
30–34	92,1	90,9–93,2
35–39	90,4	88,3–92,5
≥40	89,9	85,2–94,7
<b>Niveau de scolarité de la mère</b>		
Études secondaires non terminées	83,9	80,5–87,2
Diplôme d'études secondaires	86,5	84,5–88,5
Diplôme d'études postsecondaires	90,7	89,5–91,9
Diplôme universitaire	93,1	91,9–94,2
<b>Parité</b>		
Primipares	91,2	90,1–92,3
Multipares	89,4	88,4–90,5
<b>Type d'accouchement</b>		
Voie vaginale	90,0	89,1–90,9
Césarienne	90,8	89,3–92,2
<b>Situation par rapport au seuil de faible revenu (SFR)</b>		
Au niveau ou au-dessous du SFR	84,9	82,7–87,1
Au-dessus du SFR	92,2	91,4–93,1
<b>Toutes les femmes</b>	<b>90,2</b>	<b>89,4–91,0</b>

IC – Intervalle de confiance.

## 38 Circoncision

### Proportion de bébés de sexe masculin qui ont été circoncis, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007

[Contient les données pour Figure 38.1]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	*	
Île-du-Prince-Édouard	39,2	33,8–44,5
Nouvelle-Écosse	6,8 †	3,6–10,0
Nouveau-Brunswick	18,0	12,5–23,5
Québec	12,3	9,8–14,7
Ontario	43,7	40,6–46,8
Manitoba	31,6	25,2–38,0
Saskatchewan	35,6	29,2–42,0
Alberta	44,3	39,2–49,4
Colombie-Britannique	30,2	25,4–35,0
Yukon	*	
Territoires du Nord-Ouest	9,7 †	5,2–14,2
Nunavut	*	
<b>Canada</b>	<b>31,9</b>	<b>30,3–33,6</b>

IC – Intervalle de confiance.

\* Estimation non indiquée étant donné que le numérateur non pondéré était inférieur à 5.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

## Répartition des principales raisons à l'origine de la décision de circoncire, Canada, 2006–2007

	%	IC 95 %
Pour des raisons religieuses	17,3	14,8–19,9
La santé et l'hygiène	44,4	41,1–47,7
Pour être comme son père, ses frères ou les autres garçons	35,6	32,5–38,7
Autre raison	2,7 †	1,7–3,7

IC – Intervalle de confiance.

† Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %.

**Proportion de femmes ayant un bébé de sexe masculin qui ont reçu suffisamment d'information sur la circoncision, selon la province ou le territoire, Canada, 2006–2007**

[Contient les données pour Figure 38.2]

Province/territoire	%	IC 95 %
Terre-Neuve-et-Labrador	52,8	45,8–59,8
Île-du-Prince-Édouard	75,5	70,5–80,5
Nouvelle-Écosse	62,5	56,3–68,6
Nouveau-Brunswick	69,9	63,1–76,7
Québec	40,2	36,4–43,9
Ontario	80,9	78,5–83,3
Manitoba	79,6	74,2–85,0
Saskatchewan	86,7	82,3–91,1
Alberta	78,4	74,4–82,4
Colombie-Britannique	80,8	76,6–85,1
Yukon	79,8	73,1–86,4
Territoires du Nord-Ouest	62,1	54,8–69,4
Nunavut	55,8	43,8–67,9
<b>Canada</b>	<b>69,9</b>	<b>68,4–71,5</b>

IC – Intervalle de confiance.